

¿alérgico a penicilina?

no

si

1ª línea

Pylera

ó

OCAM 14

Pylera

2ª línea

IBP/12h
Amoxicilina 1g/12h
Levofloxacino 500 mg/24h
Bismuto 240 mg/12h
14 días

ó

Pylera
(si se usó OCAM 14 de 1ª
línea)

IBP/12h
Claritromicina 500 mg/12h
Levofloxacino 500 mg/24h
10 días

Leyenda

- En color verde: 1ª línea de tratamiento
- En color amarillo: 2ª línea de tratamiento
- **Pylera**: combinación en una misma cápsula de 140 mg de subcitrato de bismuto, 125 mg de metronidazol y 125 mg de tetraciclina.
- La pauta terapéutica de pylera es: 3 cápsulas, 4 veces al día, durante 10 días, asociado a IBP/12h. Durante el tratamiento hay que evitar el alcohol, los lácteos y la exposición al sol.
- **OCAM 14**: siglas de la terapia erradicadora compuesta por Omeprazol 40 mg/12h, Claritromicina 500 mg/12h, Amoxicilina 1g/12h y metronidazol 250 mg/12h. Se toma durante 14 días.
- Es probable que administrar IBP de última generación a doble dosis añada beneficios erradicadores a las pautas terapéuticas.