

Acido Zoledrónico ZOMETA®

Es útil para prevenir la progresión de las metástasis y las fracturas patológicas.
Se ha aprobado el uso de Zolendronato en el tratamiento del dolor producido por las metástasis óseas del cáncer de próstata.

Efectos Secundarios

❖ [frecuentes] :

Cuadro seudogripal.	Mialgias.	Vómitos.	Edema.
Fiebre.	Dolor óseo.	Debilidad.	Hipocalcemia.
Escalofríos.	Astenia.	Disnea.	
Artralgias.	Nauseas.	Anemia.	

❖ [ménos frecuentes] :

Erupción.	Dolor torácico.	Insf. Cardíaca.	Toxicidad medular.
Prurito.	Bradicardia.	Insf. Renal.	Hipofosfatemia.

❖ [ráros]

- Conjuntivitis. - Cefalea. - Hipomagnesemia. - Osteonecrosis mandibular.

- **Mientras dure el tratamiento, estos pacientes evitarán, en la medida de lo posible, las intervenciones dentales invasivas, extracciones o implantes, ante la posibilidad de necrosis mandibular (suspender tratamiento con 2-3 meses de anterioridad).**

Manifiesto que he sido informado y autorizo la administración del fármaco.

Firma del paciente	Firma persona que representa	Firma del médico
Fecha:	DNI	Fecha:
		CNP
		Fecha: