

INFORME PRESCRIPCION DE OTROS MEDICAMENTOS SOMETIDOS A VISADO
(Cualquier Médico del Sistema Sanitario Público)

PACIENTE: _____

POSOLÓGIA: _____ DURACIÓN TTO: _____

SELLO, Y FIRMA DEL FACULTATIVO

N.U.S.S: _____ FECHA: _____

(MARQUE LA INDICACIÓN CON UNA X)

Medicamento	Indicaciones (Instrucciones de la D.G.F. y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo 24/3/99 y aprobado en el Anexo I de la Circular nº 8/94 de "Gestión y control del visado de recetas del Sistema Nacional de Salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud"):
NATEGLINIDA Starlix ®	☒ <u>Terapia combinada</u> con Metformina en pacientes con DM II inadecuadamente controlados con una dosis máxima tolerada de Metformina en monoterapia
PIOGLITAZONA Actos ®	Indicada sobre todo en pacientes con DM II y sobrepeso. <u>Monoterapia</u> oral en DM II, en pacientes no controlados con medidas higiénico-dietéticas en los que la metformina está contraindicada o no se tolera. <u>Doble Terapia Oral</u> , en pacientes con DM II: a) ☒ En combinación con Metformina, en pacientes no controlados con dosis máximas de Metformina. b) ☒ En combinación con una Sulfonilurea, en pacientes no controlados con dosis máximas de estas cuando no se pueda utilizar Metformina. <u>Triple Terapia Oral</u> , en combinación con Metformina y una Sulfonilurea en pacientes con control glucémico inadecuado a pesar de la Doble Terapia Oral. <u>Asociada a Insulina</u> , en pacientes no controlados y que no puedan utilizar Metformina.
PIOGLITAZONA/ METFORMINA Competact ®	☒ Tratamiento de DM II, especialmente en pacientes con sobrepeso, que no se controla adecuadamente con la dosis máxima tolerada de metformina oral en monoterapia.
CLOPIDOGREL Iscover ® Plavix ®	<u>Prevención de eventos aterotrombóticos en:</u> a) ☒ Pacientes que han sufrido Infarto de Miocardio (desde pocos días hasta un máximo de 35 días), Infarto Cerebral (desde los 7 días hasta un máximo de 6 meses) o Arteriopatía Periférica establecida. a) ☒ Pacientes que presentan Síndrome Coronario Agudo sin elevación del segmento-ST (Angina Inestable o Infarto de Miocardio sin onda-Q), en combinación con AAS. b) ☒ Infarto de miocardio agudo con elevación del segmento ST, en combinación con AAS en pacientes tratados médicamente de elección para terapia trombolítica. ☒ Tratamiento de pacientes a los que se les va a implantar un stent tras intervención coronaria percutánea en combinación con AAS.
ESTATINAS	☒ Hipercolesterolemia familiar heterozigótica.