

PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS INFECCIOSA

RECOMENDACION DE PROFILAXIS:

- Portadores de prótesis valvulares cardíacas o material protésico utilizado para reparación valvular.
- Endocarditis infecciosa previa.
- Cardiopatía congénita cianosante no corregida (incluidos cortocircuitos o conductos paliativos).
- Cardiopatía congénita cianosante corregida con defectos residuales en el lugar de la corrección o en sus inmediaciones.
- Durante los 6 primeros meses tras la reparación de cardiopatía congénita sin defecto residual con empleo de material o dispositivo protésico.
- Persistencia de defecto residual en el lugar de implantación de material protésico o dispositivo por cirugía cardíaca o técnica percutánea.

PROCEDIMIENTOS QUE REQUIEREN PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS INFECCIOSA:

- Procedimientos dentales con manipulación de tejido gingival o región periapical dentaria, o con perforación de mucosa oral.
- Amigdalectomía y/o adenoidectomía.
- Procedimientos respiratorios invasivos con incisión o biopsia (no se recomienda en broncoscopia, laringoscopia, intubación transnasal o endotraqueal).
- Cirugía genitourinaria o gastrointestinal (no se recomienda en gastroscopia, colonoscopia, citoscopia o ecocardiograma transesofágico).
- Procedimientos en piel o tejido osteomuscular infectados.

PAUTAS PROFILACTICAS:

-PROFILAXIS ESTANDAR: Amoxicilina 2 gr vía oral 1 hora antes del procedimiento.

-INCAPAZ DE TOMAR MEDICACION ORAL:

Ampicilina 2gr iv o im 30 minutos antes del procedimiento.

o

Ceftriaxona 1gr iv o im 30 minutos antes del procedimiento

-ALERGIA A PENICILINA:

Clindamicina 600 mg vía oral 1 hora antes del procedimiento o iv 30 minutos antes del procedimiento.

Vancomicina 1gr iv 30 minutos antes del procedimiento.



Nº DE EDICION	FECHA	NATURALEZA DE LA REVISIÓN
01	04/10/11	REVISIÓN