

## INFORMACIÓN PARA ENFERMERIA PARA CPRE

### Previo al procedimiento

1. Comprobar que el paciente o responsable legal del mismo ha firmado el consentimiento informado. En caso contrario se le entregará y si se niega a firmarlo no se realizará la exploración
2. Comprobar que el paciente se encuentra en ayunas
3. Comprobar que el paciente tiene estudio de coagulación reciente (máximo 10 días antes). Si no tiene se enviará analítica urgente a laboratorio que incluya hemograma y coagulación
4. Coger vía periférica en brazo derecho
5. El paciente debe ser remitido con su informe correspondiente

### Después del procedimiento

1. El paciente debe estar en cama durante 6 horas después del procedimiento
2. Si no hay ninguna incidencia se le darán líquidos a las 6 horas y se administrará 1 gr IV de Ampicilina si no es alérgico a Penicilina
3. Inmediatamente a su llegada se le pondrá un supositorio de Diclofenaco
4. Tomar constantes (TA, pulso y temperatura) a las 2, 4 y 6 horas y avisar al Médico si se detecta alguna alteración significativa
5. Avisar si el dolor es importante
6. Extraer sangre para la determinación de Hemograma y Amilasa a las 4 horas del procedimiento, si la Amilasa es superior a 1000 avisar al médico