

GUIA DE ADMINISTRACION DE FARMACOS POR SNG.

PRINCIPIO ACTIVO	FORMA FARMACEUTICA	SNG	RECOMENDACIONES
ABACAVIR 300 mg	Comp	NO	Recurrir a la solución oral comercial: Abacavir 100 mg/ml.
ABACAVIR+LAMIVUDINA+ ZIDOVUDINA 300/150/300 mg	Comp recubiertos	NO	Recurrir a la solución oral comercial: Zidovudina 50 mg/ml, Lamivudina 50 mg/ml, Abacavir 100 mg/5ml.
ACENOCUMAROL Comp 4 mg	Comp con cubierta entérica	SI	Triturar el comprimido, disolver y administrar inmediatamente. La trituración puede alterar la biodisponibilidad, vigilar más a menudo la coagulación
ACETAZOLOMIDA 250 mg	Comp	SI	Triturar.
ACETILCISTEINA 200 mg	Sobr	SI	Diluir en agua (50 ml) y administrar inmediatamente
ACETILSAL. LISINA 1 g	Sobr	SI	Diluir en agua (15 ml) y administrar inmediatamente
ACETILSALICILICO 100 y 500 mg	Comp	SI	Triturar.

ACETILSALICILICO 150 y 300 mg	Caps	SI	No triturar: microgránulos con recubrimiento entérico y liberación sostenida. No administrar por sonda fina los microgránulos pueden atascarla. Si sonda gruesa dispersar los microgránulos en bebida acida
ACICLOVIR 200 y 800 mg	Comp dispersable	SI	Triturar
ALBENDAZOL 400 mg	Comp recubierto	NO	No se puede triturar
ALGEDRATO 450 mg	Comp	NO	Alternativa: algeldrato suspensión, separar 1-2 h de la NE (pH)
ALGELDRATO/MAGNESIOHI DRÓXIDO	Susp	SI	Diluir en agua y administrar
ALMAGATO 1,5 g	Sobr	SI	Diluir en agua y administrar inmediatamente. Administrar al menos 30 min después de la dieta ya que interacciona con la NE
ALOPURINOL 100 y 300 mg	Comp	SI	Triturar, disolver y administrar inmediatamente

AMILASA+PROTEASA+LIPASA	Caps	SI	No triturar. Abrir la cápsula, dispersar el contenido en agua y administrar inmediatamente.
AMILORIDE+HIDROCLORTIAZIDA 5/50 mg	Comp	SI	Disgregar el comprimido en agua, disolver y administrar inmediatamente (irritante si no se disuelven bien)
AMIODARONA 200 mg	Comp	SI	Triturar el comprimido, disolver y administrar inmediatamente
AMITRIPTILINA 10,25,50 y 75 mg	Comp recubierto	SI	Triturar, disolver y administrar inmediatamente
AMLODIPINO 5 y 10 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
AMOXICILINA 250, 500,1000 mg	Sobr	SI	Diluir en agua (20 ml) y administrar
AMOXICILINA 500 mg	Caps	NO	Recurrir a formas farmacéuticas alternativas (sobres, suspensión)
AMOXICILINA+CLAVUL. 250, 500, 875/125 mg	Sobr	SI	Diluir en agua (20 ml) y administrar
AMOXICILINA+CLAVUL.500 mg	Comp	NO	Recurrir a formas farmacéuticas alternativas (sobres, suspensión)
AMPRENAVIR 150 mg	Caps	. NO	Buscar vía o fármaco alternativo
ANAGRELIDE 0.5 mg	Caps	. NO	Buscar vía o fármaco alternativo
ASCORBICO ACIDO 1 g	Sobr	SI	Disolver en medio vaso de agua y administrar

ASCORBICO ACIDO 1g/5ml	Amps	SI	Se pueden beber
ASCORBATO POTASICO	Comp efervescentes	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
ASTEMIZOLE 10 mg	Comp	SI	Desleír en agua, disolver y administrar inmediatamente
ATENOLOL 50, 100 mg	Comp	SI	Triturar el comprimido, disolver y administrar inmediatamente
ATORVASTATINA 10,20,40,80 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
AZATIOPRINA 50 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
B1+B6+B12	Comp recubierto	SI	Triturar y administrar inmediatamente
BACLOFENO 10, 25 mg	Comp	SI	Triturar, disolver y administrar inmediatamente
BENZBROMARONA 100 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
BEZAFIBRATO 400 mg	Comp	SI	No triturar la forma Retard
BICARBONATO DE SOSA 500 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
BIPERIDENO RETARD 4 mg.	Grag liberación retardada	NO	No triturar. Recurrir a comp de liberación inmediata
BIPERIDENO 2 mg.	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
BISOPROLOL 5 y 10 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente

BROMAZEPAN 1.5 mg cap.	Caps	SI	Abrir la cápsula, dispersar el contenido en agua y administrar inmediatamente
BROMOCRIPTINA 2,5 mg comp.	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
BUPRENORFINA 0,2 mg	Comp	NO	Administración sublingual. No triturar disolver debajo de la lengua
CALCIO CARB. 500 mg.	Comp masticables	NO	Absorción en la boca
CALCIO CARBAMATO/CALCIO GLUCOBIONATO 0.3/2.94 gr	Comp efervescente	SI	Disolver en agua y administrar al finalizar la efervescencia
CALCITRIOL 0,25 mcg.	Caps	NO	Cápsulas gelatinosas blandas con principio activo lábil. Alternativa: amp administración parenteral
CAPTOPRILO 25, 50 mg.	Comp	SI	Triturar el comprimido, disolver y administrar inmediatamente. Está descrita la administración sublingual

CARBAMAZEPINA 200,400 mg	Comp recubierto	SI	Desleír en agua, disolver y administrar inmediatamente. Dividir dosis diaria en más tomas. Interrumpir la NE 2h antes y 2h después de la administración del medicamento ya que disminuye la absorción por
CARBIDOPA+LEVODOPA 25/100mg y 25-250 mg	Comp	SI	Triturar el comprimido, disolver y administrar inmediatamente
CARBIMAZOL 5 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
CARVEDILOL 6.25, 25 mg	Comp	SI	Triturar, dispersar en medio ácido y administrar inmediatamente
CEFIXIMA 200 mg Caps SI Desleír en agua, disolver y administrar inmediatamente. Alternativa: sobres 200 mg			
CEFUROXIMA-AXETILO 500 mg	Comp recubierto	NO	La trituración no asegura la biodisponibilidad. Recurrir a formas farmacéuticas alternativas (sobres, suspensión)
CICLOFOSFAMIDA 50 mg	Grag	SI	Triturar, disolver y administrar inmediatamente. Seguir recomendaciones de manipulación de citostáticos

CICLOSPORINA A 25,50, 100 mg	Caps	NO	Alternativa: Solución comercial 100 mg/10 ml disol de agua, zumo o leche en vaso de vidrio
CIPROFLOXACINO 250, 500, 750 mg . Interrumpir la NE 1h antes y	Comp	SI	Desleír en agua, disolver y administrar inmediatamente 2h después de la administración del medicamento ya que disminuye su absorción por quelación con los cationes de la NE
CISAPRIDA 10 mg.	Comp	NO	Alternativa: solución oral 1mg/ml
CLARITROMICINA 250 mg	Comp	NO	Alternativa: Recurrir a las formas farmacéuticas alternativas (sobres, suspensión
CLINDAMICINA 150, 300 mg	Caps	SI	Abrir la cápsula, dispersar en agua y administrar inmediatamente
CLOMETIAZOL 192 mg	Caps	NO	No se recomienda porque el líquido es muy denso y puede quedar adherido a la sonda (dosificación incorrecta)
CLOMIPRARMINA 10, 25 mg.	Grag	SI	Triturar, disolver y administrar inmediatamente
CLOMIPRARMINA 75 mg .	Comp	SI	Triturar, disolver y administrar inmediatamente
CLONAZEPAM 0.5 mg	Comp	NO	Alternativa: clonazepam gotas 2,5 mg/ml

CLOPIDOGREL 75 mg	Comp recubierto	SI	Triturar, disolver y administrar inmediatamente
CLORAMBUCILO 2 mg.	Comp	NO	Existe suspensión comercializada 2mg/ml
CLORAZEPATO DIPOT. 10,15,50 mg.	Caps	SI	Abrir la cápsula, dispersar en agua y administrar inmediatamente
CLORPROMAZINA 25,100 mg	Comp	NO	Alternativa: clorpromazina gotas 40 mg/ml
CLORPROPAMIDA 250 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
CLORTALIDONA 50 mg.	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
CLOTIAPINA 40 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
CLOXACILINA 500 mg	Caps	NO	Alternativa: cloxacilina suspensión oral 25 mg/ml
CLOZAPINA 100 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
CODEINA 30 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente. Existe solución oral comercial
COLCHICINA 1 mg	Gránulos	SI	No triturar los gránulos principio activo muy irritante. Disgregar en agua y administrar inmediatamente
COLCHICINA /DICLOVERINA 500 mcg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente

COLECALCIFEROL 2000UI/10ml	Gotas	SI	Diluir en agua y administrar inmediatamente
COLESTIRAMINA 4 g minutos	Sobr	SI	Diluir en 100 ml de agua ozumo y dejar reposar unos minutos
COTRIMOXAZOL 800/160 mg.	Comp	NO	Alternativa : cotrimoxazol200/40 mg en 5 ml suspensión oral comercial
DEFLAZACORT 6, 30 mg.	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
DEXAMETASONA 1 mg	Comp	SI	Desleír en agua, disolver y administrar inmediatamente Alternativa: las ampollas de dexametasona se pueden administrar por vía ora.
DEXCLORFENIRAMINA 2 mg	Comp	SI	Triturar, disgregar y administrar inmediatamente
DEXCLORFENIRAMINA 6 mg	Grag repetabs	NO	Alternativa: recurrir a comprimidos o solución comercial 2mg/5ml
DIAZEPAM 5, 10 mg.	Comp	SI	Triturar,disgregar y administrar inmediatamente
DICLOFENACO 50 mg	Comp con cubierta entérica	NO	No Triturar porque tiene cubierta entérica. Alternativa: viales por sonda o pasar a otros AINES

DIGOXINA 0,25 mg	Comp	SI	Triturar, disolver y administrar inmediatamente. Alternativa: metildigoxina suspensión oral 0.05 mg/ml
DIHIDROCODEINA 60 mg	Comp liberación retardada	NO	No se puede triturar al ser de liberación sostenida. Alternativa: codeína solución 6.3mg/5ml
DILTIAZEM 120, 180 mg	Comp de liberación retardada	NO	No se pueden triturar al ser de liberación retardada. Alternativa: comprimidos de liberación inmediata ajustando la posología
DILTIAZEM 60 mg	Comp	SI	Triturar, disolver y administrar inmediatamente
DIPIRIDAMOL 50, 100 mg	Grag	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
DOMPERIDONA 10 mg	Comp	NO	Alternativa: Recurrir a la solución oral 1mg/ml
DOXAZOSINA 4 mg	Comp liberación retardada	NO	No se puede triturar al ser comp de liberación retardada
DOXICICLINA 100 mg	Caps	SI	Abrir la cápsula, disgregar y administrar inmediatamente. Alternativa: suspensión oral 50mg/5ml
ENALAPRILO 5, 20 mg	Comp	SI	Triturar el comprimido, disolver y administrar inmediatamente

ENZIMAS PANCREATICAS	Caps	SI	Abrir la cápsula, disgregar en agua y administrar inmediatamente
ERITROMICINA 500 mg.	Comp liberación retardada	NO	No se puede triturar al ser de liberación controlada. Alternativa: Eritromicina 500 sobres o eritromicina 500mg/5 ml solución oral
ESPIRONOLACTONA 25, 100 mg	Comp	SI	Triturar, disolver y administrar inmediatamente
ETAMBUTOL 400 mg	Grag	SI	Triturar, disolver y administrar inmediatamente
		NO	
FENITOINA 100 mg	Comp	SI	Triturar, disolver y administrar inmediatamente. Alternativa: Fenitoína 125 mg/5 ml suspensión oral. Interrumpir la NE 2h antes y 2h después de la administración del medicamento ya que disminuye su absorción por unión a las proteínas o al calcio de la NE
FENOBARBITAL 100 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
FLECAINIDA 100 mg	Comp	SI	Desleír en agua, disolver y administrar inmediatamente

FLUCONAZOL 50, 100, 200 mg	Caps	SI	Abrir la cápsula, disolver en agua y administrar inmediatamente. Alternativa: fluconazol 200 mg/5 ml suspensión (diluir en agua)
FLUOXETINA 20 mg	Caps	SI	Abrir la cápsula, disolver en agua y administrar inmediatamente
FLURAZEPAM 30 mg	Caps	SI	Abrir la cápsula, disolver en agua y administrar inmediatamente
FLUTAMIDA 250 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
FOSFOMICINA 500 mg	Caps	SI	Abrir la cápsula, disolver en agua y administrar inmediatamente
FUROSEMIDA 40 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
GABAPENTINA 300 y 400 mg	Caps	SI	Abrir la cápsula, disolver en agua y administrar inmediatamente
GANCICLOVIR 250 mg	Caps	NO	No existe información. Recurrir a vía intravenosa
GLIBENCLAMIDA 5 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
KETOROLACO 10 mg	Comp	SI	Triturar, disolver y administrar inmediatamente

LABETALOL 100 y 200 mg	Comp	SI	Triturar, disolver y administrar inmediatamente
LACTITOL 10 g	Sobr	SI	Diluir en 25 ml de agua y administrar inmediatamente
LAMIVUDINA 100,150 y 300 mg	Comp	NO	Alternativa : solución oral comercial 50 mg/5 ml
LAMOTRIGINA 25 y 100 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
LEVODOPA 200/BENSERA 50 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
LEVOFLOXACINO 500 mg	Comp	SI	Triturar, disgregar en agua y administrar inmediatamente
LEVOMEPROMAZINA 25 y 100 mg	Comp	NO	Alternativa: forma farmacéutica líquida levomepromazina 40 mg/ml gtas
LEVOTIROXINA 50 y 100 mcg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
LINEZOLID 600 mg	Comp	SI	Triturar, disgregar en agua y administrar inmediatamente
LITIO CARBONATO 400 mg	Comp	NO	Son de liberación sostenida
LOPERAMIDA 2 mg	Caps	SI	Abrir la cápsula, disgregar y administrar inmediatamente
LORAZEPAM 1 y 5 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
LORMETAZEPAM 1y 2 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
LOSARTAN 12,5 y 50 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente

LOSARTAN 50+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
MAGNESIO LACTATO 500 mg	Comp	SI	Triturar, disolver y administrar inmediatamente
MEFLOQUINA 250 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
MEGESTROL 40 y 160 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente. Alternativa: solución comercial megestrol 200 mg/5 ml
MESALAZINA 500 mg	Comp	NO	Cubierta entérica. Acción de 5ASA en intestino grueso. Alternativa: Enema de 5-ASA
METADONA 5 mg	Comp	NO	Fórmula magistral elaborada en Servicio de Farmacia
METAMIZOL 575 mg	Caps	NO	Alternativa: metamizol amp
METFORMINA 850 mg	Grag	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
METILDIGOXINA 0.1 mg	Comp	SI	Medicamento de estrecho margen terapéutico: monitorizar nivel plasmático
METILDOPA 250 y 500 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
METILPREDNISOLONA 4 y 40 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente

METOCLOPRAMIDA 10 mg	Comp	SI	Triturar, disolver y administrar inmediatamente. Alternativa: solución comercial metoclopramida 5 mg/5 ml
METOPROLOL 100 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
METRONIDAZOL 250 mg	Comp	NO	Alternativa : solución comercial metronidazol 200mg/5 ml
MEXILETINA 200 mg	Caps	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
MIANSERINA 30 mg	Comp	SI	Triturar, disolver y administrar inmediatamente
MINOXIDILO 10 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
MISOPROSTOL 200 mcg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
MITOTANE 500 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
MOLSIDOMINA 2 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
MORFINA 10 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
MORFINA MST 10, 30, 60 y 100 mg	Comp retard	NO	No se puede triturar. Alternativa: comprimidos de morfina de liberación normal
NELFINAVIR 250 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente

NEVIRAPINA 200 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
NIFEDIPINA 10 mg	Caps	NO	Alternativa: utilización vía sublingual
NIFEDIPINA OROS 30 y 60 mg	Comp	NO	No triturar comp sistema OROS. Alternativa: utilización vía sublingual
NIFEDIPINA 20 mg	Comp Retard	NO	Alternativa: utilización vía sublingual
NIMODIPINO 30 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
NISTATINA 100000 60 ml	Susp	SI	Diluir en agua y administrar inmediatamente
NITROFURANTOINA 50 mg	Grag	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
NITROGLICERINA sublingual	Grag	NO	Administración sublingual. Biodisponibilidad oral muy baja por intenso efecto de primer paso
NORFLOXACINO 400 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
OFLOXACINO 200 mg	Comp	NO	Alternativa : Valorar administración IV
OLANZAPINA 5,10 mg	Comp	NO	Alternativa: olanzapina velotab
OLANZAPINA 5,10 mg velotab	Comp	NO	Dispersión sublingual

OMEPRAZOL 20 mg	Caps con microgránulos recubiertos	SI	Si SNG es de suficiente paso: abrir y dispersar gránulos en SG 5% o zumo. Si no: triturar el contenido de la cápsula y dispersar en 10 ml de bicarbonato sódico 1M
ONDANSETRON 4 y 8 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
OXIBUTININA 5 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
PANCREATINA	Caps con entéricas microesferas	SI	Abrir cápsula y dispersar gránulos sin triturar en 15 ml agua.
PARACETAMOL 500 CODEINA 30 mg	Comp efervescente	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente.
PARACETAMOL 500 y 650 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
PARAFINA 300 ml	Soluc	SI	Diluir en agua y administrar inmediatamente. pH < 3.5 puede precipitar con la NE y obstruir la sonda: administrar 1h antes o 2h después de la dieta
PAROXETINA 20 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
PENTOXIFILINA 400 mg	Grag	NO	Cubierta entérica. Alternativa: pentoxifilina amp 300 mg/15ml directo o diluir en agua

PENTOXIFILINA 600 mg	Comp Retard	NO	Alternativa: pentoxifilina amp 300 mg/15 ml directo o diluir en agua
PERFENAZINA 8 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
PIPEMICO ACIDO 400 mg	Caps	SI	Abrir la cápsula
PIRACETAM 800 mg Comp SI Alternativa : ampollas bebibles			
PIRAZINAMIDA 250 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
PIRIDOSTIGMINA 60 mg	Comp	SI	Triturar, disgregar en agua y administrar inmediatamente
PIRIDOXINA 300 mg	Comp	NO	Alternativa: piridoxina amp
PRIMETAMINA 25 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
PLANTAGO OVATA	Sobr	SI	Diluir en 80 ml de agua. Riesgo de grumos y obstrucción de la sonda
POTASIO 1,32 g/5 ml	Soluc	SI	Diluir en agua y administrar inmediatamente. No administrar con NE riesgo de coagulación de la NE
POTASIO SUPLEMENTO 10 mEq	Comp	SI	Disolver y esperar fin de efervescencia. No administrar con NE riesgo de coagulación de la NE
POTASIO SUPLEMENTO 600 mg	Caps	NO	Alternativa: solución oral comercial 1.32 g/5 ml

PREDNISONA 5,10,30 y 50 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
PROCAINAMIDA 250 mg	Caps	SI	Abrir la cápsula, disgregar y administrar y administrar inmediatamente
PROCARBAZINA 50 mg	Caps	SI	Abrir la cápsula, disgregar y administrar inmediatamente. Precauciones de citostáticos
PROPAFENONA 150 y 300 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
PROPILTIOURACILO 50 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
PROPRANOLOL RET. 160 mg	Caps	NO	Comp de liberación sostenida
PROPRANOLOL 10 y 40mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
RAMIPRILO 2.5 y 5 mg comp.	Comp	NO	No se recomienda
RANITIDINA 150 y 300 mg	Comp	SI	Triturar el comprimido, disolver y administrar inmediatamente
REPAGLINIDA 0,5, 1 y 2 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
RETINOL 500000 UI	Caps	NO	Alternativa: viales bebibles retinol 50.000 UI /ml

RIBAVIRINA 300 y 400 mg	Caps	SI	Abrir la cápsula, disgregar y administrar y administrar inmediatamente
RIFAMPICINA 300 y 600 mg	Caps	NO	Alternativa: solución oral comercial rifampicina 20 mg/ml
RIFAMPICINA+ISONIAZID A+PI RAZIN	Grag	SI	Triturar el comprimido, disolver y administrar inmediatamente
RILUZOL 50 mg	Comp	NO	
RISPERIDONA 1,3 y 6 mg	Comp recubierto	NO	Alternativa: solución oral comercial risperidona 1 mg/ml: diluir en agua y administrar inmediatamente
RITODRINA 10 mg	Comp	SI	Desleír en agua, disolver y administrar inmediatamente
RITONAVIR 100 mg	Caps	NO	Alternativa : solución oral comercial ritonavir solución 80 mg/ml 90 ml
RITONAVIR 80 mg/ml sol. 90 ml	Soluc	SI	Diluir en agua y administrar inmediatamente
SAQUINAVIR 200 mg	Caps	NO	No experiencia, si es imprescindible, abrir la cápsula, disgregar en agua y administrar inmediatamente y monitorizar niveles plasmáticos
SELEGILINA 5 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente

SILDENAFILO 25 y 50 mg	Comp	NO	No experiencia
SIROLIMUS 1 mg/ml 60 ml	Soluc	SI	Diluir en agua y administrar inmediatamente
SOTALOL 160 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
SUCRALFATO 1 gr	Sobr	SI	Diluir en agua y administrar inmediatamente. Disminuye la absorción de la NE por unión a proteínas de la NE
SULFADIAZINA 500 mg	Comp	SI	Triturar, disgregar y administrar inmediatamente
SULFADIAZINA 500 mg	Comp	SI	Triturar, disgregar y administrar inmediatamente
SULFADOXINA + PIRIMETAMINA	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
SULFASALAZINA 500 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
SULPIRIDA 200 mg	Grag	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
SULPIRIDA 50 mg	Caps	SI	Abrir la cápsula, disgregar y administrar y administrar inmediatamente
SUMATRIPTAN 50 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
TAMOXIFENO 10 mg	Comp	SI	Triturar en bolsa de plástico
TEMOZOLAMIDA 5,20,100 y 250 mg	Caps	NO	Se recomienda buscar fármaco alternativo

TENOFOVIR 245 mg	Comp con cubierta pelicular	SI	Triturar el comprimido, disolver y administrar inmediatamente
TEOFILINA 100 mg	Comp con gránulos Retard	NO	Alternativa: solución oral comercial de aminofilina 81,8 mg/5 ml ajustando la posología. Interrumpir la NE 1h antes y 2h después de la administración del medicamento
TEOFILINA 200 y 300 mg	Caps con microgránulos recubiertos	SI	Abrir la cápsula, dispersar y administrar inmediatamente. ¡No triturar!. Alternativa: solución oral comercial de aminofilina 81,8 mg/5 ml ajustando la posología. Interrumpir la NE 1h antes y 2h después de la administración del medicamento
TETRAZEPAM 50 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
TIAGABINA 5 y 10 mg	Comp	NO	No experiencia, en principio no hay contraindicaciones
TIAMINA 300 mg	Comp recubierto	SI	Triturar el comprimido, disolver y administrar inmediatamente
TICLOPIDINA 250 mg	Comp recubierto	SI	Triturar el comprimido, disolver y administrar inmediatamente

TIETILPERAZINA 6,5 mg	Grag	SI	Triturar el comprimido, disolver y administrar inmediatamente. Alternativa: tietilperazina 6.5 mg supositorios
TIOGUANINA 40 mg Comp SI Triturar en bolsa de plástico. Seguir recomendaciones de manipulación de citostáticos.			
TIORIDAZINA RETAR.200 mg	Comp	NO	Alternativa: Tioridazina 30 mg/ml gotas ajustando la posología o tioridazina comp no Retard.
TIORIDAZINA 10 y 50 mg	Grag	SI	Triturar el comprimido, disolver y administrar inmediatamente
TOCOFEROL 50 y 200 mg	Caps	NO	
TORASEMIDA 5 y 10 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
TRAMADOL 50 mg	Caps	SI	Abrir la cápsula, dispersar y administrar inmediatamente
TRANEXAMICO ACIDO 500 mg	Comp	SI	Triturar el comprimido, disolver y administrar inmediatamente
TRAZODONA 100 mg	Comp recubierto	SI	Triturar el comprimido, disolver y administrar inmediatamente
TRETINOINA 10 mg	Caps	NO	
TRIHEXIFENIDILO 2 mg	Comp	SI	Triturar el comprimido, disolver y administrar inmediatamente

URSOSESOXICOLICO 150 mg	Comp	SI	Triturar y administrar
VERAPAMILO 80 mg	Grag	SI	Triturar el comprimido, disolver y administrar inmediatamente
VERAPAMILO HTA 240 mg.	Comp	NO	No triturar porque se pierde efecto Retard. Alternativa: verapamilo grageas
VERAPAMILO Retard 120 y 180 mg	Comp liberación retardada	NO	No triturar porque se pierde efecto Retard. Alternativa: verapamilo grageas
VIGABATRINA 500 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
VIT. C 1 g	Sobr	SI	Disolver en medio vaso de agua y administrar
VITAMINA B 6	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
VITAMINA B1,B6 Y B12	Comp recubierto	SI	Triturar y administrar inmediatamente
VITAMINA B1	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
VORICONAZOL 50 y 200 mg	Comp cubierta pelicular	NO	No se disponen de datos de estabilidad y absorción del comp triturado
ZALCITABINA 0.75 mg	Comp	SI	Disgregar en agua y administrar inmediatamente
ZIDOVUDINA 100,250 y 300 mg	Caps	NO	Alternativa: solución oral comercial Zidovudina 50 mg/5 ml



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

U.G.C. MEDICINA INTERNA

ZIDOVUDINA 50 mg/5 ml	Soluc	SI	Diluir en agua y administrar inmediatamente
ZOLPIDEM 10 mg	Comp	NO	No se conocen datos de Estabilidad

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR CON SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL.

Area de Gestión Sanitaria Norte de Almería
Hospital “La Inmaculada” & Distrito A. P.”Levante Alto Almanzora”
Avda. Dra. Ana Parra, s/n
04600 Huércal-Overa (ALMERIA)
Teléfono: 950 02 90 00

