


# ESQUEMA DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA DE INFECCIÓN NUEVO CORONAVIRUS (PRIMARIA U HOSPITAL)

## CRITERIO EPIDEMIOLÓGICO

- ¿ÚLTIMOS 14 DÍAS EN LA PROVINCIA DE HUBEI (CHINA)?
- ¿CONTACTO ESTRECHO CON CASO PROBABLE O CONFIRMADO\*?



## CRITERIO CLÍNICO

- INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA, DE CUALQUIER GRAVEDAD, CON FIEBRE + 1 ENTRE TOS, DISNEA, MALESTAR GENERAL

### PRECAUCIONES ANTE LA IDENTIFICACIÓN DE UN CASO

- Trasladar al paciente a una zona donde pueda ser aislado.
- Mascarilla quirúrgica al paciente y al profesional sanitario que lo acompañe.

### PRECAUCIONES DURANTE EL CUIDADO O LA ATENCIÓN SANITARIA

- Medidas de **AISLAMIENTO por CONTACTO Y GOTAS** en la habitación del paciente.
- Equipo de protección individual (EPI) para profesionales y personas al entrar:
  - **Secuencia para poner EPI:** Higiene de manos - Bata impermeable - Mascarilla FFP2 o superior - Protección ocular antisalpicaduras - Guantes.
  - **Secuencia de retirada EPI:** Guantes - Higiene de manos - Bata impermeable - Protección ocular antisalpicaduras - Mascarilla FFP2 o superior - Higiene de manos.

**Nota 1.** Ante técnicas que puedan generar **aerosoles** se utilizará preferentemente una mascarilla FFP3 y protección ocular de montura integral o protector facial completo, y se recomienda habitación con presión negativa.


**Nota 2.** Si interviene **EPES**, instaurar precauciones recomendadas (**cabina separada**) y EPI previstos, informar a las Urgencias correspondientes para preparar la correcta recepción.

- Recoger los **DATOS DE IDENTIFICACIÓN** y **TELÉFONO ACTUALIZADO** del paciente
- **CONTACTAR CON RED DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA:** a través de Medicina Preventiva / Epidemiología (en horario laboral) o **061** (fuera del horario laboral).

- **DESCARTAR INFECCIÓN POR EL NUEVO CORONAVIRUS 2019-nCoV:** la recogida y el envío de las muestras al Centro Nacional de Microbiología debe ser autorizada por la **AUTORIDAD DE SALUD PÚBLICA**.
- **INGRESO HOSPITALARIO Y RESTO DE MUESTRAS:** según manejo clínico habitual de infección respiratoria aguda.

## FUNDAMENTAL

- **CORRECTA HIGIENE DE MANOS**
- **LIMPIEZA DE SUPERFICIES:** con desinfectante de superficies habitual del centro sanitario o hipoclorito sódico 1000 ppm.



\* En este momento, y siguiendo las recomendaciones de OMS y del ECDC, hasta que se disponga de mayor información epidemiológica, el contacto se considerará con casos probables o confirmados en un periodo comprendido entre 14 días antes y 14 días después del inicio de síntomas de dichos casos.

Para más información y actualizaciones consultar el **Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (2019-nCov)** del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). Ministerio de Sanidad