

HOSPITAL LA INMACULADA

UNIDAD DE ENDOSCOPIA. EXPLORACIÓN / INTERVENCIÓN DE **TARDE**

PREPARACIÓN DEL COLON CON MOVIPREP®

Sabor Naranja C.N. 673610.4 Sabor Limón C.N. 656284.0

ES IMPRESCINDIBLE Y MUY IMPORTANTE, QUE SIGA LAS INSTRUCCIONES QUE AQUÍ SE INDICAN PARA QUE LA LIMPIEZA SEA ADECUADA Y ASI EVITAR REPETIR LA PRUEBA.

RECUERDE QUE DEBE VENIR ACOMPAÑADO POR OTRA PERSONA Y NO CONDUCIR

48 horas antes

DURANTE 48 HORAS ANTES DE LA COLONOSCOPIA:

Desayuno: Normal, **SIN FIBRA** (SIN galletas integrales, frutas, verduras o legumbres).
Puede tomar: 1 rebanada pan blanco tostado o bollería, café con leche desnatada

Comida. Normal, **SIN FIBRA** (SIN galletas integrales, frutas, verduras o legumbres).
Puede tomar: Pollo, pescado o carne a la plancha. Postre: flan o yogurt

Cena. Normal, **SIN FIBRA** (Sin galletas integrales, verduras o legumbres).
Puede tomar: Algo de pescado o pollo a la plancha, 1 rebanada de pan blanco tostado

24 horas antes

Desayuno: Normal, **SIN FIBRA** (SIN galletas integrales, frutas, verduras o legumbres).
Puede tomar: 1 rebanada pan blanco tostado o bollería, café con leche desnatada.

Comida. Normal, **SIN FIBRA** (SIN galletas integrales, frutas, verduras o legumbres).
Puede tomar: Pollo, pescado o carne a la plancha. Postre: flan o yogurt

Después de la **COMIDA** debe permanecer **SOLO** con **DIETA LÍQUIDA** (Agua, caldos colados sin grasas, infusiones, té, café y bebidas sin burbujas).

Cómo tomar MOVIPREP®

El **día** de la exploración/intervención:

- A las **8:00** horas beber 1 litro de Moviprep®, un vaso cada 10-15 minutos.


IMPORTANTE: Durante este tiempo además debe beber 1 litro de líquidos claros.


- A las **11:00** horas beber 1 litro de Moviprep®, un vaso cada 10-15 minutos.

IMPORTANTE: DESDE LAS 12:00 HORAS DE LA MAÑANA ESTARÁ EN AYUNO ABSOLUTO (NI AGUA) HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA EXPLORACIÓN.

Cómo preparar MOVIPREP®

 **1** Abrir una de las bolsas transparentes y extraer los sobres A y B.

 **2** Añadir el contenido de los sobres A y B en un recipiente de 1 litro de capacidad.

 **3** Añadir 1 litro de agua al recipiente.

 **4** Revolver hasta que todo el polvo se haya disuelto y la solución sea clara o ligeramente turbia. Este proceso puede durar hasta 5 minutos.