

DATOS SOBRE USO DE ANTIBIÓTICOS Y RESISTENCIAS.

PROAH LA INMACULADA


Datos 2014-2017

Dr. Gines Parra.

FEA Medicina Interna


DDD 2014-2017

DDD total-PROAH65




GASTO INGRESADOS/AMBULATORIOS

Gasto I-A




CARBAPENÉMES





BLEE


BLEE




Título del gráfico




QUINOLONAS



VANCO/LZ




AMINOGLUCÓSIDOS




MORTALIDAD CRUDA BACTERIEMIAS ENTEROBACTERIAS


E. coli




K. pneumoniae



NAC MORTALIDAD 14D.



ASESORÍAS




Los principales errores en el uso de antimicrobianos son los siguientes:

Tratamiento empírico

Injustificado	Ausencia de diagnóstico de infección y/o de signos de gravedad
Inapropiado	Demora en el inicio del tratamiento en pacientes con sepsis grave o shock séptico
	Elección inapropiada del antimicrobiano
	Dosificación inapropiada
	Elección inapropiada de la vía de administración
	Duración inapropiada, generalmente mayor de la necesaria

Tratamiento dirigido

Injustificado	Tratamiento de un microorganismo que sólo causa colonización o contaminación del cultivo
	Combinaciones de antimicrobianos injustificadas
Inapropiado	Elección inapropiada del antimicrobiano
	Dosificación inapropiada
	Elección inapropiada de la vía de administración
	Duración inapropiada, generalmente mayor de la necesaria



Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica

www.elsevier.es/eimc



Tabla 9

Principales microorganismos resistentes y grupos de antimicrobianos en los que se puede plantear la reducción del consumo como ayuda al control de los primeros

Microorganismo	Reducción en consumo de:
<i>Staphylococcus aureus</i> resistente a la meticilina	Quinolonas y cefalosporinas ^a
Enterobacterias productoras de BLEE	Cefalosporinas (espectro extendido) y quinolonas
<i>P. aeruginosa</i> resistente a carbapenémicos	Carbapenémicos y quinolonas
<i>P. aeruginosa</i> resistente a quinolonas	Quinolonas
<i>A. baumannii</i> resistente a carbapenémicos	Carbapenémicos
<i>Clostridium difficile</i>	Quinolonas, cefalosporinas, clindamicina

^a Impacto muy moderado.

CRITERIOS A LA HORA DE ELEGIR UN ANTIBIÓTICO



1. Eficacia y efectividad
2. Seguridad (incluye el **impacto ecológico**).
3. Coste económico (eficiencia).