

Cesárea Podálica: **6**
 Mujeres con cesárea anterior: **8**

Cesár. Gemelar: **1**
 Partos vaginales tras C.A.: **3** 37,5%

L.T. cesárea: **7**
 L.T. postparto: **0**

Fiebre intraparto con epidural: **5** 12,2%
Fiebre intraparto sin epidural: **0** 0,0%
Fiebre intraparto total: **5** 4,4%

PATOLOGÍA MATERNA PUERPERAL: **34** 30,1%

Anemia:	31	96,9%	
Fiebre:	1	3,1%	Endometritis
Anemia+Fiebre:	0	0,0%	
E.M.P.:	0	0,0%	
Legrado:	0	0,0%	
Metrorragia:	1	3,1%	
Transfusión:	0	0,0%	
Resutura:	0	0,0%	
Otras:	0	0,0%	
DUPLICADAS:	1		(ANEMIA-Transf)
TOTAL:	32		???

RECIÉN NACIDOS: **114**

nº pH: **24** 21,1% Traslado CHT: **0** 0,0% Apgar-5 < 7: **3** 2,6%

MORTALIDAD feto-neonatal:

MAPEC: **0** MAPIC: **0** MIP: **0** MNP: **0** MNT:

MORBILIDAD neonatal:

Ingreso en Neonatos: **18**

R.P.B.F.:	1	SFA-prolapso de cordón-convulsiones.
Quejido:		
Distress Resp:	2	(preeclampsia), Riesgo infeccioso.
Depresión Neo		
Riesgo infecc.:	5	(Púrpura trombocitopénica neonatal), Enterococcemia, distocia social
Ictericia:	1	
Hipoglucemia:		
Prematuro:		
Bajo peso/CIR:	1	
Sdr Avery:		
Aspir Meconial:		
Malfomación:		
Otras:	8	Muerte post-parto (casi MS), deshidratación, madre (droga + VHC), Plaque

TOTAL MORBI-MORTALIDAD: **18** 15,8%

OBSERVACIONES:

23,0%

35,4%
29,2%
8,0%
1,8%

????

1

0
0,0%

113

0

topenia

--

Cesárea Podálica: 3
Mujeres con cesárea anterior: 10

Cesár. Gemelar: 1
Partos vaginales tras C.A.: 6 60,0%

L.T. cesárea: 3
L.T. postparto: 0

Fiebre intraparto con epidural: 7 18,4%
Fiebre intraparto sin epidural: 0 0,0%
Fiebre intraparto total: 7 7,0%

PATOLOGÍA MATERNA PUERPERAL: 35 35,0%

Anemia:	28	80,0%	
Fiebre:	3	8,6%	Un reingreso.
Anemia+Fiebre:		0,0%	
E.M.P.:		0,0%	
Legrado:		0,0%	
Metrorragia:	1	2,9%	
Transfusión:	2	5,7%	
Resutura:		0,0%	
Otras:	1	2,9%	Ingurgitación mamaria.
DUPLICADAS:			
TOTAL:	35		

RECIÉN NACIDOS: 103

nº pH: 29 28,2% Traslado CHT: 1 1,0% Apgar-5 < 7: 2 1,9%

MORTALIDAD feto-neonatal:

MAPEC: 1 MAPIC: MIP: MNP: MNT:

MORBILIDAD neonatal:

Ingreso en Neonatos: 14

R.P.B.F.:		
Quejido:		
Distress Resp:	4	1 EMH a CHT.
Depresión Neo	3	
Riesgo infecc.:		
Ictericia:	2	
Hipoglucemia:		
Prematuro:	2	
Bajo peso/CIR:	2	
Sdr Avery:		
Aspir Meconial:		
Malfomación:		
Otras:	1	Ductus persistente (PCA).

TOTAL MORBI-MORTALIDAD: 15 14,6%

OBSERVACIONES:


25,0%

41,7%
28,2%
3,9%
1,0%

1

0
0,0%

100



--

Médico Responsable: AISA

Nº partos: 94 **Media/día:** 3,03
Gemelares: 2 **Nº R.N.:** 96

SEXO: Varón: 49 51,0% Mujer: 47 49,0%

EDAD MATERNA: < 20 a: 6 6,4% 20-34: 63 67,0% > 34 a: 25

EDAD GESTACIONAL:		PESO FETAL:	
< 28 s:	0 0,0%	500-999 g:	0 0,0%
28-36 s:	9 9,6%	1000-1499 g:	1 1,0%
37-40 s:	68 72,3%	1500-1999 g:	0 0,0%
41 s:	17 18,1%	2000-2499 g:	4 4,2%
> 42 s:	0 0,0%	2500-2999 g:	17 17,7%
TOTAL:	94	TOTAL:	96

SITUACIÓN-PRESENTAC: Longitudinal: 94 Oblicua: 0 Trasversa:
 Vértex: 90 93,8% Podalic: 2 2,1% Poster: 0 0,0%
 Otros: 1 Podalica-vértice 1

PARIDAD: 1P: 50 2P: 27 3P: 16 4P: 0 5P: 1 > 6P:
 Total: 94 53,2% 28,7% 17,0% 0,0% 1,1%

COMIENZO:	Esponáneos:	61 64,9%	Estim. Oxitoc.:	12 19,7%	
	Cesár .Elect:	8 8,5%	Inducidos:	25 26,6%	TOTAL:
Miso:	Miso+Oxitoc:	3 12,0%	Oxitoc:	9 36,0%	Dinoprostona:
				3 12,0%	Dinopr+Oxitoc:
					0 0,0%

Porcentaje de Cesáreas en Inducciones: 32,0%
 Miso: 2 20,0% Miso+Oxitoc: 2 66,7% Oxitoc: 3 33,3% Dinoprostona: 1 33,3% Dinopr+Oxitoc: 0 ###

Motivo de Inducciones:

GVP:	7	28,0%	
RPM:	9	36,0%	
CIR:	2	8,0%	
Oligoamnios:	0	0,0%	
Meconio:	2	8,0%	
RCTG anormal:	0	0,0%	
R.P.B.F.:	0	0,0%	
E.H.E.:	0	0,0%	
Diabetes:	1	4,0%	
A.O.Desfavor.:	0	0,0%	
Interés Matern:	2	8,0%	Colestasis, Retención urinaria
Interés Fetal:	1	4,0%	
Otras:	1	4,0%	Feto Muerto
TOTAL:	25		

EPIDURALES: 31 33,0% Eutóc: 23 74,2% Cesáreas: 4 12,9%
 Vacuo: 2 6,5% Forcep: 2 6,5% Ayuda manual: 0 0,0%
 Instrument Epidurales: 4 12,9% Instrument No Epidural: 0 0,0%

TERMINACIÓN DE LOS PARTOS:

EUTCOCICOS:	65	69,1%			
CESÁREAS:	25	26,6%	Ces. Electivas:	9	36,0%
INSTRUMENT:	4	4,3%	Vacuo:	3	75,0%
NALGAS:	0	0,0%	Forcep:	1	25,0%
OTROS:	0	0,0%	V-F:	0	0,0%
TOTAL:	94				

(1 ventosa fallida)

Cesárea Podálica: 3
Mujeres con cesárea anterior: 4

Cesár. Gemelar: 2
Partos vaginales tras C.A.: 4 ###

L.T. cesárea: 4
L.T. postparto: 0

Fiebre intraparto con epidural: 7 22,6%
Fiebre intraparto sin epidural: 2 3,2%
Fiebre intraparto total: 9 9,6%

PATOLOGÍA MATERNA PUERPERAL: 31 33,0%

Anemia:	26	83,9%	
Fiebre:	1	3,2%	
Anemia+Fiebre:		0,0%	
E.M.P.:		0,0%	
Legrado:		0,0%	
Metrorragia:	2	6,5%	
Transfusión:	1	3,2%	
Resutura:		0,0%	
Otras:	1	3,2%	Seroma
DUPLICADAS:	0		

TOTAL: 31

RECIÉN NACIDOS: 96

nº pH: 27 28,1% Traslado CHT: 1 1,0% Apgar-5 < 7: 2 2,1%

MORTALIDAD feto-neonatal:

MAPEC: 1 MAPIC: 0 MIP: 0 MNP: 0 MNT:

MORBILIDAD neonatal:

Ingreso en Neonatos: 14

R.P.B.F.:	1	Bradicardia sinusal/Cianosis
Quejido:	0	
Distress Resp:	3	
Depresión Neo	2	
Riesgo infecc.:	0	
Ictericia:	1	
Hipoglucemia:	0	
Prematuro:	1	
Bajo peso/CIR:		
Sdr Avery:		
Aspir Meconial:		
Malfomación:		
Otras:	5	Madre diabetes/ Viriasis/ Sosp. Trisomía 21/Pseudoobstrucción intestinal/Pié

TOTAL MORBI-MORTALIDAD: 14 14,6%

OBSERVACIONES:

--

26,6%

40,6%
27,1%
9,4%
0,0%

0

0
0,0%

94

0

és Zamb

--

Médico Responsable: Delgado

Nº partos: 82 **Media/día:** 2,73
Gemelares: 0 **Nº R.N.:** 82

SEXO: Varón: 40 48,8% Mujer: 42 51,2%

EDAD MATERNA: < 20 a: 6 7,3% 20-34: 52 63,4% > 34 a: 24

EDAD GESTACIONAL:	PESO FETAL:	
< 28 s: 0 0,0%	500-999 g: 0 0,0%	3000-3499 g: 36
28-36 s: 5 6,1%	1000-1499 g: 0 0,0%	3500-3999 g: 22
37-40 s: 64 78,0%	1500-1999 g: 1 1,2%	4000-4499 g: 5
41 s: 13 15,9%	2000-2499 g: 2 2,4%	> 4500 g: 0
> 42 s: 0 0,0%	2500-2999 g: 16 19,5%	
TOTAL: 82		TOTAL: 82

SITUACIÓN-PRESENTAC: Longitudinal: 82 Oblicua: Trasversa:
 Vértex: 79 96,3% Podalic: 0 0,0% Poster: 2 2,4%
 Otros: 1

PARIDAD: 1P: 34 2P: 35 3P: 10 4P: 2 5P: 1 > 6P:
 Total: 82 41,5% 42,7% 12,2% 2,4% 1,2%

COMIENZO:	Esponáneos: 58 70,7%	Estim. Oxitoc.: 6 10,3%	
	Cesár .Elect: 5 6,1%	Inducidos: 19 23,2%	TOTAL:
Miso: 6 31,6%	Miso+Oxitoc: 2 10,5%	Oxitoc: 11 57,9%	Dinoprostona: 0 0,0%
			Dinopr+Oxitoc: 0 0,0%

Porcentaje de Cesáreas en Inducciones: 26,3%

Miso: 2 33,3%	Miso+Oxitoc: 0 0,0%	Oxitoc: 3 27,3%	Dinoprostona: 0 ###	Dinopr+Oxitoc: 0 ###
--------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------

Motivo de Inducciones:

GVP:	4	21,1%
RPM:	7	36,8%
CIR:	1	5,3%
Oligoamnios:	2	10,5%
Meconio:	1	5,3%
RCTG anormal:	1	5,3%
R.P.B.F.:	2	10,5%
E.H.E.:	1	5,3%
Diabetes:		0,0%
A.O.Desfavor.:		0,0%
Interés Matern:		0,0%
Interés Fetal:		0,0%
Otras:		0,0%
TOTAL:	19	

EPIDURALES: 18 22,0%	Eutóc: 7 38,9%	Cesáreas: 5 27,8%
Vacuo: 6 33,3%	Forcep: 0 0,0%	Ayuda manual: 0 0,0%
Instrument Epidurales: 6 33,3%	Instrument No Epidural: 1 1,6%	

TERMINACIÓN DE LOS PARTOS:

EUTOCICOS: 60 73,2%			
CESÁREAS: 15 18,3%	Ces. Electivas: 5 33,3%	Ces. Intraparto: 10 66,7%	
INSTRUMENT: 7 8,5%	Vacuo: 6 85,7%	Forcep: 1 14,3%	V-F: 0 0,0%
NALGAS: 0 0,0%			
OTROS: 0 0,0%			
TOTAL: 82			

Cesárea Podálica: 0
Mujeres con cesárea anterior: 9

Cesár. Gemelar: 0
Partos vaginales tras C.A.: 5 55,6%

L.T. cesárea: 4
L.T. postparto: 0

Fiebre intraparto con epidural: 3 16,7%
Fiebre intraparto sin epidural: 2 3,1%
Fiebre intraparto total: 5 6,1%

PATOLOGÍA MATERNA PUERPERAL: 27 32,9%

Anemia:	21	77,8%	
Fiebre:	1	3,7%	
Anemia+Fiebre:	0	0,0%	
E.M.P.:	0	0,0%	
Legrado:	0	0,0%	
Metrorragia:	1	3,7%	
Transfusión:	1	3,7%	
Resutura:	0	0,0%	
Otras:	3	11,1%	1 dehiscencia de cicatriz uterina, 1 hemorroides dolorosas, 1 hipertensión.
DUPLICADAS:	0		

TOTAL: 27

RECIÉN NACIDOS: 82

nº pH: 30 36,6% Traslado CHT: 0 0,0% Apgar-5 < 7: 0 0,0%

MORTALIDAD feto-neonatal:

MAPEC: 0 MAPIC: 0 MIP: 0 MNP: 0 MNT:

MORBILIDAD neonatal:

Ingreso en Neonatos: 8

R.P.B.F.:	0	
Quejido:	1	
Distress Resp:	3	
Depresión Neo	0	
Riesgo infecc.:	1	
Ictericia:	0	
Hipoglucemia:	0	
Prematuro:	1	
Bajo peso/CIR:	1	
Sdr Avery:	0	
Aspir Meconial:	0	
Malfomación:		
Otras:	1	Distocia de hombros.

TOTAL MORBI-MORTALIDAD: 8 9,8%

OBSERVACIONES:

29,3%

43,9%
26,8%
6,1%
0,0%

0
0,0%

82

0

--

Médico Responsable: BARQUEROS

Nº partos: 90 **Media/día:** 2,90
Gemelares: 2 **Nº R.N.:** 92

SEXO: Varón: 42 45,7% Mujer: 50 54,3%

EDAD MATERNA: < 20 a: 5 5,6% 20-34: 69 76,7% > 34 a: 16

EDAD GESTACIONAL:		PESO FETAL:			
< 28 s:	0 0,0%	500-999 g:	0 0,0%	3000-3499 g:	32
28-36 s:	6 6,7%	1000-1499 g:	0 0,0%	3500-3999 g:	16
37-40 s:	73 81,1%	1500-1999 g:	0 0,0%	4000-4499 g:	10
41 s:	11 12,2%	2000-2499 g:	10 10,9%	> 4500 g:	0
> 42 s:	0 0,0%	2500-2999 g:	24 26,1%		
TOTAL:	90			TOTAL:	92

SITUACIÓN-PRESENTAC: Longitudinal: 91 Oblicua: 0 Trasversa:
 Vértex: 87 94,6% Podalic: 4 4,3% Poster: 0 0,0%
 Otros: 1 Transversa

PARIDAD: 1P: 40 2P: 36 3P: 11 4P: 2 5P: 0 > 6P:
 Total: 90 44,4% 40,0% 12,2% 2,2% 0,0%

COMIENZO:	Esponáneos:	63 70,0%	Estim. Oxitoc.:	11 17,5%	
	Cesár .Elect:	4 4,4%	Inducidos:	23 25,6%	TOTAL:
Miso: 5 21,7%	Miso+Oxitoc:	6 26,1%	Oxitoc:	12 52,2%	Dinoprostona: 0 0,0%
					Dinopr+Oxitoc: 0 0,0%

Porcentaje de Cesáreas en Inducciones: 34,8%

Miso: 2 40,0%	Miso+Oxitoc: 3 50,0%	Oxitoc: 3 25,0%	Dinoprostona: 0 ###	Dinopr+Oxitoc: 0 ###
--------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------

Motivo de Inducciones:

GVP:	5 21,7%	
RPM:	11 47,8%	
CIR:	2 8,7%	
Oligoamnios:	1 4,3%	
Meconio:	1 4,3%	
RCTG anormal:	0,0%	
R.P.B.F.:	0,0%	
E.H.E.:	0,0%	
Diabetes:	1 4,3%	Diabetes gestacional y edad materna 47 años
A.O.Desfavor.:	0,0%	
Interés Matern:	0,0%	
Interés Fetal:	0,0%	
Otras:	2 8,7%	Sospecha de macrosoma, Feto muerto APEC.
TOTAL:	23	

EPIDURALES: 23 25,6%	Eutóc: 16 69,6%	Cesáreas: 5 21,7%
Vacuo: 2 8,7%	Forcep: 0 0,0%	Ayuda manual: 0 0,0%
Instrument Epidurales: 2 8,7%	Instrument No Epidural: 1 1,5%	

TERMINACIÓN DE LOS PARTOS:

EUTOCICOS:	68 75,6%			
CESÁREAS:	19 21,1%	Ces. Electivas: 4 21,1%		Ces. Intraparto: 15 78,9%
INSTRUMENT:	3 3,3%	Vacuo: 3 ###	Forcep: 0 0,0%	V-F: 0 0,0%
NALGAS:	0 0,0%			
OTROS:	0 0,0%			
TOTAL:	90			

Cesárea Podálica: 4
Mujeres con cesárea anterior: 7

Cesár. Gemelar: 2
Partos vaginales tras C.A.: 6 85,7%

L.T. cesárea: 4
L.T. postparto: 1

Fiebre intraparto con epidural: 2 8,7%
Fiebre intraparto sin epidural: 2 3,0%
Fiebre intraparto total: 4 4,4%

PATOLOGÍA MATERNA PUERPERAL: 27 30,0%

Anemia:	23	85,2%	
Fiebre:	2	7,4%	
Anemia+Fiebre:		0,0%	
E.M.P.:		0,0%	
Legrado:		0,0%	
Metrorragia:	1	3,7%	
Transfusión:	1	3,7%	
Resutura:		0,0%	
Otras:	2	7,4%	Preeclampsia, Tromboflebitis
DUPLICADAS:	2		
TOTAL:	27		

RECIÉN NACIDOS: 92

nº pH: 31 33,7% Traslado CHT: 0 0,0% Apgar-5 < 7: 0 0,0%

MORTALIDAD feto-neonatal:

MAPEC: 1 MAPIC: 0 MIP: 0 MNP: 0 MNT:

MORBILIDAD neonatal:

Ingreso en Neonatos: 14

R.P.B.F.:		
Quejido:		
Distress Resp:	6	6 por Distress respiratorio tipo II
Depresión Neo		
Riesgo infecc.:	4	
Ictericia:		
Hipoglucemia:		
Prematuro:	2	
Bajo peso/CIR:		
Sdr Avery:		
Aspir Meconial:	1	
Malfomación:		
Otras:	1	Foramen oval permeable

TOTAL MORBI-MORTALIDAD: 15 16,3%

OBSERVACIONES:

Hª 184546: MAPEC.

0

--

Médico Responsable: Manrique

Nº partos: 93 **Media/día:** 3,10
Gemelares: 1 **Nº R.N.:** 94

SEXO: Varón: 49 52,1% **Mujer:** 45 47,9%

EDAD MATERNA: < 20 a: 4 4,3% 20-34: 66 71,0% > 34 a: 23

EDAD GESTACIONAL:		PESO FETAL:	
< 28 s:	0 0,0%	500-999 g:	0 0,0%
28-36 s:	4 4,3%	1000-1499 g:	1 1,1%
37-40 s:	78 83,9%	1500-1999 g:	2 2,1%
41 s:	11 11,8%	2000-2499 g:	5 5,3%
> 42 s:	0 0,0%	2500-2999 g:	17 18,1%
TOTAL:	93	TOTAL:	94

SITUACIÓN-PRESENTAC: Longitudinal: 94 Oblicua:
 Vértex: 91 96,8% Podalic: 3 3,2% Poster: 0 0,0%
 Otros:
 Transversa:

PARIDAD: 1P: 51 54,8% 2P: 27 29,0% 3P: 11 11,8% 4P: 4 4,3% 5P: 0 0,0% > 6P:
 Total: 93

COMIENZO: Espontáneos: 66 71,0% Estim. Oxitoc.: 11 16,7%
 Cesár .Elect: 7 7,5% Inducidos: 20 21,5% **TOTAL:**
 Miso: 5 25,0% Miso+Oxitoc: 3 15,0% Oxitoc: 10 50,0% Dinoprostona: 1 5,0% Dinopr+Oxitoc: 1 5,0%

Porcentaje de Cesáreas en Inducciones: 30,0%
 Miso: 1 20,0% Miso+Oxitoc: 2 66,7% Oxitoc: 2 20,0% Dinoprostona: 1 ### Dinopr+Oxitoc: 0 0,0%

Motivo de Inducciones:

GVP:	6	30,0%
RPM:	7	35,0%
CIR:	2	10,0%
Oligoamnios:	1	5,0%
Meconio:	3	15,0%
RCTG anormal:		0,0%
R.P.B.F.:		0,0%
E.H.E.:	1	5,0%
Diabetes:		0,0%
A.O.Desfavor.:		0,0%
Interés Matern:		0,0%
Interés Fetal:		0,0%
Otras:		0,0%
TOTAL:	20	

EPIDURALES: 36 38,7% Eutóc: 24 66,7% Cesáreas: 8 22,2%
 Vacuo: 3 8,3% Forcep: 1 2,8% Ayuda manual: 0 0,0%
 Instrument Epidurales: 4 11,1% Instrument No Epidural: 2 3,5%

TERMINACIÓN DE LOS PARTOS:

EUTCOCICOS:	68	73,1%			
CESÁREAS:	19	20,4%	Ces. Electivas:	7	36,8%
INSTRUMENT:	6	6,5%	Vacuo:	4	66,7%
NALGAS:		0,0%	Forcep:	2	33,3%
OTROS:		0,0%	V-F:		0,0%
TOTAL:	93		Ventosa fallida que finalizó en cesárea		

Cesárea Podálica: 2
 Mujeres con cesárea anterior: 12

Cesár. Gemelar: 1
 Partos vaginales tras C.A.: 6 50,0%

L.T. cesárea: 4
 L.T. postparto:

Fiebre intraparto con epidural: 6 16,7%
Fiebre intraparto sin epidural: 2 3,5%
Fiebre intraparto total: 8 8,6%

PATOLOGÍA MATERNA PUERPERAL: 33 35,5%

Anemia:	23	69,7%	
Fiebre:	2	6,1%	
Anemia+Fiebre:		0,0%	
E.M.P.:		0,0%	
Legrado:	2	6,1%	
Metrorragia:	1	3,0%	
Transfusión:		0,0%	
Resutura:		0,0%	
Otras:	8	24,2%	1 rotura uterina, 1 retención orina, 1 ITU, 1 hematometra, 4 extrac man plac
DUPLICADAS:	3		Anemia + legrado; 2 legrados puerperales tras extracción manual de plac
TOTAL:	33		

RECIÉN NACIDOS: 94

nº pH: 21 22,3% Traslado CHT: 2 2,1% Apgar-5 < 7: 3 3,2%

MORTALIDAD feto-neonatal:

MAPEC: 1 MAPIC: MIP: MNP: MNT:

MORBILIDAD neonatal:

Ingreso en Neonatos: 14

R.P.B.F.:		
Quejido:		
Distress Resp:	0	
Depresión Neo	0	
Riesgo infecc.:	1	
Ictericia:	1	
Hipoglucemia:	1	
Prematuro:	4	3 con bajo peso para EG
Bajo peso/CIR:	2	
Sdr Avery:		
Aspir Meconial:	1	depresión neonatal + trombopenia
Malfomación:	2	Polimalformado (éxitus 2h), pie equinvaro derecho (gemelar)
Otras:	2	1 persistencia Ductus Arterioso + CIA, 1 estenosis nasal congénita

TOTAL MORBI-MORTALIDAD: 15 16,0%

OBSERVACIONES:


24,7%

41,5%
22,3%
9,6%
0,0%

0
0,0%

93

centa
nta



--

Médico Responsable: V GONZALEZ

Nº partos: 96 **Media/día:** 3,10
Gemelares: 0 **Nº R.N.:** 96

SEXO: Varón: 42 43,8% Mujer: 54 56,3%

EDAD MATERNA: < 20 a: 6 6,3% 20-34: 74 77,1% > 34 a: 16

EDAD GESTACIONAL:		PESO FETAL:		
< 28 s:	0 0,0%	500-999 g:	0 0,0%	3000-3499 g: 30
28-36 s:	5 5,2%	1000-1499 g:	0 0,0%	3500-3999 g: 32
37-40 s:	73 76,0%	1500-1999 g:	1 1,0%	4000-4499 g: 8
41 s:	18 18,8%	2000-2499 g:	5 5,2%	> 4500 g: 1
> 42 s:	0 0,0%	2500-2999 g:	19 19,8%	
TOTAL:	96			TOTAL: 96

SITUACIÓN-PRESENTAC: Longitudinal: 96 Oblicua: 0 Trasversa:
 Vértex: 92 95,8% Podalic: 3 3,1% Poster: 1 1,0%
 Otros:

PARIDAD: 1P: 44 2P: 36 3P: 12 4P: 1 5P: 0 > 6P:
 Total: 96 45,8% 37,5% 12,5% 1,0% 0,0%

COMIENZO:	Esponáneos:	75 78,1%	Estim. Oxitoc.:	18 24,0%	
	Cesár .Elect:	4 4,2%	Inducidos:	17 17,7%	TOTAL:
Miso: 2	Miso+Oxitoc:	5 29,4%	Oxitoc: 6	Dinoprostona: 0	Dinopr+Oxitoc: 4
11,8%			35,3%	0,0%	23,5%

Porcentaje de Cesáreas en Inducciones: 23,5%

Miso: 0	Miso+Oxitoc: 1	Oxitoc: 1	Dinoprostona: 0	Dinopr+Oxitoc: 2
0,0%	20,0%	16,7%	###	50,0%

Motivo de Inducciones:

GVP:	4	23,5%
RPM:	8	47,1%
CIR:	1	5,9%
Oligoamnios:	2	11,8%
Meconio:	0	0,0%
RCTG anormal:	0	0,0%
R.P.B.F.:	0	0,0%
E.H.E.:	2	11,8%
Diabetes:	0	0,0%
A.O.Desfavor.:	0	0,0%
Interés Matern:	0	0,0%
Interés Fetal:	0	0,0%
Otras:	0	0,0%
TOTAL:	17	

EPIDURALES: 37 38,5%	Eutóc: 29 78,4%	Cesáreas: 4 10,8%
Vacuo: 4 10,8%	Forcep: 0 0,0%	Ayuda manual: 0 0,0%
Instrument Epidurales: 4 10,8%	Instrument No Epidural: 0 0,0%	

TERMINACIÓN DE LOS PARTOS:

EUTOCICOS: 80 82,5%			
CESÁREAS: 12 12,4%	Ces. Electivas: 5 41,7%	Ces. Intraparto: 7 58,3%	
INSTRUMENT: 4 4,1%	Vacuo: 3 75,0%	Forcep 0 0,0%	V-F: 0 0,0%
NALGAS: 0 0,0%			
OTROS: 1 1,0%	VF-NORMAL		
TOTAL: 97			

Cesárea Podálica: 3
Mujeres con cesárea anterior: 9

Cesár. Gemelar: 0
Partos vaginales tras C.A.: 8 88,9%

L.T. cesárea: 1
L.T. postparto: 0

Fiebre intraparto con epidural: 3 8,1%
Fiebre intraparto sin epidural: 1 1,7%
Fiebre intraparto total: 4 4,2%

PATOLOGÍA MATERNA PUERPERAL: 46 47,9%

Anemia:	42	91,3%	
Fiebre:		0,0%	
Anemia+Fiebre:		0,0%	
E.M.P.:	1	2,2%	
Legrado:		0,0%	
Metrorragia:	1	2,2%	
Transfusión:		0,0%	
Resutura:		0,0%	
Otras:	2	4,3%	ITU-EDEMA VULVAR
DUPLICADAS:			

TOTAL: 46

RECIÉN NACIDOS: 96

nº pH: 19 19,8% Traslado CHT: 1 1,0% Apgar-5 < 7: 1 1,0%

MORTALIDAD feto-neonatal:

MAPEC: 0 MAPIC: 0 MIP: 0 MNP: 0 MNT:

MORBILIDAD neonatal:

Ingreso en Neonatos: 8

R.P.B.F.:		
Quejido:		
Distress Resp:	3	
Depresión Neo		
Riesgo infecc.:	1	
Ictericia:	3	
Hipoglucemia:		
Prematuro:		
Bajo peso/CIR:	1	
Sdr Avery:		
Aspir Meconial:		
Malfomación:		
Otras:		

TOTAL MORBI-MORTALIDAD: 8 8,3%

OBSERVACIONES:

0

--

Médico Responsable: ZARAUZ

Nº partos: 108 Media/día: 3,48
Gemelares: 0 **Nº R.N.:** 108

SEXO: Varón: 65 60,2% Mujer: 43 39,8%

EDAD MATERNA: < 20 a: 5 4,6% 20-34: 78 72,2% > 34 a: 25

EDAD GESTACIONAL:		PESO FETAL:	
< 28 s:	0 0,0%	500-999 g:	0 0,0%
28-36 s:	5 4,6%	1000-1499 g:	0 0,0%
37-40 s:	85 78,7%	1500-1999 g:	0 0,0%
41 s:	18 16,7%	2000-2499 g:	3 2,8%
> 42 s:	0 0,0%	2500-2999 g:	22 20,4%
TOTAL:	108		
			TOTAL: 108

SITUACIÓN-PRESENTAC: Longitudinal: 107 Oblicua: 0 Trasversa:
 Vértex: 107 99,1% Podalic: 0,0% Poster: 0,0%
 Otros: 1 Acromial

PARIDAD: 1P: 57 2P: 30 3P: 17 4P: 2 5P: 1 > 6P:
 Total: 108 52,8% 27,8% 15,7% 1,9% 0,9%

COMIENZO:	Esponáneos:	81 75,0%	Estim. Oxitoc.:	16 19,8%	
	Cesár .Elect:	5 4,6%	Inducidos:	22 20,4%	TOTAL:
Miso: 5	Miso+Oxitoc:	5 22,7%	Oxitoc: 10	45,5%	Dinoprostona: 0
22,7%					Dinopr+Oxitoc: 2
					9,1%

Porcentaje de Cesáreas en Inducciones: 22,7%

Miso: 0	Miso+Oxitoc: 3	Oxitoc: 1	Dinoprostona: 0	Dinopr+Oxitoc: 1
0,0%	60,0%	10,0%	###	50,0%

Motivo de Inducciones:

GVP:	7	31,8%
RPM:	9	40,9%
CIR:		0,0%
Oligoamnios:	1	4,5%
Meconio:	2	9,1%
RCTG anormal:		0,0%
R.P.B.F.:		0,0%
E.H.E.:	1	4,5%
Diabetes:	1	4,5%
A.O.Desfavor.:		0,0%
Interés Matern:		0,0%
Interés Fetal:		0,0%
Otras:	1	4,5%
TOTAL:	22	

Presentación inestable.

EPIDURALES: 36 33,3%	Eutóc: 23 63,9%	Cesáreas: 10 27,8%
Vacuo: 2 5,6%	Forcep: 1 2,8%	Ayuda manual: 0 0,0%
Instrument Epidurales: 3 8,3%	Instrument No Epidural: 8 11,1%	

TERMINACIÓN DE LOS PARTOS:

EUTCOCICOS: 80 74,1%			
CESÁREAS: 17 15,7%	Ces. Electivas: 5 29,4%	Ces. Intraparto: 12 70,6%	
INSTRUMENT: 11 10,2%	Vacuo: 9 81,8%	Forcep: 2 18,2%	V-F: 0 0,0%
NALGAS: 0 0,0%			
OTROS: 0 0,0%			
TOTAL: 108			

Cesárea Podálica: 0
Mujeres con cesárea anterior: 14

Cesár. Gemelar: 0
Partos vaginales tras C.A.: 10 71,4%

L.T. cesárea: 4
L.T. postparto: 0

Fiebre intraparto con epidural: 3 8,3%
Fiebre intraparto sin epidural: 0 0,0%
Fiebre intraparto total: 3 2,8%

PATOLOGÍA MATERNA PUERPERAL: 36 33,3%

Anemia:	32	88,9%	
Fiebre:		0,0%	
Anemia+Fiebre:		0,0%	
E.M.P.:		0,0%	
Legrado:		0,0%	
Metrorragia:	1	2,8%	
Transfusión:	3	8,3%	
Resutura:		0,0%	
Otras:		0,0%	
DUPLICADAS:			

TOTAL: 36

RECIÉN NACIDOS: 108

nº pH: 18 16,7% Traslado CHT: 1 0,9% Apgar-5 < 7: 7 6,5%

MORTALIDAD feto-neonatal:

MAPEC: 2 MAPIC: 0 MIP: MNP: MNT:


MORBILIDAD neonatal:

Ingreso en Neonatos: 12

R.P.B.F.:	1	Cianosis facial.
Quejido:		
Distress Resp:	3	
Depresión Neo		
Riesgo infecc.:		
Ictericia:	2	
Hipoglucemia:		
Prematuro:	2	
Bajo peso/CIR:	1	
Sdr Avery:	1	
Aspir Meconial:		
Malfomación:		
Otras:	2	Fiebre de sed (tras alta materna). Episodio paroxístico no epiléptico.

TOTAL MORBI-MORTALIDAD: 14 13,0%

OBSERVACIONES:



--

Médico Responsable: PABLO

Nº partos: 99 Media/día: 3,30
Gemelares: 1 **Nº R.N.:** 100

SEXO: Varón: 47 47,0% Mujer: 53 53,0%

EDAD MATERNA: < 20 a: 6 6,1% 20-34: 69 69,7% > 34 a: 24

EDAD GESTACIONAL:	PESO FETAL:	
< 28 s: 0 0,0%	500-999 g: 0 0,0%	3000-3499 g: 49
28-36 s: 5 5,1%	1000-1499 g: 0 0,0%	3500-3999 g: 25
37-40 s: 70 70,7%	1500-1999 g: 1 1,0%	4000-4499 g: 5
41 s: 23 23,2%	2000-2499 g: 4 4,0%	> 4500 g: 2
> 42 s: 1 1,0%	2500-2999 g: 14 14,0%	
TOTAL: 99		TOTAL: 100

SITUACIÓN-PRESENTAC: Longitudinal: 99 Oblicua: 0 Trasversa: 0
 Vértex: 97 97,0% Podalic: 2 2,0% Poster: 0 0,0%
 Otros: 0

PARIDAD: 1P: 45 2P: 42 3P: 10 4P: 2 5P: 0 > 6P: 0
 Total: 99 45,5% 42,4% 10,1% 2,0% 0,0%

COMIENZO:	Esponáneos: 70 70,7%	Estim. Oxitoc.: 20 28,6%	
	Cesár .Elect: 8 8,1%	Inducidos: 21 21,2%	TOTAL:
Miso: 5 23,8%	Miso+Oxitoc: 6 28,6%	Oxitoc: 6 28,6%	Dinoprostona: 2 9,5%
			Dinopr+Oxitoc: 2 9,5%

Porcentaje de Cesáreas en Inducciones: 38,1%

Miso: 1 20,0%	Miso+Oxitoc: 3 50,0%	Oxitoc: 2 33,3%	Dinoprostona: 2 ###	Dinopr+Oxitoc: 0 0,0%
--------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------------

Motivo de Inducciones:

GVP:	8	38,1%	
RPM:	7	33,3%	
CIR:		0,0%	
Oligoamnios:		0,0%	
Meconio:		0,0%	
RCTG anormal:		0,0%	
R.P.B.F.:		0,0%	
E.H.E.:	3	14,3%	
Diabetes:	1	4,8%	
A.O.Desfavor.:		0,0%	
Interés Matern:		0,0%	
Interés Fetal:	1	4,8%	
Otras:	1	4,8%	METRORRAGIA
TOTAL:	21		

EPIDURALES: 44 44,4%	Eutóc: 27 61,4%	Cesáreas: 9 20,5%
Vacuo: 8 18,2%	Forcep: 0 0,0%	Ayuda manual: 0 0,0%
Instrument Epidurales: 8 18,2%	Instrument No Epidural: 2 3,6%	

TERMINACIÓN DE LOS PARTOS:

EUTOCICOS: 69 69,7%		
CESÁREAS: 20 20,2%	Ces. Electivas: 4 20,0%	Ces. Intraparto: 0 0,0%
INSTRUMENT: 10 10,1%	Vacuo: 9 90,0%	Forcep: 1 10,0%
NALGAS: 0 0,0%		V-F: 0 0,0%
OTROS: 0 0,0%		
TOTAL: 99		

Cesárea Podálica: 2
Mujeres con cesárea anterior: 7

Cesár. Gemelar: 1
Partos vaginales tras C.A.: 3 42,9%

L.T. cesárea: 3
L.T. postparto: 1

Fiebre intraparto con epidural: 7 15,9%
Fiebre intraparto sin epidural: 2 3,6%
Fiebre intraparto total: 9 9,1%

PATOLOGÍA MATERNA PUERPERAL: 0,0%

Anemia:	30	88,2%	
Fiebre:	1	2,9%	
Anemia+Fiebre:		0,0%	
E.M.P.:	1	2,9%	
Legrado:		0,0%	
Metrorragia:	1	2,9%	
Transfusión:	1	2,9%	
Resutura:		0,0%	
Otras:		0,0%	
DUPLICADAS:			

TOTAL: 34

RECIÉN NACIDOS: 100

nº pH: 0,0% Traslado CHT: 2 2,0% Apgar-5 < 7: 0,0%

MORTALIDAD feto-neonatal:

MAPEC: MAPIC: MIP: MNP: MNT:

MORBILIDAD neonatal:

Ingreso en Neonatos: 10

R.P.B.F.:	2	
Quejido:	2	
Distress Resp:	1	
Depresión Neo	1	
Riesgo infecc.:		
Ictericia:	1	
Hipoglucemia:		
Prematuro:	1	
Bajo peso/CIR:		
Sdr Avery:		
Aspir Meconial:		
Malfomación:		
Otras:	2	TEMBLORES/ ENCEFALOPATIA

TOTAL MORBI-MORTALIDAD: 10 10,0%


OBSERVACIONES:

24,2%

49,0%
25,0%
5,0%
2,0%

0,0%

99



--

Médico Responsable: DELGADO

Nº partos: 98 **Media/día:** 3,16
Gemelares: 1 **Nº R.N.:** 99

SEXO: Varón: 56 56,6% Mujer: 43 43,4%

EDAD MATERNA: < 20 a: 3 3,1% 20-34: 66 67,3% > 34 a: 29

EDAD GESTACIONAL:	PESO FETAL:	
< 28 s: 0 0,0%	500-999 g: 0 0,0%	3000-3499 g: 40
28-36 s: 9 9,2%	1000-1499 g: 0 0,0%	3500-3999 g: 31
37-40 s: 75 76,5%	1500-1999 g: 0 0,0%	4000-4499 g: 8
41 s: 14 14,3%	2000-2499 g: 7 7,1%	> 4500 g: 0
> 42 s: 0 0,0%	2500-2999 g: 13 13,1%	
TOTAL: 98		TOTAL: 99

SITUACIÓN-PRESENTAC: Longitudinal: 99 Oblicua: 0 Trasversa:
 Vértex: 94 94,9% Podalic: 4 4,0% Poster: 1 1,0%
 Otros:

PARIDAD: 1P: 39 2P: 39 3P: 16 4P: 2 5P: 1 > 6P:
 Total: 98 39,8% 39,8% 16,3% 2,0% 1,0%

COMIENZO: Espontáneos: 70 71,4% Estim. Oxitoc.: 10 14,3%
 Cesár .Elect: 9 9,2% Inducidos: 19 19,4% **TOTAL:**
 Miso: 2 Miso+Oxitoc: 1 Oxitoc: 12 Dinoprostona: 4 Dinopr+Oxitoc: 0
 10,5% 5,3% 63,2% 21,1% 0,0%

Porcentaje de Cesáreas en Inducciones: 26,3%
 Miso: 1 Miso+Oxitoc: 1 Oxitoc: 3 Dinoprostona: 0 Dinopr+Oxitoc: 0
 50,0% ### 25,0% 0,0% ###

Motivo de Inducciones:

GVP:	3	15,8%	
RPM:	8	42,1%	
CIR:	1	5,3%	
Oligoamnios:	2	10,5%	
Meconio:		0,0%	
RCTG anormal:		0,0%	
R.P.B.F.:	1	5,3%	
E.H.E.:	3	15,8%	1 preeclampsia leve
Diabetes:		0,0%	
A.O.Desfavor.:		0,0%	
Interés Matern:		0,0%	
Interés Fetal:		0,0%	
Otras:	1	5,3%	1 metrorragia
TOTAL:	19		

EPIDURALES: 32 32,7% Eutóc: 18 56,3% Cesáreas: 7 21,9%
 Vacuo: 7 21,9% Forcep: 0 0,0% Ayuda manual: 0 0,0%
 Instrument Epidurales: 7 21,9% Instrument No Epidural: 4 6,1%

TERMINACIÓN DE LOS PARTOS:

EUTCOCICOS:	69	69,7%						
CESÁREAS:	19	19,2%	Ces. Electivas:	10	52,6%	Ces. Intraparto:	9	47,4%
INSTRUMENT:	11	11,1%	Vacuo:	11	###	Forcep	0	0,0%
NALGAS:		0,0%				V-F:	0	0,0%
OTROS:		0,0%						
TOTAL:	99							

Cesárea Podálica: 4
Mujeres con cesárea anterior: 11

Cesár. Gemelar: 0
Partos vaginales tras C.A.: 5 45,5%

L.T. cesárea: 1
L.T. postparto: 0

Fiebre intraparto con epidural: 2 6,3%
Fiebre intraparto sin epidural: 1 1,5%
Fiebre intraparto total: 3 3,1%

PATOLOGÍA MATERNA PUERPERAL: 40 40,8%

Anemia:	39	97,5%	
Fiebre:		0,0%	
Anemia+Fiebre:		0,0%	
E.M.P.:	1	2,5%	
Legrado:		0,0%	
Metrorragia:		0,0%	
Transfusión:	2	5,0%	
Resutura:		0,0%	
Otras:	2	5,0%	1 HTA, 1 Fractura de pelvis
DUPLICADAS:	4		

TOTAL: 40

RECIÉN NACIDOS: 99

nº pH: 10 10,1% Traslado CHT: 3 3,0% Apgar-5 < 7: 1 1,0%

MORTALIDAD feto-neonatal:

MAPEC: 1 MAPIC: 0 MIP: 0 MNP: 0 MNT:

MORBILIDAD neonatal:

Ingreso en Neonatos: 2

R.P.B.F.:		
Quejido:		
Distress Resp:		
Depresión Neo		
Riesgo infecc.:		
Ictericia:		
Hipoglucemia:	1	
Prematuro:		
Bajo peso/CIR:	1	
Sdr Avery:		
Aspir Meconial:		
Malfomación:	1	1 Displasia pabellón auricular
Otras:		

TOTAL MORBI-MORTALIDAD: 4 4,0%

OBSERVACIONES:

3 traslados a CHT: 1 por sospecha de cardiopatía, 1 por riesgo infeccioso, 1 por prematuridad.
1 feto muerto anteparto extraclínica por accidente de tráfico. Fractura de pelvis de la gestante.

29,6%

40,4%
31,3%
8,1%
0,0%

0

1
1,0%

98

0

--

Médico Responsable: Dra. Manrique

Nº partos: 98 **Media/día:** 3,27
Gemelares: 1 **Nº R.N.:** 99

SEXO: Varón: 49 49,5% **Mujer:** 50 50,5%

EDAD MATERNA: < 20 a: 9 9,2% 20-34: 62 63,3% > 34 a: 27

EDAD GESTACIONAL:		PESO FETAL:	
< 28 s:	1 1,0%	500-999 g:	0 0,0%
28-36 s:	6 6,1%	1000-1499 g:	0 0,0%
37-40 s:	69 70,4%	1500-1999 g:	3 3,0%
41 s:	22 22,4%	2000-2499 g:	2 2,0%
> 42 s:	0 0,0%	2500-2999 g:	14 14,1%
TOTAL:	98	TOTAL:	99

SITUACIÓN-PRESENTAC: Longitudinal: 98 Oblicua: 0 **Trasversa:**
 Vértex: 95 96,0% Podalic: 1 1,0% **Poster:** 1 1,0%
 Otros: 1 **Vértice-transversa (gemelar)**

PARIDAD: 1P: 48 49,0% 2P: 39 39,8% 3P: 9 9,2% 4P: 2 2,0% 5P: 0 0,0% > 6P:
Total: 98

COMIENZO:	Esponáneos:	73 74,5%	Estim. Oxitoc.:	8 11,0%	
	Cesár .Elect:	4 4,1%	Inducidos:	21 21,4%	TOTAL:
Miso:	Miso+Oxitoc:	3 14,3%	Oxitoc:	6 28,6%	Dinoprostona:
				3 14,3%	Dinopr+Oxitoc:
					1 4,8%

Porcentaje de Cesáreas en Inducciones: 14,3%
 Miso: 0 0,0% Miso+Oxitoc: 0 0,0% Oxitoc: 2 33,3% Dinoprostona: 0 0,0% Dinopr+Oxitoc: 1 ###

Motivo de Inducciones: 21

GVP:	7 33,3%	
RPM:	4 19,0%	
CIR:	0 0,0%	
Oligoamnios:	3 14,3%	
Meconio:	1 4,8%	
RCTG anormal:	0 0,0%	
R.P.B.F.:	0 0,0%	
E.H.E.:	4 19,0%	2 con sospecha de CIR-II
Diabetes:	0 0,0%	
A.O.Desfavor.:	0 0,0%	
Interés Matern:	0 0,0%	
Interés Fetal:	0 0,0%	
Otras:	2 9,5%	1 polihidramnios+sospecha de macrosoma; 1 feto muerto anteparto
TOTAL:	21	

EPIDURALES: 42 42,9% **Eutóc:** 36 85,7% **Cesáreas:** 2 4,8%
 Vacuo: 3 7,1% **Forcep:** 1 2,4% **Ayuda manual:** 0 0,0%
Instrument Epidurales: 4 9,5% **Instrument No Epidural:** 5 8,9%

TERMINACIÓN DE LOS PARTOS:

EUTCOCICOS:	80 81,6%	
CESÁREAS:	9 9,2%	Ces. Electivas: 5 55,6% Ces. Intraparto: 4 44,4%
INSTRUMENT:	9 9,2%	Vacuo: 8 88,9% Forcep 1 11,1% V-F: 0 0,0%
NALGAS:	0 0,0%	
OTROS:	0 0,0%	
TOTAL:	98	

Cesárea Podálica: 1
 Mujeres con cesárea anterior: 5

Cesár. Gemelar: 1
 Partos vaginales tras C.A.: 3 60,0%

L.T. cesárea: 3
 L.T. postparto: 0

Fiebre intraparto con epidural: 4 9,5%
Fiebre intraparto sin epidural: 0 0,0%
Fiebre intraparto total: 4 4,1%

PATOLOGÍA MATERNA PUERPERAL: 40 40,8%

Anemia:	36	90,0%	
Fiebre:	1	2,5%	
Anemia+Fiebre:		0,0%	
E.M.P.:		0,0%	
Legrado:	1	2,5%	
Metrorragia:	2	5,0%	
Transfusión:		0,0%	
Resutura:		0,0%	
Otras:		0,0%	
DUPLICADAS:			

TOTAL: 40

RECIÉN NACIDOS: 99

nº pH: 61 61,6% Traslado CHT: 0 0,0% Apgar-5 < 7: 2 2,0%

MORTALIDAD feto-neonatal:

MAPEC: 1 MAPIC: MIP: MNP: MNT:

MORBILIDAD neonatal:

Ingreso en Neonatos: 17

R.P.B.F.:		
Quejido:		
Distress Resp:		
Depresión Neo		
Riesgo infecc.:	5	1 además con hiperbilirrubinemia, policitemia, cefalohematoma, madre DM
Ictericia:	4	
Hipoglucemia:		
Prematuro:	2	
Bajo peso/CIR:	1	También prematuro
Sdr Avery:		
Aspir Meconial:		
Malfomación:	1	Probable secuestro pulmonar
Otras:	4	1 MAPEC; 1 Intolerancia digestiva+problema social (adopción); 1 oliguria; 1 e

TOTAL MORBI-MORTALIDAD: 18 18,2%

OBSERVACIONES:

27,6%

45,5%
27,3%
6,1%
2,0%

1

0
0,0%

98

Médico Responsable: BARQUEROS

Nº partos: 95 **Media/día:** 3,06
Gemelares: 4 **Nº R.N.:** 99

SEXO: Varón: 62 62,6% Mujer: 37 37,4%

EDAD MATERNA: < 20 a: 7 7,4% 20-34: 69 72,6% > 34 a: 19

EDAD GESTACIONAL:		PESO FETAL:		
< 28 s:	0 0,0%	500-999 g:	0 0,0%	3000-3499 g: 38
28-36 s:	6 6,3%	1000-1499 g:	0 0,0%	3500-3999 g: 25
37-40 s:	74 77,9%	1500-1999 g:	0 0,0%	4000-4499 g: 9
41 s:	15 15,8%	2000-2499 g:	6 6,1%	> 4500 g: 0
> 42 s:	0 0,0%	2500-2999 g:	21 21,2%	
TOTAL:	95			TOTAL: 99

SITUACIÓN-PRESENTAC: Longitudinal: 95 Oblicua: 0 Trasversa:
 Vértex: 93 93,9% Podalic: 5 5,1% Poster: 1 1,0%
 Otros:

PARIDAD: 1P: 41 2P: 44 3P: 6 4P: 3 5P: 0 > 6P:
 Total: 95 43,2% 46,3% 6,3% 3,2% 0,0%

COMIENZO: Espontáneos: 70 73,7% Estim. Oxitoc.: 13 18,6%
 Cesár .Elect: 5 5,3% Inducidos: 20 21,1% **TOTAL:**
 Miso: 7 Miso+Oxitoc: 4 Oxitoc: 8 Dinoprostona: 0 Dinopr+Oxitoc: 1
 35,0% 20,0% 40,0% 0,0% 5,0%

Porcentaje de Cesáreas en Inducciones: 45,0%
 Miso: 2 Miso+Oxitoc: 1 Oxitoc: 5 Dinoprostona: 0 Dinopr+Oxitoc: 1
 28,6% 25,0% 62,5% ### ###

Motivo de Inducciones:

GVP:	5	25,0%	
RPM:	5	25,0%	
CIR:	1	5,0%	
Oligoamnios:	1	5,0%	
Meconio:	1	5,0%	
RCTG anormal:		0,0%	
R.P.B.F.:		0,0%	
E.H.E.:	2	10,0%	
Diabetes:		0,0%	
A.O.Desfavor.:		0,0%	
Interés Matern:	2	10,0%	
Interés Fetal:		0,0%	
Otras:	3	15,0%	1 colestasis hepática, 1 hidramnios y sp de macrosomía, 1 gemelar a término
TOTAL:	20		

EPIDURALES: 36 37,9% Eutóc: 25 69,4% Cesáreas: 9 25,0%
 Vacuo: 2 5,6% Forcep: 0 0,0% Ayuda manual: 0 0,0%
 Instrument Epidurales: 2 5,6% Instrument No Epidural: 3 5,1%

TERMINACIÓN DE LOS PARTOS:

EUTCOCICOS:	66	69,5%				
CESÁREAS:	23	24,2%	Ces. Electivas: 9	39,1%	Ces. Intraparto: 14	60,9%
INSTRUMENT:	5	5,3%	Vacuo: 3	60,0%	Forcep 0	0,0%
NALGAS:	1	1,1%	Ayuda manual			
OTROS:	0	0,0%			V-F: 2	40,0%
TOTAL:	95					

Cesárea Podálica: 4
 Mujeres con cesárea anterior: 9

Cesár. Gemelar: 3
 Partos vaginales tras C.A.: 2 22,2%

L.T. cesárea: 4
 L.T. postparto: 0

Fiebre intraparto con epidural: 2 5,6%
Fiebre intraparto sin epidural: 0 0,0%
Fiebre intraparto total: 2 2,1%

PATOLOGÍA MATERNA PUERPERAL: 38 40,0%

Anemia:	31	81,6%	
Fiebre:	1	2,6%	
Anemia+Fiebre:		0,0%	
E.M.P.:	1	2,6%	
Legrado:		0,0%	
Metrorragia:		0,0%	
Transfusión:	2	5,3%	
Resutura:		0,0%	
Otras:	5	13,2%	1 Hematoma de pared, 3 Retención urinaria, 1 seroma
DUPLICADAS:	2		
TOTAL:	38		

RECIÉN NACIDOS: 99

nº pH: 1 1,0% Traslado CHT: 1 1,0% Apgar-5 < 7: 2 2,0%

MORTALIDAD feto-neonatal:

MAPEC: 1 MAPIC: 0 MIP: 0 MNP: 0 MNT:

MORBILIDAD neonatal:

Ingreso en Neonatos: 10

R.P.B.F.:		
Quejido:	0	
Distress Resp:		
Depresión Neo	1	1 Afectación neonatal por analgesia materna
Riesgo infecc.:	2	
Ictericia:	2	
Hipoglucemia:	1	
Prematuro:	1	
Bajo peso/CIR:		
Sdr Avery:	2	
Aspir Meconial:		
Malfomación:		
Otras:	1	Febrícula por sed

TOTAL MORBI-MORTALIDAD: 11 11,1%

OBSERVACIONES:

1 RN fractura de clavícula.
 Hª 87928: Feto muerto anteparto extraclínica

0

--

Cesárea Podálica:	32	Cesár. Gemelar:	12
Mujeres con cesárea anterior:	105	Partos vaginales tras C.A.:	61 58,1%
Una sola CA y no PV previo		PV tras una sola CA y no PV previo	

L.T. cesárea:	42	Fiebre intraparto con epidural:	51 12,3%
L.T. postparto:	2	Fiebre intraparto sin epidural:	12 1,6%
		Fiebre intraparto total:	63 5,4%

PATOLOGÍA MATERNA PUERPERAL: 387 33,2%

Anemia:	362	86,4%
Fiebre:	13	3,1%
Anemia+Fiebre:	0	0,0%
E.M.P.:	4	1,0%
Legrado:	3	0,7%
Metrorragia:	12	2,9%
Transfusión:	13	3,1%
Resutura:	0	0,0%
Otras:	24	5,7%
DUPLICADAS:	12	

TOTAL: 419

RECIÉN NACIDOS: 1182

nº pH: 271 22,9% Traslado CHT: 12 1,0% Apgar-5 < 7: 23 1,9%

MORTALIDAD feto-neonatal:

MAPEC: 9 MAPIC: 0 MIP: 0 MNP: 0 MNT: 0

MORBILIDAD neonatal:

Ingreso en Neonatos: 141

R.P.B.F.:	5
Quejido:	3
Distress Resp:	25
Depresión Neo	7
Riesgo infecc.:	19
Ictericia:	17
Hipoglucemia:	3
Prematuro:	16
Bajo peso/CIR:	10
Sdr Avery:	3
Aspir Meconial:	2
Malfomación:	4
Otras:	27

TOTAL MORBI-MORTALIDAD: 150 12,7%

OBSERVACIONES: