

**Médico Responsable:** VALOIS GONZALEZ

**Nº partos:** 93    **Media/día:** 3,00    **SEXO:**    **Varón:** 41    43,6%  
**Gemelares:** 1    **Nº R.N.:** 94    **Mujer:** 53    56,4%

**EDAD MATERNA:** < 20 a: 5    4,7%    20-34: 67    63,2%    > 34 a: 34    32,1%

**EDAD GESTACIONAL:**

< 28 s: 1    1,1%  
 28-36 s: 6    6,5%  
 37-40 s: 72    77,4%  
 41 s: 13    14,0%  
 > 42 s: 1    1,1%  
**TOTAL:** 93

**PESO FETAL:**

500-999 g: 0    0,0%    3000-3499 g: 35    37,2%  
 1000-1499 g: 0    0,0%    3500-3999 g: 31    33,0%  
 1500-1999 g: 1    1,1%    4000-4499 g: 4    4,3%  
 2000-2499 g: 2    2,1%    > 4500 g: 2    2,1%  
 2500-2999 g: 19    20,2%  
**TOTAL:** 94

**SITUACIÓN-PRESENTAC:**

**Longitudinal:**    **Oblicua:**    **Trasversa:**  
**Vértex:** 88    93,6%    **Podalic:** 1    1,1%    **Poster:** 3    3,2%  
**Otros:** 1    **Podálica-Vertice**

**PARIDAD:**

1P: 45    48,4%    2P: 37    39,8%    3P: 11    11,8%    4P: 0    0,0%    5P: 0    0,0%    > 6P: 0    0,0%  
**Total:** 93

**COMIENZO:**

**Esponáneos:** 68    73,1%    **Estim. Oxitoc.:** 14    20,6%  
**Cesár. Elect:** 5    5,4%    **Inducidos:** 20    21,5%    **TOTAL:** 93  
**Miso:** 9    45,0%    **Miso+Oxitoc:** 3    15,0%    **Oxitoc:** 6    30,0%    **Dinoprostona:** 1    5,0%    **Dinopr+Oxitoc:** 1    5,0%

**Porcentaje de Cesáreas en comienzo espontaneo:** 4    5,5%

**Porcentaje de Cesáreas en Inducciones:** 15,0%

**Miso:** 1    11,1%    **Miso+Oxitoc:** 0    0,0%    **Oxitoc:** 1    16,7%    **Dinoprostona:** 0    0,0%    **Dinopr+Oxitoc:** 1    ###

**Motivo de Inducciones:**

GVP:	4	20,0%	P 3, PO 1
RPM:	7	35,0%	P 3, POx 1, Ox 2
CIR:	1	5,0%	D1
Oligoamnios:	2	10,0%	Ox
Meconio:	1	5,0%	
RCTG anormal:	0	0,0%	
R.P.B.F.:	1	5,0%	Ox
E.H.E.:	2	10,0%	Ox
Diabetes:	1	5,0%	PG
A.O.Desfavor.:	1	5,0%	PG
Interés Matern:		0,0%	
Interés Fetal:		0,0%	
Otras:		0,0%	
<b>TOTAL:</b>	<b>20</b>		

**EPIDURALES:**

32    34,4%    **Eutóc:** 28    87,5%    **Cesáreas:** 4    12,5%  
 Vacuo: 0    0,0%    **Forcep:** 0    0,0%    **Ayuda manual:** 0    0,0%  
**Instrument Epidurales:** 0    0,0%    **Instrument No Epidural:** 4    6,6%

**TERMINACIÓN DE LOS PARTOS:**

<b>EUTOCICOS:</b>	77	82,8%				
<b>CESÁREAS:</b>	12	12,9%	<b>Ces. Electivas:</b> 5    41,7%		<b>Ces. Intraparto:</b> 7    58,3%	
<b>INSTRUMENT:</b>	4	4,3%	<b>Vacuo:</b> 2    50,0%	<b>Forcep</b> 1    25,0%	<b>V-F:</b> 1    25,0%	
<b>NALGAS:</b>		0,0%				
<b>OTROS:</b>		0,0%				
<b>TOTAL:</b>	<b>93</b>					

**Motivos de CE:**

Iterativa 3:	1	20,0%	<b>Gemelar:</b> 1    20,0%
Iterativa 2:	3	60,0%	<b>Podalica:</b> 0    0,0%
Transversa:		0,0%	<b>Solicitud Materna:</b> 0    0,0%
Otras:		0,0%	

88293 (Ite 2): Solicitud materna. 101011:Gemelar (primero podalica). 57798: Ite 2-Transversa

**Motivos de CI:**

RPBF	4	57,1%	<b>Desproporcion</b>	1	14,3%
No progresion	1	14,3%	<b>Fracaso Induccion</b>		0,0%
Transversa:		0,0%	<b>Solicitud Materna:</b>		0,0%
Podálica:		0,0%	<b>Abruptio:</b>		0,0%
Iterativa 2	1	14,3%	<b>164338 Ite 2 (Solicitud materna)</b>		

**Cesárea Podálica:** 1    100%  
**Mujeres con cesárea anterior:** 0    0,0%  
**Una sola CA y no PV previo** 0    0,0%

**Ces. Gemelar:** 1    100%  
**Partos vaginales tras C.A.:** 0    ###  
**PV tras una sola CA y no PV previo** 0    ###

**L.T. cesárea:** 1  
**L.T. postparto:** 0

**Fiebre intraparto con epidural:** 3    9,4%  
**Fiebre intraparto sin epidural:** 1    1,6%

**PATOLOGÍA MATERNA PUERPERAL:**

Número de puérperas, si más de una patología, poner en duplicadas, no en individuales

Anemia:	34	7,9%	
Anemia+Fiebre:	3	8,3%	
E.M.P.:		0,0%	
Endometritis		0,0%	
Fiebre:		0,0%	
Histerectomía		0,0%	
Legrado:		0,0%	
Metrorragia:		0,0%	
Reingreso		0,0%	
Reintervención		0,0%	
Resutura:		0,0%	
Retención orina		0,0%	
Seroma		0,0%	
Transfusión:		0,0%	
UCI		0,0%	
<b>DUPLICADAS:</b>		0,0%	
Otras:	1	2,6%	Hemorroides

TOTAL: 38 40,9%

**PATOLOGIA OBSTETRICA:**

Preeclampsia		0,0%	Diabetes		0,0%
Otros EHE		0,0%	Oligoamnios		0,0%
Amnionitis		0,0%	CIR		0,0%
A.P.P.		0,0%	aaaaaaaaa		0,0%
Patolog. médica		0,0%	UCI		0,0%

**RECIÉN NACIDOS:**

94 n° pH: 0,0% Apgar-5 < 7: 0,0%

**MORTALIDAD feto-neonatal:**

Fetos 500-999: Fetos >1000 g: Traslado CHT: 0,0%  
 Neonatos + < 7 días: Neonatos + 7-28 días:  
 MAPEC: 0 MAPIC: 0 MIP: 0 MNP: 0 MNT: 0

**MORBILIDAD neonatal:**

**MOTIVO PRINCIPAL DE INGRESO EN PEDIATRIA.**

Ingreso en Neonatos: 17 Número de RN, si más de una patología poner en duplicadas, señalando patología.

Aspir Meconial:		
Bajo peso/CIR:		
Depresión Neo		
Deshidratación		
Distress Resp:	2	
Fiebre		
Hijo diabética		
Hipoglucemia:	3	
Ictericia:	4	
Malfomación:		
Policitemia		
Prematuro:	1	
Quejido:		
R.P.B.F		
Riesgo infecc.:	4	
Sdr Avery:		
Sepsis		
<b>DUPLICADAS:</b>		
Otras:	3	Poliglobulia. Policitemia. Intolerancia digestiva.

TOTAL MORBI-MORTALIDAD: 17 18,1%

**OBSERVACIONES:**


Gestantes en tto con progesterona por antecedentes de PP: Numero de Historia y Semana Gestación:

Gestantes en tto con aspirina por antecedentes de EHE: Numero de historia y Semana de Gestación:

**Médico Responsable:** ROSARIO REDONDO AGUILAR

**Nº partos:** 77 **Media/día:** 2,75 **SEXO:** Varón: 38 48,7%  
**Gemelares:** 1 **Nº R.N.:** 78 **Mujer:** 40 51,3%

**EDAD MATERNA:** < 20 a: 0 0,0% 20-34: 52 67,5% > 34 a: 25 32,5%

**EDAD GESTACIONAL:**

< 28 s: 0 0,0%  
 28-36 s: 6 7,8%  
 37-40 s: 61 79,2%  
 41 s: 10 13,0%  
 > 42 s: 0 0,0%  
**TOTAL:** 77

**PESO FETAL:**

500-999 g: 0 0,0% 3000-3499 g: 30 38,5%  
 1000-1499 g: 0 0,0% 3500-3999 g: 22 28,2%  
 1500-1999 g: 2 2,6% 4000-4499 g: 4 5,1%  
 2000-2499 g: 3 3,8% > 4500 g: 0 0,0%  
 2500-2999 g: 17 21,8%

**TOTAL:** 78

**SITUACIÓN-PRESENTAC:**

Longitudinal: 77 Oblicua: 0 Trasversa: 0  
 Vértex: 76 97,4% Podalic: 1 1,3% Poster: 0 0,0%  
 Otros:

**PARIDAD:**

1P: 40 52,6% 2P: 29 38,2% 3P: 5 6,6% 4P: 2 2,6% 5P: 0 0,0% > 6P: 0 0,0%  
 Total: 76

**COMIENZO:**

Espon táneos: 50 64,9% Estim. Oxitoc.: 14 28,0%  
 Cesár. Elect: 6 7,8% Inducido s: 21 27,3% **TOTAL:** 77  
 Miso: 5 23,8% Miso+Oxitoc: 3 14,3% Oxitoc: 10 47,6% Dinoprostona: 2 9,5% Dinopr+Oxitoc: 1 4,8%

**Porcentaje de Cesáreas en comienzo espontaneo:** 4 8,0%

**Porcentaje de Cesáreas en Inducciones:** 33,3%

Miso: 1 20,0% Miso+Oxitoc: 0 0,0% Oxitoc: 4 40,0% Dinoprostona: 2 100,0% Dinopr+Oxitoc: 0 0,0%

**Motivo de Inducciones:**

GVP:	5	23,8%	1 Dinoprost, 2prost+ox, 1 prost
RPM:	8	38,1%	7 oxit, 1 prost
CIR:	2	9,5%	1 dinop, 1prost+oxit
Oligoamnios:	1	4,8%	1 prost
Meconio:	2	9,5%	2 oxit
RCTG anormal:	1	4,8%	1 oxit
R.P.B.F.:	0	0,0%	
E.H.E.:	1	4,8%	1 dinop+oxit
Diabetes:	0	0,0%	
A.O.Desfavor.:	0	0,0%	
Interés Matern:	0	0,0%	
Interés Fetal:	0	0,0%	
Otras:	1	4,8%	feto muerte anteparto.Prostaglandinas
<b>TOTAL:</b>	<b>21</b>		

**EPIDURALES:**

32 41,6% Eutóc: 17 53,1% Cesáreas: 8 25,0%  
 Vacuo: 6 18,8% Forcep: 1 3,1% Ayuda manual: 0 0,0%  
 Instrument Epidurales: 7 21,9% Instrument No Epidural: 4 8,9%

**TERMINACIÓN DE LOS PARTOS:**

EUTOCICOS:	49	63,6%				
CESÁREAS:	17	22,1%	Ces. Electivas: 6 35,3%		Ces. Intraparto: 11 64,7%	
INSTRUMENT:	11	14,3%	Vacuo: 10 90,9%	Forcep 1 9,1%	V-F: 0 0,0%	
NALGAS:	0	0,0%				
OTROS:	0	0,0%				
<b>TOTAL:</b>	<b>77</b>					

**Motivos de CE:**

Iterativa 3:	1	16,7%	Gemelar:	1	16,7%
Iterativa 2:	1	16,7%	Podalica:	1	16,7%
Transversa:	0	0,0%	Solicitud Materna:	1	16,7%
Otras:	1	16,7%	otros interés materno:coroidopatía ojo izquierdo		

cesarea iterativa 2más malformación uterina.

**Motivos de CI:**

RPBF	4	36,4%	Desproporción	0	0,0%
No progresión	1	9,1%	Fracaso Inducción	2	18,2%
Transversa:	0	0,0%	Solicitud Materna:	0	0,0%
Podálica:	0	0,0%	Abruptio:	0	0,0%
Iterativa 2	0	0,0%			

**Cesárea Podálica:** 1 100%  
**Mujeres con cesárea anterior** 10 13,0%  
**Una sola CA y no PV previo** 8 10,4%

**Ces. Gemelar:** 1 100%  
**Partos vaginales tras C.A.:** 5 50,0%  
**PV tras una sola CA y no PV previo** 0 0,0%

L.T. cesárea: 2  
 L.T. postparto: 0

**Fiebre intraparto con epidural:** 6 18,8%  
**Fiebre intraparto sin epidural:** 0 0,0%

**PATOLOGÍA MATERNA PUERPERAL:**

Número de puérperas, si más de una patología, poner en duplicadas, no en individuales

Anemia:	27	87,1%	
Anemia+Fiebre		0,0%	
E.M.P.:		0,0%	
Endometritis		0,0%	
Fiebre:		0,0%	
Histerectomia		0,0%	
Legrado:		0,0%	
Metrorragia:		0,0%	
Reingreso		0,0%	
Reintervencion		0,0%	
Resutura:		0,0%	
Retencion orina		0,0%	
Seroma		0,0%	
Transfusión:	1	3,2%	
UCI		0,0%	
<b>DUPLICADAS:</b>		0,0%	
Otras:	3	9,7%	dehiscencia de cicatriz, hernia laparotómica, insuficiencia venosa

TOTAL: 31 40,3%

**PATOLOGIA OBSTETRICA:**

Preeclampsia		0,0%	Diabetes		0,0%
Otros EHE		0,0%	Oligoamnios		0,0%
Amnionitis		0,0%	CIR		0,0%
A.P.P.		0,0%	aaaaaaaaa		0,0%
Patolog. médica		0,0%	UCI		0,0%

**RECIÉN NACIDOS:**

78 n° pH: 2 2,6% Apgar-5 < 7: 1 1,3%

**MORTALIDAD feto-neonatal:**

Fetos + (500-999 g): Fetos + (>1000 g): 1  
 Neonatos + (< 7 días): Neonatos + (7-28 días):  
 MAPEC: 1 MAPIC: MIP: Mortalidad total: 1 1,3%

**MORBILIDAD neonatal:**

Ingreso en Neonatos: 0,0%

**MOTIVO PRINCIPAL DE INGRESO EN PEDIATRIA. N° Neonatos.**

Si más de una patología poner en duplicadas, señalando patología.

Aspir Meconial:		
Bajo peso/CIR:	2	1 CIR+pretérmino+AUU+microsomia/2 PEG:madre con metadona
Depresión Neo	1	hematoma malar+riesgo neurológico+ictericia
Deshidratacion		
Distress Resp:	1	
Fiebre		
Hijo diabetica		
Hipoglucemia:	1	
Ictericia:	1	
Malfomación:		
Policitemia		
Prematuro:		
Quejido:		
R.P.B.F		
Riesgo infecc.:	4	2 poliglobulias, 1+ depresión neonatal 1+prematura+ictericia
Sdr Avery:		
Sepsis		
<b>DUPLICADAS:</b>		
Otras:	2	1hiperbilirrubinemia, 2 taquipnea transitorio rn

TOTAL MORBI-MORTALIDAD: 13 16,7%

**OBSERVACIONES:**


Gestantes en tto con progesterona por antecedentes de PP: Numero de Historia y Semana Gestación:


Gestantes en tto con aspirina por antecedentes de EHE: Numero de historia y Semana de Gestación:


**Médico Responsable:** RODRIGUEZ ZARAUZ

**Nº partos:** 81 **Media/día:** 2,61 **SEXO:** Varón: 43 52,4%  
**Gemelares:** 1 **Nº R.N.:** 82 **Mujer:** 39 47,6%

**EDAD MATERNA:** < 20 a: 3 3,7% 20-34: 56 69,1% > 34 a: 22 27,2%

**EDAD GESTACIONAL:**

< 28 s: 0 0,0%  
 28-36 s: 4 4,9%  
 37-40 s: 68 84,0%  
 41 s: 9 11,1%  
 > 42 s: 0 0,0%  
**TOTAL:** 81

**PESO FETAL:**

500-999 g: 0 0,0% 3000-3499 g: 36 43,9%  
 1000-1499 g: 0 0,0% 3500-3999 g: 17 20,7%  
 1500-1999 g: 0 0,0% 4000-4499 g: 5 6,1%  
 2000-2499 g: 3 3,7% > 4500 g: 0 0,0%  
 2500-2999 g: 21 25,6%

**TOTAL:** 82

**SITUACIÓN-PRESENTAC:**

Longitudinal: 81 Oblicua: 0 Trasversa: 0  
 Vértex: 73 89,0% Podalic: 5 6,1% Poster: 2 2,4%  
 Otros: 1 Podalica-Vértice

**PARIDAD:**

1P: 41 51,3% 2P: 28 35,0% 3P: 9 11,3% 4P: 2 2,5% 5P: 0 0,0% > 6P: 0 0,0%  
**Total:** 80

**COMIENZO:**

Esponáneos: 49 60,5% Estim. Oxitoc.: 9 18,4%  
 Cesár. Elect: 7 8,6% Inducidos: 25 30,9% **TOTAL:** 81  
 Miso: 9 36,0% Miso+Oxitoc: 4 16,0% Oxitoc: 8 32,0% Dinoprostona: 1 4,0% Dinopr+Oxitoc: 3 12,0%

**Porcentaje de Cesáreas en comienzo espontaneo:** 5 10,2%

**Porcentaje de Cesáreas en Inducciones:** 16,0%

Miso: 0 0,0% Miso+Oxitoc: 1 25,0% Oxitoc: 2 25,0% Dinoprostona: 0 0,0% Dinopr+Oxitoc: 1 33,3%

**Motivo de Inducciones:**

GVP: 5 20,0%  
 RPM: 11 44,0%  
 CIR: 2 8,0%  
 Oligoamnios: 3 12,0%  
 Meconio: 1 4,0%  
 RCTG anormal: 1 4,0%  
 R.P.B.F.: 0 0,0%  
 E.H.E.: 2 8,0%  
 Diabetes: 0 0,0%  
 A.O.Desfavor.: 0 0,0%  
 Interés Matern: 0 0,0%  
 Interés Fetal: 0 0,0%  
 Otras: 0 0,0%  
**TOTAL:** 25

**EPIDURALES:**

28 34,6% Eutóc: 21 75,0% Cesáreas: 5 17,9%  
 Vacuo: 2 7,1% Forcep: 0 0,0% Ayuda manual: 0 0,0%  
 Instrument Epidurales: 2 7,1% Instrument No Epidural: 2 3,8%

**TERMINACIÓN DE LOS PARTOS:**

EUTOCICOS: 60 75,0% Una distocia hombros.  
 CESÁREAS: 16 20,0% Ces. Eléctivas: 7 43,8% Ces. Intraparto: 9 56,3%  
 INSTRUMENT: 4 5,0% Vacuo: 1 25,0% Forcep 2 50,0% V-F: 1 25,0%  
 NALGAS: 0 0,0%  
 OTROS: 0 0,0%  
**TOTAL:** 80

**Motivos de CE:**

Iterativa 3:	1	14,3%	Gemelar:	1	14,3%
Iterativa 2:		0,0%	Podalica:	4	57,1%
Transversa:		0,0%	Solicitud Materna:	1	14,3%
Otras:		0,0%			

1º gemelo en podálica.

**Motivos de CI:**

RPBF	4	44,4%	Desproporcion	3	33,3%
No progresion	1	11,1%	Fracaso Induccion		0,0%
Transversa:		0,0%	Solicitud Materna:		0,0%
Podálica:		0,0%	Abruptio:		0,0%
Iterativa 2	1	11,1%			

Iter-2 por F.I.

**Cesárea Podálica:** 5 100%  
**Mujeres con cesárea anterior** 5 6,2%  
**Una sola CA y no PV previo** 0 0,0%

**Ces. Gemelar:** 1 100%  
**Partos vaginales tras C.A.:** 2 40,0%  
**PV tras una sola CA y no PV previo** ###

L.T. cesárea: 4  
 L.T. postparto: 0

**Fiebre intraparto con epidural:** 3 10,7%  
**Fiebre intraparto sin epidural:** 0 0,0%

**PATOLOGÍA MATERNA PUERPERAL:**

Número de puérperas, si más de una patología, poner en duplicadas, no en individuales

Anemia:	22	88,0%
Anemia+Fiebre		0,0%
E.M.P.:	1	4,0%
Endometritis		0,0%
Fiebre:	2	8,0%
Histerectomía		0,0%
Legrado:		0,0%
Metrorragia:		0,0%
Reingreso		0,0%
Reintervención		0,0%
Resutura:		0,0%
Retención orina		0,0%
Seroma		0,0%
Transfusión:		0,0%
UCI		0,0%
<b>DUPLICADAS:</b>		0,0%
Otras:		0,0%

TOTAL: 25 30,9%

**PATOLOGIA OBSTETRICA:**

Preeclampsia		0,0%
Otros EHE		0,0%
Amnionitis		0,0%
A.P.P.		0,0%
Patolog. médica		0,0%
Diabetes		0,0%
Oligoamnios		0,0%
CIR		0,0%
aaaaaaaaa		0,0%
UCI		0,0%

**RECIÉN NACIDOS:**

82 n° pH: 4 4,9% Apgar-5 < 7: 0 0,0%

**MORTALIDAD feto-neonatal:**

Fetos + (500-999 g): Fetos + (>1000 g): Traslado CHT: 0 0,0%  
 Neonatos + (< 7 días): Neonatos + (7-28 días):  
 MAPEC: MAPIC: MIP: Mortalidad total: 0 0,0%

**MORBILIDAD neonatal:**

Ingreso en Neonatos: 10 12,2%

**MOTIVO PRINCIPAL DE INGRESO EN PEDIATRIA. N° Neonatos.**

Si más de una patología poner en duplicadas, señalando patología.

Aspir Meconial:		
Bajo peso/CIR:	1	
Depresión Neo		
Deshidratación		
Distress Resp:	2	
Fiebre		
Hijo diabética		
Hipoglucemia:		
Ictericia:		
Malfomación:		
Policitemia		
Prematuro:	1	
Quejido:		
R.P.B.F		
Riesgo infecc.:	2	
Sdr Avery:	2	
Sepsis		
<b>DUPLICADAS:</b>	1	Ictericia + Poliglobulia + Trombopenia.
Otras:	1	Obstrucción intestinal.

TOTAL MORBI-MORTALIDAD: 10 12,2%

**OBSERVACIONES:**


Gestantes en tto con progesterona por antecedentes de PP: Numero de Historia y Semana Gestación:


Gestantes en tto con aspirina por antecedentes de EHE: Numero de historia y Semana de Gestación:


# ESTADÍSTICA DE PARTOS

## ABRIL

## 2013

Médico Responsable: Delgado Martinez

Nº partos: 77 Media/día: 2,57 SEXO: Varón: 39 50,6%  
Gemelares: 0 Nº R.N.: 77 Mujer: 38 49,4%

EDAD MATERNA: < 20 a: 2 2,6% 20-34: 55 71,4% > 34 a: 20

### EDAD GESTACIONAL:

< 28 s: 0 0,0%  
28-36 s: 3 3,9%  
37-40 s: 62 80,5%  
41 s: 12 15,6%  
> 42 s: 0 0,0%  
TOTAL: 77

### PESO FETAL:

500-999 g: 0 0,0% 3000-3499 g: 30  
1000-1499 g: 0 0,0% 3500-3999 g: 15  
1500-1999 g: 1 1,3% 4000-4499 g: 4  
2000-2499 g: 5 6,5% > 4500 g: 2  
2500-2999 g: 20 26,0%  
TOTAL: 77

### SITUACIÓN-PRESENTAC:

Longitudinal: 77 Oblicua: 0 Trasversa:  
Vértex: 70 90,9% Podalic: 6 7,8% Poster: 1 1,3%  
Otros: 0

PARIDAD: 1P: 38 49,4% 2P: 30 39,0% 3P: 8 10,4% 4P: 0 0,0% 5P: 0 0,0% > 6P:  
Total: 77

COMIENZO: Espontáneos: 42 54,5% Estim. Oxitoc.: 10 23,8%  
Cesár .Elect: 9 11,7% Inducidos: 26 33,8% TOTAL:  
Miso: 9 34,6% Miso+Oxitoc: 7 26,9% Oxitoc: 6 23,1% Dinoprostona: 0 0,0% Dinopr+Oxitoc: 4 15,4%

Porcentaje de Cesáreas en comienzo espontaneo: 6 14,3%

Porcentaje de Cesáreas en Inducciones: 42,3%

Miso: 2 22,2% Miso+Oxitoc: 3 42,9% Oxitoc: 3 50,0% Dinoprostona: 0 ### Dinopr+Oxitoc: 3 75,0%

### Motivo de Inducciones:

GVP: 4 15,4%  
RPM: 7 26,9%  
CIR: 2 7,7%  
Oligoamnios: 6 23,1%  
Meconio: 1 3,8%  
RCTG anormal: 0 0,0%  
R.P.B.F.: 0 0,0%  
E.H.E.: 2 7,7%  
Diabetes: 0 0,0%  
A.O.Desfavor.: 0 0,0%  
Interés Matern: 0 0,0%  
Interés Fetal: 1 3,8% Dilatación intestinal  
Otras: 3 11,5% 1 hidramnios y sosp macrosomía, 1 hidramnios y 1 ???  
TOTAL: 26

EPIDURALES: 34 44,2% Eutóc: 23 67,6% Cesáreas: 10 29,4%  
Vacuo: 1 2,9% Forcep: 0 0,0% Ayuda manual: 0 0,0%

Instrument Epidurales: 1 2,9%

Instrument No Epidural: 3 7,0%

### TERMINACIÓN DE LOS PARTOS:

EUTOCICOS:	47	61,0%									
CESÁREAS:	26	33,8%	Ces. Electivas:	9	34,6%		Ces. Intraparto:	17	65,4%		
INSTRUMENT:	4	5,2%	Vacuo:	3	75,0%	Forcep	0	0,0%	V-F:	1	25,0%
NALGAS:	0	0,0%									
OTROS:		0,0%									
TOTAL:	77										

### Motivos de CE:

Iterativa 3:	0	0,0%	Gemelar:	0	0,0%
Iterativa 2:	4	44,4%	Podalica:	5	55,6%
Transversa:	0	0,0%	Solicitud Materna:	0	0,0%
Otras:	0	0,0%			

### Motivos de CI:

RPBF	4	23,5%	Desproporcion	3
No progresion	4	23,5%	Fracaso Induccion	3
Transversa:	0	0,0%	Solicitud Materna:	1
Podalica:	1	5,9%	Abruptio	1
Iterativa 2	0	0,0%		

<b>Cesárea Podalica:</b>	6	100%
<b>Mujeres con cesárea anterior</b>	14	18,2%
<b>Una sola CA y no PV previo</b>		0,0%

<b>Ces. Gemelar:</b>	0
<b>Partos vaginales tras C.A.:</b>	6
<b>PV tras una sola CA y no PV previo</b>	

L.T. cesárea:	4
L.T. postparto:	0

<b>Fiebre intraparto con epidural:</b>	2	5,9%
<b>Fiebre intraparto sin epidural:</b>	0	0,0%
<b>Fiebre intraparto total:</b>	2	2,6%

### PATOLOGÍA MATERNA PUERPERAL:

**Número de púerperas, si más de una patología poner en duplicadas, no en individuales**

Anemia:	28	90,3%	
Anemia+Fiebre		0,0%	
E.M.P.:		0,0%	
Endometritis		0,0%	
Fiebre:	1	3,2%	
Histerectomia		0,0%	
Legrado:		0,0%	
Metrorragia:		0,0%	
Reingreso		0,0%	
Reintervencion		0,0%	
Resutura:		0,0%	
Retencion orina		0,0%	
Seroma		0,0%	
Transfusión:		0,0%	
UCI		0,0%	
<b>DUPLICADAS:</b>	1	3,2%	Anemia. Reingreso (transfusión).
Otras:	1	3,2%	Dehiscencia cicatriz uterina.
TOTAL:	31	40,3%	



Gestantes en tto con aspirina por antecedentes de EHE: Numero de historia y Semana de Gestación:










**Médico Responsable:** Aisa

**Nº partos:** 80    **Media/día:** 2,58    **SEXO:**    **Varón:** 34    41,5%  
**Gemelares:** 2    **Nº R.N.:** 82    **Mujer:** 48    58,5%

**EDAD MATERNA:** < 20 a: 3    3,8%    20-34: 52    65,0%    > 34 a: 25    31,3%

**EDAD GESTACIONAL:**

< 28 s: 0    0,0%  
 28-36 s: 2    2,5%  
 37-40 s: 61    76,3%  
 41 s: 16    20,0%  
 > 42 s: 1    1,3%  
**TOTAL:** 80

**PESO FETAL:**

500-999 g: 0    0,0%    3000-3499 g: 35    42,7%  
 1000-1499 g: 0    0,0%    3500-3999 g: 22    26,8%  
 1500-1999 g: 1    1,2%    4000-4499 g: 7    8,5%  
 2000-2499 g: 4    4,9%    > 4500 g: 0    0,0%  
 2500-2999 g: 13    15,9%

**TOTAL:** 82

**SITUACIÓN-PRESENTAC:**

Longitudinal: 80    Oblicua: 0    Trasversa: 0  
 Vértex: 74    90,2%    Podalic: 4    4,9%    Poster: 1    1,2%

**PARIDAD:**

1P: 28    35,0%    2P: 38    47,5%    3P: 10    12,5%    4P: 2    2,5%    5P: 1    1,3%    > 6P: 1    1,3%

**COMIENZO:**

Espon táneos: 46    57,5%    Estim. Oxitoc.: 11    23,9%  
 Cesár. Elect: 5    6,3%    Inducidos: 29    36,3%    **TOTAL:** 80  
 Miso: 10    Miso+Oxitoc: 5    Oxitoc: 8    Dinoprostona: 4    Dinopr+Oxitoc: 2  
 34,5%    17,2%    27,6%    13,8%    6,9%

**Porcentaje de Cesáreas en comienzo espontaneo:** 2    4,3%

**Porcentaje de Cesáreas en Inducciones:** 31,0%

Miso: 4    Miso+Oxitoc: 1    Oxitoc: 2    Dinoprostona: 2    Dinopr+Oxitoc: 0  
 40,0%    20,0%    25,0%    50,0%    0,0%

**Motivo de Inducciones:**

GVP: 6    20,7%  
 RPM: 8    27,6%  
 CIR: 3    10,3%  
 Oligoamnios: 5    17,2%  
 Meconio: 2    6,9%  
 RCTG anormal: 0    0,0%  
 R.P.B.F.: 0    0,0%  
 E.H.E.: 2    6,9%  
 Diabetes: 1    3,4%  
 A.O.Desfavor.: 0    0,0%  
 Interés Matern: 0    0,0%  
 Interés Fetal: 0    0,0%  
 Otras: 2    6,9%    macrosoma x1 , colestasis X1  
**TOTAL:** 29

**EPIDURALES:**

32    40,0%    Eutóc: 23    71,9%    Cesáreas: 6    18,8%  
 Vacuo: 3    9,4%    Forcep: 0    0,0%    Ayuda manual: 0    0,0%  
 Instrument Epidurales: 3    9,4%    Instrument No Epidural: 2    4,2%

**TERMINACIÓN DE LOS PARTOS:**

EUTOCICOS: 57    71,3%  
 CESÁREAS: 17    21,3%    Ces. Electivas: 6    35,3%    Ces. Intraparto: 11    64,7%  
 INSTRUMENT: 5    6,3%    Vacuo: 5    ###    Forcep: 0,0%    V-F: 0,0%  
 NALGAS: 0    0,0%  
 OTROS: 1    1,3%    disticia de hombros  
**TOTAL:** 80

**Motivos de CE:**

Iterativa 3:	0,0%	Gemelar:	2	33,3%
Iterativa 2:	0,0%	Podalica:	3	50,0%
Transversa:	0,0%	Solicitud Materna:	1	16,7%
Otras:	0,0%			

**Motivos de CI:**

RPBF	6	54,5%	Desproporcion	1	9,1%
No progresion	1	9,1%	Fracaso Induccion	1	9,1%
Transversa:	0,0%	Solicitud Materna:	1	9,1%	
Podálica:	0,0%	Abruptio:	0,0%		
Iterativa 2	0,0%	frente	1		

**Cesárea Podálica:** 3    75%  
**Mujeres con cesárea anterior** 10    12,5%  
**Una sola CA y no PV previo** 0,0%

**Ces. Gemelar:** 2    100%  
**Partos vaginales tras C.A.:** 5    50,0%  
**PV tras una sola CA y no PV previo** ###

L.T. cesárea: 3  
 L.T. postparto: 0

**Fiebre intraparto con epidural:** 5    15,6%  
**Fiebre intraparto sin epidural:** 1    2,1%

**PATOLOGÍA MATERNA PUERPERAL:**

Número de puérperas, si más de una patología, poner en duplicadas, no en individuales

Anemia:	21	75,0%	
Anemia+Fiebre		0,0%	
E.M.P.:	1	3,6%	
Endometritis		0,0%	
Fiebre:		0,0%	
Histerectomía		0,0%	
Legrado:	2	7,1%	
Metrorragia:	1	3,6%	
Reingreso		0,0%	
Reintervención		0,0%	
Resutura:		0,0%	
Retención orina		0,0%	
Seroma		0,0%	
Transfusión:		0,0%	
UCI		0,0%	
<b>DUPLICADAS:</b>	2	7,1%	Anemia/plaquetopenia
Otras:	1	3,6%	Rotura uterina intraparto

TOTAL: 28 35,0%

**PATOLOGIA OBSTETRICA:**

Preeclampsia		0,0%	Diabetes		0,0%
Otros EHE		0,0%	Oligoamnios		0,0%
Amnionitis		0,0%	CIR		0,0%
A.P.P.		0,0%	aaaaaaaaa		0,0%
Patolog. médica		0,0%	UCI		0,0%

**RECIÉN NACIDOS:**

82 n° pH: 7 8,5% Apgar-5 < 7: 1 1,2%

**MORTALIDAD feto-neonatal:**

Fetos + (500-999 g): 0 Fetos + (>1000 g): 0 Traslado CHT: 1 1,2%  
 Neonatos + (< 7 días): 0 Neonatos + (7-28 días): 0 Mortalidad total: 0 0,0%  
 MAPEC: 0 MAPIC: 0 MIP: 0

**MORBILIDAD neonatal:**

Ingreso en Neonatos: 7 8,5%

**MOTIVO PRINCIPAL DE INGRESO EN PEDIATRIA. N° Neonatos.**

Si más de una patología poner en duplicadas, señalando patología.

Aspir Meconial:	0	
Bajo peso/CIR:	0	
Depresión Neo	0	
Deshidratación	0	
Distress Resp:	1	
Fiebre	0	
Hijo diabética	0	
Hipoglucemia:	0	
Ictericia:	0	
Malformación:	1	Malformación pulmonar
Policitemia	0	
Prematuro:	1	
Quejido:	1	
R.P.B.F	0	
Riesgo infecc.:	0	
Sdr Avery:	0	
Sepsis	0	
<b>DUPLICADAS:</b>	0	
Otras:	3	observación, microsomía. Bocio hipotiroideo

TOTAL MORBI-MORTALIDAD: 7 8,5%

**OBSERVACIONES:**

El neonato trasladado a HTC se fue intubado--> a las 24 hs estaba estable.

Gestantes en tto con progesterona por antecedentes de PP: Numero de Historia y Semana Gestación:

Gestantes en tto con aspirina por antecedentes de EHE: Numero de historia y Semana de Gestación:



**PATOLOGÍA MATERNA PUERPERAL:**

Número de puérperas, si más de una patología, poner en duplicadas, no en individuales

Anemia:	33	80,5%	
Anemia+Fiebre	2	4,9%	
E.M.P.:		0,0%	
Endometritis		0,0%	
Fiebre:	1	2,4%	
Histerectomía		0,0%	
Legrado:		0,0%	
Metrorragia:	1	2,4%	
Reingreso		0,0%	
Reintervención		0,0%	
Resutura:		0,0%	
Retención orina	1	2,4%	
Seroma		0,0%	
Transfusión:		0,0%	
UCI		0,0%	
<b>DUPLICADAS:</b>	1	2,4%	1 Fiebre, pielonefritis, anemia.
Otras:	2	4,9%	1 Cistocele II grado, 1 Contractura muscular a nivel cervical
<b>TOTAL:</b>	<b>41</b>	<b>41,0%</b>	

**PATOLOGIA OBSTETRICA:**

Preeclampsia	1	1,0%	Diabetes	2	2,0%
Otros EHE	1	1,0%	Oligoamnios	3	3,0%
Amnionitis	1	1,0%	CIR	12	12,0%
A.P.P.		0,0%	aaaaaaaaa		0,0%
Patolog. médica	1	1,0%	UCI	0	0,0%

**RECIÉN NACIDOS:**

102	nº pH:	7	6,9%	Apgar-5 < 7:	1	1,0%
<b>MORTALIDAD feto-neonatal:</b>				<b>Traslado CHT:</b>	1	1,0%
Fetos + (500-999 g):	0	Fetos + (>1000 g):	1	Mortalidad total:	1	1,0%
Neonatos + (< 7 días):	0	Neonatos + (7-28 días):	0			
MAPEC: 1	MAPIC: 0	MIP: 0				

**MORBILIDAD neonatal:**

Ingreso en Neonatos: 14 13,7%

**MOTIVO PRINCIPAL DE INGRESO EN PEDIATRIA. Nº Neonatos.**

Si más de una patología poner en duplicadas, señalando patología.

Aspir Meconial:	1	
Bajo peso/CIR:	2	1 primer gemelo, 1 AUU
Depresión Neo	1	
Deshidratación		
Distress Resp:		
Fiebre	1	
Hijo diabética	2	1 labio leporino + foramen oval permeable, 1 traslado a CHT
Hipoglucemia:		
Ictericia:	1	1 ictericia, deshidratación
Malfomación:		
Policitemia		
Prematuro:	4	1 prematuro + CIR II
Quejido:		
R.P.B.F		
Riesgo infecc.:		
Sdr Avery:		
Sepsis		
<b>DUPLICADAS:</b>		
Otras:	2	1 parto extraclínica, 1 Anemia neonatal por rotura de cordón

**TOTAL MORBI-MORTALIDAD:** 15 14,7%

**OBSERVACIONES:**


Gestantes en tto con progesterona por antecedentes de PP: Numero de Historia y Semana Gestación:

Gestantes en tto con aspirina por antecedentes de EHE: Numero de historia y Semana de Gestación:



**PATOLOGÍA MATERNA PUERPERAL:**

Número de puérperas, si más de una patología, poner en duplicadas, no en individuales

Anemia:	35	87,5%	
Anemia+Fiebre		0,0%	
E.M.P.:		0,0%	
Endometritis		0,0%	
Fiebre:		0,0%	
Histerectomía		0,0%	
Legrado:		0,0%	
Metrorragia:		0,0%	
Reingreso		0,0%	
Reintervención		0,0%	
Resutura:		0,0%	
Retención orina		0,0%	
Seroma		0,0%	
Transfusión:	2	5,0%	
UCI		0,0%	
<b>DUPLICADAS:</b>	<b>3</b>	<b>7,5%</b>	1. A+f 1. A+f+m+seroma+ reint 1, a+m+legr + reing
Otras:		0,0%	

TOTAL: 40 41,2%

**PATOLOGIA OBSTETRICA:**

Preeclampsia		0,0%	Diabetes		0,0%
Otros EHE		0,0%	Oligoamnios		0,0%
Amnionitis		0,0%	CIR		0,0%
A.P.P.		0,0%	aaaaaaaaa		0,0%
Patolog. médica		0,0%	UCI		0,0%

**RECIÉN NACIDOS:**

99 n° pH: 6 6,1% Apgar-5 < 7: 0 0,0%

**MORTALIDAD feto-neonatal:**

Fetos + (500-999 g):  Fetos + (>1000 g):  Traslado CHT:  0,0%  
 Neonatos + (< 7 días):  Neonatos + (7-28 días):  Mortalidad total: 0 0,0%  
 MAPEC:  MAPIC:  MIP:

**MORBILIDAD neonatal:**

Ingreso en Neonatos: 10 10,1%

**MOTIVO PRINCIPAL DE INGRESO EN PEDIATRIA. N° Neonatos.**

Si más de una patología poner en duplicadas, señalando patología.

Aspir Meconial:		
Bajo peso/CIR:		
Depresión Neo	1	
Deshidratación		
Distress Resp:	3	1 con CIA
Fiebre		
Hijo diabética		
Hipoglucemia:		
Ictericia:		
Malfomación:		
Policitemia		
Prematuro:	3	1 Prematuro + lesiones dérmicas inespecíficas
Quejido:		
R.P.B.F		
Riesgo infecc.:		
Sdr Avery:		
Sepsis		
<b>DUPLICADAS:</b>	<b>1</b>	Ictericia + riesgo infeccioso + policitemia + cefalohematoma
Otras:	<b>2</b>	1 por sospecha Sind Down (cribado bajo), 1 por Vómito

TOTAL MORBI-MORTALIDAD: 10 10,1%

**OBSERVACIONES:**


Gestantes en tto con progesterona por antecedentes de PP: Numero de Historia y Semana Gestación:


Gestantes en tto con aspirina por antecedentes de EHE: Numero de historia y Semana de Gestación:


**Médico Responsable:** V Gonzalez

**Nº partos:** 90 **Media/día:** 2,90 **SEXO:** Varón: 55 60,4%  
**Gemelares:** 1 **Nº R.N.:** 91 **Mujer:** 36 39,6%

**EDAD MATERNA:** < 20 a: 0 0,0% 20-34: 67 74,4% > 34 a: 23 25,6%

**EDAD GESTACIONAL:**

< 28 s: 0 0,0%  
 28-36 s: 8 8,9%  
 37-40 s: 62 68,9%  
 41 s: 20 22,2%  
 > 42 s: 0 0,0%  
**TOTAL:** 90

**PESO FETAL:**

500-999 g: 0 0,0% 3000-3499 g: 32 35,6%  
 1000-1499 g: 0 0,0% 3500-3999 g: 27 30,0%  
 1500-1999 g: 1 1,1% 4000-4499 g: 9 10,0%  
 2000-2499 g: 6 6,7% > 4500 g: 1 1,1%  
 2500-2999 g: 14 15,6%

**TOTAL:** 90

**SITUACIÓN-PRESENTAC:**

Longitudinal: 90 Oblicua: 0 Trasversa: 0  
 Vértex: 86 94,5% Podalic: 3 3,3% Poster: 0 0,0%  
 Otros: 2 Cara,Vertice-Vertice

**PARIDAD:**

1P: 39 47,0% 2P: 27 32,5% 3P: 12 14,5% 4P: 3 3,6% 5P: 1 1,2% > 6P: 1 1,2%  
**Total:** 83

**COMIENZO:**

Espon táneos: 51 56,7% Estim. Oxitoc.: 16 31,4%  
 Cesár. Elect: 4 4,4% Inducidos: 34 37,8% **TOTAL:** 89  
 Miso: 5 14,7% Miso+Oxitoc: 8 23,5% Oxitoc: 20 58,8% Dinoprostona: 0 0,0% Dinopr+Oxitoc: 1 2,9%

**Porcentaje de Cesáreas en comienzo espontaneo:** 5 9,8%

**Porcentaje de Cesáreas en Inducciones:** 29,4%

Miso: 1 20,0% Miso+Oxitoc: 2 25,0% Oxitoc: 7 35,0% Dinoprostona: 0 #DIV/0! Dinopr+Oxitoc: 0 0,0%

**Motivo de Inducciones:**

GVP: 5 14,7%  
 RPM: 14 41,2%  
 CIR: 2 5,9%  
 Oligoamnios: 3 8,8%  
 Meconio: 2 5,9%  
 RCTG anormal: 0 0,0%  
 R.P.B.F.: 0 0,0%  
 E.H.E.: 4 11,8%  
 Diabetes: 0 0,0%  
 A.O.Desfavor.: 0 0,0%  
 Interés Matern: 1 2,9%  
 Interés Fetal: 2 5,9%  
 Otras: 1 2,9% Colestasis  
**TOTAL:** 34

**EPIDURALES:**

38 42,2% Eutóc: 20 52,6% Cesáreas: 9 23,7%  
 Vacuo: 8 21,1% Forcep: 1 2,6% Ayuda manual: 0 0,0%  
 Instrument Epidurales: 9 23,7% Instrument No Epidural: 0 0,0%

**TERMINACIÓN DE LOS PARTOS:**

EUTÓCICOS: 60 65,9% Err:520  
 CESÁREAS: 20 22,0% Ces. Electivas: 4 20,0% Ces. Intraparto: 15 75,0%  
 INSTRUMENT: 9 9,9% Vacuo: 5 55,6% Forcep 1 11,1% V-F: 3 33,3%  
 NALGAS: 2 2,2%  
 OTROS: 0 0,0%  
**TOTAL:** 91

**Motivos de CE:**

Iterativa 3: 1 25,0% Gemelar: 0 0,0%  
 Iterativa 2: 0 0,0% Podalica: 2 50,0%  
 Transversa: 0 0,0% Solicitud Materna: 0 0,0%  
 Otras: 1 25,0%

**Motivos de CI:**

RPBF 9 60,0% Desproporcion 1 6,7%  
 No progresion 4 26,7% Fracaso Induccion 1 6,7%  
 Transversa: 0 0,0% Solicitud Materna: 0 0,0%  
 Podálica: 1 6,7% Abruptio: 0 0,0%  
 Iterativa 2 1 6,7%

**Cesárea Podálica:** 2 67%  
**Mujeres con cesárea anterior** 7 7,8%  
**Una sola CA y no PV previo** 5 5,6%

**Ces. Gemelar:** 0 0%  
**Partos vaginales tras C.A.:** 5 71,4%  
**PV tras una sola CA y no PV previo** 0 0,0%

L.T. cesárea: 1  
 L.T. postparto: 0

**Fiebre intraparto con epidural:** 9 23,7%  
**Fiebre intraparto sin epidural:** 0 0,0%

**PATOLOGÍA MATERNA PUERPERAL:**

Número de puérperas, si más de una patología, poner en duplicadas, no en individuales

Anemia:	41	89,1%
Anemia+Fiebre		0,0%
E.M.P.:		0,0%
Endometritis		0,0%
Fiebre:	2	4,3%
Histerectomía		0,0%
Legrado:		0,0%
Metrorragia:	1	2,2%
Reingreso		0,0%
Reintervención		0,0%
Resutura:		0,0%
Retención orina		0,0%
Seroma		0,0%
Transfusión:	2	4,3%
UCI		0,0%
<b>DUPLICADAS:</b>		0,0%
Otras:		0,0%

TOTAL: 46 51,1%

**PATOLOGÍA OBSTETRICA:**

Preeclampsia		0,0%
Otros EHE		0,0%
Amnionitis		0,0%
A.P.P.		0,0%
Patolog. médica		0,0%
Diabetes		0,0%
Oligoamnios		0,0%
CIR		0,0%
aaaaaaaaa		0,0%
UCI		0,0%

**RECIÉN NACIDOS:**

91 n° pH: 9 9,9% Apgar-5 < 7: 1 1,1%

**MORTALIDAD feto-neonatal:**

Fetos + (500-999 g): 0 Fetos + (>1000 g):  
 Neonatos + (< 7 días): Neonatos + (7-28 días):  
 MAPEC: 0 MAPIC: 0 MIP: 0 Mortalidad total: 0 0,0%

**MORBILIDAD neonatal:**

Ingreso en Neonatos: 9 9,9%

**MOTIVO PRINCIPAL DE INGRESO EN PEDIATRÍA. N° Neonatos.**

Si más de una patología poner en duplicadas, señalando patología.

Aspir Meconial:	1	
Bajo peso/CIR:	2	
Depresión Neo		
Deshidratación		
Distress Resp:	1	
Fiebre		
Hijo diabética		
Hipoglucemia:	1	
Ictericia:		
Malfomación:		
Policitemia	1	
Prematuro:	1	
Quejido:	0	
R.P.B.F		
Riesgo infecc.:		
Sdr Avery:		
Sepsis		
<b>DUPLICADAS:</b>	1	Distres+Riesgo infecc
Otras:	1	vomitos

TOTAL MORBI-MORTALIDAD: 9 9,9%

**OBSERVACIONES:**


Gestantes en tto con progesterona por antecedentes de PP: Numero de Historia y Semana Gestación:


Gestantes en tto con aspirina por antecedentes de EHE: Numero de historia y Semana de Gestación:




Fiebre intraparto total: 0 0,0%

**PATOLOGÍA MATERNA PUERPERAL:**

Número de puérperas, si más de una patología, poner en duplicadas, no en individuales

Anemia:	41	95,3%
Anemia+Fiebre		0,0%
E.M.P.:		0,0%
Endometritis		0,0%
Fiebre:		0,0%
Histerectomía		0,0%
Legrado:		0,0%
Metrorragia:		0,0%
Reingreso		0,0%
Reintervención		0,0%
Resutura:		0,0%
Retención orina	1	2,3%
Seroma		0,0%
Transfusión:	1	2,3%
UCI		0,0%
<b>DUPLICADAS:</b>		0,0%
Otras:		0,0%

TOTAL: 43 36,1%

**PATOLOGÍA OBSTETRICA:**

Preeclampsia		0,0%
Otros EHE		0,0%
Amnionitis		0,0%
A.P.P.		0,0%
Patolog. médica		0,0%
Diabetes		0,0%
Oligoamnios		0,0%
CIR		0,0%
aaaaaaaaa		0,0%
UCI		0,0%

**RECIÉN NACIDOS:**

120 n° pH: 3 2,5% Apgar-5 < 7: 1 0,8%

**MORTALIDAD feto-neonatal:**

Fetos + (500-999 g): Fetos + (>1000 g): 1  
 Neonatos + (< 7 días): Neonatos + (7-28 días):  
 MAPEC: 1 MAPIC: MIP: Mortalidad total: 1 0,8%

**MORBILIDAD neonatal:**

Ingreso en Neonatos: 15 12,5%

**MOTIVO PRINCIPAL DE INGRESO EN PEDIATRÍA. N° Neonatos.**

Si más de una patología poner en duplicadas, señalando patología.

Aspir Meconial:		
Bajo peso/CIR:	1	
Depresión Neo		
Deshidratación		
Distress Resp:	2	
Fiebre		
Hijo diabética	3	Uno con policitemia.
Hipoglucemia:		
Ictericia:	1	Isoinmunización ABO (dos ingresos).
Malfomación:		
Policitemia		
Prematuro:	3	
Quejido:	1	Tb, pielectasia.
R.P.B.F		
Riesgo infecc.:	2	
Sdr Avery:		
Sepsis		
<b>DUPLICADAS:</b>		
Otras:	3	Neumotórax pretérmino. Probable LUES. Crisis de sofocación.

TOTAL MORBI-MORTALIDAD: 17 14,2%

**OBSERVACIONES:**


Gestantes en tto con progesterona por antecedentes de PP: Numero de Historia y Semana Gestación:

Gestantes en tto con aspirina por antecedentes de EHE: Numero de historia y Semana de Gestación:

**Médico Responsable:** Aisa

**Nº partos:** 117    **Media/día:** 3,77    **SEXO:**    **Varón:** 72 60,5%  
**Gemelares:** 2    **Nº R.N.:** 119    **Mujer:** 47 39,5%

**EDAD MATERNA:** < 20 a: 9 7,7%    20-34: 69 59,0%    > 34 a: 39 33,3%

**EDAD GESTACIONAL:**

< 28 s: 0 0,0%  
 28-36 s: 6 5,1%  
 37-40 s: 86 73,5%  
 41 s: 25 21,4%  
 > 42 s: 0 0,0%  
**TOTAL:** 117

**PESO FETAL:**

500-999 g: 0 0,0%    3000-3499 g: 50 42,0%  
 1000-1499 g: 0 0,0%    3500-3999 g: 29 24,4%  
 1500-1999 g: 0 0,0%    4000-4499 g: 6 5,0%  
 2000-2499 g: 13 10,9%    > 4500 g: 0 0,0%  
 2500-2999 g: 21 17,6%

**TOTAL:** 119

**SITUACIÓN-PRESENTAC:**

Longitudinal: 117    Oblicua: 0    Trasversa: 0  
 Vértex: 111 93,3%    Podalic: 3 2,5%    Poster: 1 0,8%  
 Otros: 2    Podalica-transversa, vértice-podálica

**PARIDAD:**

1P: 51 43,6%    2P: 53 45,3%    3P: 10 8,5%    4P: 1 0,9%    5P: 2 1,7%    > 6P: 0 0,0%

**COMIENZO:**

Esponáneos: 71 60,7%    Estim. Oxitoc.: 12 16,9%  
 Cesár. Elect: 9 7,7%    Inducidos: 37 31,6%    **TOTAL:** 117  
 Miso: 14 37,8%    Miso+Oxitoc: 11 29,7%    Oxitoc: 11 29,7%    Dinoprostona: 0 0,0%    Dinopr+Oxitoc: 1 2,7%

**Porcentaje de Cesáreas en comienzo espontaneo:** 6 8,5%

**Porcentaje de Cesáreas en Inducciones:** 16,2%

Miso: 1 7,1%    Miso+Oxitoc: 2 18,2%    Oxitoc: 2 18,2%    Dinoprostona: 0 #DIV/0!    Dinopr+Oxitoc: 1 ###

**Motivo de Inducciones:**

GVP: 14 37,8%  
 RPM: 9 24,3%  
 CIR: 2 5,4%  
 Oligoamnios: 1 2,7%  
 Meconio: 1 2,7%  
 RCTG anormal: 0 0,0%  
 R.P.B.F.: 0 0,0%  
 E.H.E.: 7 18,9%  
 Diabetes: 0 0,0%  
 A.O.Desfavor.: 0 0,0%  
 Interés Matern: 0 0,0%  
 Interés Fetal: 0 0,0%  
 Otras: 3 8,1% oligo+RCIU (x2), Isoinmunización (x1)  
**TOTAL:** 37

**EPIDURALES:**

36 30,8%    Eutóc: 24 66,7%    Cesáreas: 8 22,2%  
 Vacuo: 4 11,1%    Forcep: 0 0,0%    Ayuda manual: 0 0,0%  
 Instrument Epidurales: 4 11,1%    Instrument No Epidural: 0 0,0%

**TERMINACIÓN DE LOS PARTOS:**

EUTÓCICOS: 89 78,1%  
 CESÁREAS: 21 18,4%    Ces. Electivas: 9 42,9%    Ces. Intraparto: 12 57,1%  
 INSTRUMENT: 4 3,5%    Vacuo: 4 ###    Forcep: 0 0,0%    V-F: 0 0,0%  
 NALGAS: 0 0,0%  
 OTROS: 0 0,0%  
**TOTAL:** 114

**Motivos de CE:**

Iterativa 3: 0 0,0%    Gemelar: 2 22,2%  
 Iterativa 2: 1 11,1%    Podalica: 4 44,4%  
 Transversa: 0 0,0%    Solicitud Materna: 0 0,0%  
 Otras: 2 22,2%

**Motivos de CI:**

RPBF: 7 58,3%    Desproporcion: 2 16,7%  
 No progresion: 2 16,7%    Fracaso Induccion: 0 0,0%  
 Transversa: 0 0,0%    Solicitud Materna: 1 8,3%  
 Podálica: 0 0,0%    Abruptio: 0 0,0%  
 Iterativa 2: 0 0,0%

**Cesárea Podálica:** 4 133%  
**Mujeres con cesárea anterior:** 7 6,0%  
**Una sola CA y no PV previo:** 0 0,0%

**Ces. Gemelar:** 2 100%  
**Partos vaginales tras C.A.:** 2 28,6%  
**PV tras una sola CA y no PV previo:** ###

L.T. cesárea: 4  
 L.T. postparto: 0

**Fiebre intraparto con epidural:** 2 5,6%  
**Fiebre intraparto sin epidural:** 1 1,2%

**PATOLOGÍA MATERNA PUERPERAL:**

Número de puérperas, si más de una patología, poner en duplicadas, no en individuales

Anemia:	28	90,3%	
Anemia+Fiebre		0,0%	
E.M.P.:	1	3,2%	
Endometritis		0,0%	
Fiebre:	1	3,2%	
Histerectomía		0,0%	
Legrado:		0,0%	
Metrorragia:		0,0%	
Reingreso		0,0%	
Reintervención		0,0%	
Resutura:		0,0%	
Retención orina		0,0%	
Seroma		0,0%	
Transfusión:		0,0%	
UCI		0,0%	
<b>DUPLICADAS:</b>		0,0%	
Otras:	1	3,2%	Revisión canal del parto

TOTAL: 31 26,5%

**PATOLOGIA OBSTETRICA:**

Preeclampsia		0,0%	Diabetes		0,0%
Otros EHE		0,0%	Oligoamnios		0,0%
Amnionitis		0,0%	CIR		0,0%
A.P.P.		0,0%	aaaaaaaaa		0,0%
Patolog. médica		0,0%	UCI		0,0%

**RECIÉN NACIDOS:**

119 n° pH: 7 5,9% Apgar-5 < 7: 1 0,8%

**MORTALIDAD feto-neonatal:**

Fetos + (500-999 g): 0 Fetos + (>1000 g): 0 Traslado CHT: 0 0,0%  
 Neonatos + (< 7 días): MAPIC: 0 Neonatos + (7-28 días): MIP: 0 Mortalidad total: 0 0,0%

**MORBILIDAD neonatal:**

Ingreso en Neonatos: 16 13,4%

**MOTIVO PRINCIPAL DE INGRESO EN PEDIATRIA. N° Neonatos.**

Si más de una patología poner en duplicadas, señalando patología.

Aspir Meconial:		
Bajo peso/CIR:		
Depresión Neo	1	
Deshidratación		
Distress Resp:	1	
Fiebre		
Hijo diabética	1	
Hipoglucemia:		
Ictericia:	1	
Malfomación:		
Policitemia		
Prematuro:	1	
Quejido:		
R.P.B.F		
Riesgo infecc.:	6	colonización por acinetobacter (x 2)
Sdr Avery:		
Sepsis		
<b>DUPLICADAS:</b>	4	Distres resp+ Ictericia (x1), (Hiporeactividad+poliglobulia), (Pretermino+RI+Ictericia), IC
Otras:	1	Enf. Hemolítica (x1)

TOTAL MORBI-MORTALIDAD: 16 13,4%

**OBSERVACIONES:**


Gestantes en tto con progesterona por antecedentes de PP: Numero de Historia y Semana Gestación:


Gestantes en tto con aspirina por antecedentes de EHE: Numero de historia y Semana de Gestación:




**PATOLOGÍA MATERNA PUERPERAL:**

Número de puérperas, si más de una patología, poner en duplicadas, no en individuales

Anemia:	34	79,1%	
Anemia+Fiebre		0,0%	
E.M.P.:	1	2,3%	
Endometritis		0,0%	
Fiebre:		0,0%	
Histerectomía		0,0%	
Legrado:	1	2,3%	
Metrorragia:		0,0%	
Reingreso		0,0%	
Reintervención		0,0%	
Resutura:		0,0%	
Retención orina		0,0%	
Seroma		0,0%	
Transfusión:	3	7,0%	
UCI	1	2,3%	Eclampsia
<b>DUPLICADAS:</b>	3	7,0%	
Otras:	0	0,0%	

TOTAL: 43 45,7%

**PATOLOGIA OBSTETRICA:**

Preeclampsia	2	2,1%	Diabetes	3	3,2%
Otros EHE	1	1,1%	Oligoamnios		0,0%
Amnionitis		0,0%	CIR	3	3,2%
A.P.P.		0,0%	aaaaaaaaa		0,0%
Patolog. médica		0,0%	UCI	1	1,1%

**RECIÉN NACIDOS:**

96 n° pH: 8 8,3% Apgar-5 < 7: 0 0,0%

**MORTALIDAD feto-neonatal:**

Fetos + (500-999 g):	0	Fetos + (>1000 g):	0	Traslado CHT:	1	1,0%
Neonatos + (< 7 días):	0	Neonatos + (7-28 días):	0	Mortalidad total:	0	0,0%
MAPEC:	0	MAPIC:	0	MIP:	0	

**MORBILIDAD neonatal:**

Ingreso en Neonatos: 15 15,6%

**MOTIVO PRINCIPAL DE INGRESO EN PEDIATRIA. N° Neonatos.**

Si más de una patología poner en duplicadas, señalando patología.

Aspir Meconial:		
Bajo peso/CIR:		
Depresión Neo	3	1 Hemorragia pulmonar, Sd aspiración meconio, parada, traslado a CHT
Deshidratación		
Distress Resp:	1	1 Parto extraclínico-Sd adaptación
Fiebre		
Hijo diabética	2	
Hipoglucemia:	1	
Ictericia:	3	1 Onfalitis por BGN
Malfomación:	1	Sd de Down
Policitemia		
Prematuro:	2	
Quejido:	0	
R.P.B.F	1	1 Riesgo neurológico por Eclampsia
Riesgo infecc.:	2	1 Colonización axilar por Acinetobacter, 1 Onfalitis por E. Coli
Sdr Avery:		
Sepsis		
<b>DUPLICADAS:</b>		
Otras:	0	

TOTAL MORBI-MORTALIDAD: 16 16,7%

**OBSERVACIONES:**


Gestantes en tto con progesterona por antecedentes de PP: Numero de Historia y Semana Gestación:


Gestantes en tto con aspirina por antecedentes de EHE: Numero de historia y Semana de Gestación:


**Médico Responsable:** Redondo Aguilar Rosario

**Nº partos:** 121 **Media/día:** 3,90 **SEXO:** Varón: 58 47,9%  
**Gemelares:** 0 **Nº R.N.:** 121 **Mujer:** 63 52,1%

**EDAD MATERNA:** < 20 a: 7 5,7% 20-34: 81 65,9% > 34 a: 35 28,5%

**EDAD GESTACIONAL:**

< 28 s: 0 0,0%  
 28-36 s: 3 2,5%  
 37-40 s: 88 73,3%  
 41 s: 29 24,2%  
 > 42 s: 0 0,0%  
**TOTAL:** 120

**PESO FETAL:**

500-999 g: 1 0,8% 3000-3499 g: 49 40,5%  
 1000-1499 g: 0 0,0% 3500-3999 g: 38 31,4%  
 1500-1999 g: 0 0,0% 4000-4499 g: 8 6,6%  
 2000-2499 g: 2 1,7% > 4500 g: 1 0,8%  
 2500-2999 g: 22 18,2%  
**TOTAL:** 121

**SITUACIÓN-PRESENTAC:**

Longitudinal: 120 Oblicua: 0 Trasversa: 1  
 Vértex: 117 96,7% Podálic: 4 3,3% Poster: 0 0,0%  
 Otros: 0

**PARIDAD:**

1P: 61 50,8% 2P: 41 34,2% 3P: 15 12,5% 4P: 2 1,7% 5P: 1 0,8% > 6P: 0 0,0%  
**Total:** 120

**COMIENZO:**

Espon táneos: 85 70,2% Estim. Oxitoc.: 22 25,9%  
 Cesár. Elect: 7 5,8% Inducidos: 29 24,0% **TOTAL:** 121  
 Miso: 13 44,8% Miso+Oxitoc: 9 31,0% Oxitoc: 6 20,7% Dinoprostona: 1 3,4% Dinopr+Oxitoc: 0 0,0%

**Porcentaje de Cesáreas en comienzo espontaneo:** 5 5,9%

**Porcentaje de Cesáreas en Induccion:** 6 20,7%

Miso: 2 15,4% Miso+Oxitoc: 2 22,2% Oxitoc: 2 33,3% Dinoprostona: 0 0,0% Dinopr+Oxitoc: 0 ###

**Motivo de Inducciones:**

GVP: 8 30,8%  
 RPM: 9 34,6%  
 CIR: 1 3,8%  
 Oligoamnios: 3 11,5%  
 Meconio: 1 3,8%  
 RCTG anormal: 1 3,8%  
 R.P.B.F.: 0 0,0%  
 E.H.E.: 1 3,8%  
 Diabetes: 1 3,8%  
 A.O.Desfavor.: 0 0,0%  
 Interés Matern: 0 0,0%  
 Interés Fetal: 0 0,0%  
 Otras: 1 3,8% Presentación fetal inestable  
**TOTAL:** 26

**EPIDURALES:**

51 42,1% Eutóc: 39 76,5% Cesáreas: 7 13,7%  
 Vacuo: 5 9,8% Forcep: 0 0,0% Ayuda manual: 0 0,0%  
 Instrument Epidurales: 5 9,8% Instrument No Epidural: 5 7,1%

**TERMINACIÓN DE LOS PARTOS:**

EUTOCICOS: 91 76,5%  
 CESÁREAS: 18 15,1% Ces. Electivas: 7 38,9% Ces. Intraparto: 11 61,1%  
 INSTRUMENT: 10 8,4% Vacuo: 10 ### Forcep 0 0,0% V-F: 0 0,0%  
 NALGAS: 0 0,0%  
 OTROS: 0 0,0%  
**TOTAL:** 119

**Motivos de CE:**

Iterativa 3:	2	28,6%	Gemelar:	0	0,0%
Iterativa 2:	0	0,0%	Podalica:	4	57,1%
Transversa:	1	14,3%	Solicitud Materna:	0	0,0%
Otras:	0	0,0%			

**Motivos de CI:**

RPBF	7	63,6%	Desproporcion	2	18,2%
No progresion	1	9,1%	Fracaso Induccion	0	0,0%
Transversa:	0	0,0%	Solicitud Materna:	1	9,1%
Podálica:	0	0,0%	Abruptio:	0	0,0%
Iterativa 2	0	0,0%			

**Cesárea Podálica:** 4 100%  
**Mujeres con cesárea anterior:** 7 5,8%  
**Una sola CA y no PV previo:** 0 0,0%

**Ces. Gemelar:** 0 ###  
**Partos vaginales tras C.A.:** 2 28,6%  
**PV tras una sola CA y no PV previo:** 0 ###

L.T. cesárea: 4  
 L.T. postparto: 0

**Fiebre intraparto con epidural:** 5 9,8%  
**Fiebre intraparto sin epidural:** 2 2,9%

**PATOLOGÍA MATERNA PUERPERAL:**

Número de puérperas, si más de una patología, poner en duplicadas, no en individuales

Anemia:	41	83,7%	
Anemia+Fiebre		0,0%	
E.M.P.:		0,0%	
Endometritis		0,0%	
Fiebre:	1	2,0%	
Histerectomía		0,0%	
Legrado:	3	6,1%	1 legrado puerperal digital más anemia
Metrorragia:		0,0%	
Reingreso		0,0%	
Reintervención		0,0%	
Resutura:		0,0%	
Retención orina	1	2,0%	
Seroma	1	2,0%	Infección de herida quirúrgica
Transfusión:		0,0%	
UCI		0,0%	
<b>DUPLICADAS:</b>		0,0%	
Otras:	2	4,1%	Reacción alérgica, sacroileitis derecha

TOTAL: **49** 40,5%

**PATOLOGIA OBSTETRICA:**

Preeclampsia		0,0%	Diabetes		0,0%
Otros EHE		0,0%	Oligoamnios	2	1,7%
Amnionitis		0,0%	CIR	2	1,7%
A.P.P.		0,0%	aaaaaaaaa		0,0%
Patolog. médica		0,0%	UCI		0,0%

**RECIÉN NACIDOS:**

**121**

nº pH: **6** 5,0%

Apgar-5 < 7: **1** 0,8%

**MORTALIDAD feto-neonatal:**

Fetos + (500-999 g):	1	Fetos + (>1000 g):	0	Traslado CHT:	0	0,0%
Neonatos + (< 7 días):	0	Neonatos + (7-28 días):	0	Mortalidad total:	1	0,8%
MAPEC: <b>1</b>	MAPIC: <b>0</b>	MIP: <b>0</b>				

**MORBILIDAD neonatal:**

Ingreso en Neonatos: **1** 0,8%

**MOTIVO PRINCIPAL DE INGRESO EN PEDIATRIA. Nº Neonatos.**

Si más de una patología poner en duplicadas, señalando patología.

Aspir Meconial:	0	
Bajo peso/CIR:	1	Colonización por acinetobacter
Depresión Neo	1	
Deshidratación		
Distress Resp:	1	
Fiebre		
Hijo diabética	2	Hipoglucemia. Plaquetopenia noconfirmada/ taquipnea transitoria del m+hipoglucemia
Hipoglucemia:		
Ictericia:		
Malfomación:		
Policitemia		
Prematuro:		
Quejido:		
R.P.B.F		
Riesgo infecc.:		
Sdr Avery:		
Sepsis		
<b>DUPLICADAS:</b>		
Otras:	1	Observación pH 7,15

TOTAL MORBI-MORTALIDAD: **7** 5,8%

**OBSERVACIONES:**


Gestantes en tto con progesterona por antecedentes de PP: Numero de Historia y Semana Gestación:

Gestantes en tto con aspirina por antecedentes de EHE: Numero de historia y Semana de Gestación: