

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN CLÍNICA ESPECÍFICA PARA LA REALIZACIÓN DE PARACENTESIS

ETIQUETA DE LA PACIENTE

El Dr. D. _____
le ha explicado que es conveniente proceder, en su situación, a realizar una
PARACENTESIS

1. Se denomina ascitis a la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal (abdomen), la técnica que permite la evacuación de este líquido es la **paracentesis**. Se realiza para determinar el origen de la ascitis, analizar el líquido ascítico si se sospecha que está infectado (peritonitis bacteriana espontánea) o para drenar gran cantidad de líquido como parte del tratamiento del paciente.
2. **Técnica:** con el paciente tumbado se infiltra anestesia en la parte inferior derecha del abdomen, posteriormente se introduce un catéter que se conecta a una bolsa de drenaje para evacuar la cantidad deseada, si la técnica se realiza para analizar el líquido no se mantiene el drenaje y se retira el mismo tras extraer la cantidad deseada. También puede realizarse sin necesidad de anestesia local.
3. **Complicaciones:** Aunque suele ser una técnica inocua, pueden darse las siguientes complicaciones:
 - Infección del lugar de punción.
 - Hemorragia/Hematoma.
 - Peritonitis bacteriana (infección del líquido ascítico)
 - Perforación del intestino o vejiga
 - Lesión de vasos sanguíneos
 - Cuerpo extraño peritoneal (fracción del catéter)
4. **Contraindicaciones:** No se puede realizar en las siguientes circunstancias: alteración de la coagulación o tratamiento anticoagulante (sintrón o heparina). El embarazo es una contraindicación relativa.
5. No existen alternativas a esta técnica.