


**ALGORITMO DE ACTUACIÓN EN MUJERES EMBARAZADAS
CON SOSPECHA DE VIAJE A ZONAS DE RIESGO DE ZIKA,
DENGUE Y CHIKUNGUNYA**

Epidemiología junio 2016



¹**Criterio epidemiológico (SVEA):** Residir o haber visitado áreas epidemias para virus Zika en los 15 días anteriores a la aparición de los síntomas. (<http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika-virus-infection/zika-autbreak/pages/zika-information-travellers.aspx>)

La infección ha tenido lugar al mismo tiempo y en la misma zona donde se han producido otros casos confirmados o probables de Zika.

Haber mantenido relaciones sexuales sin protección con hombres que hayan viajado a zonas con transmisión activa del virus dentro de las **8 semanas posteriores al regreso del viaje si no han tenido síntomas, o de 6 meses en los casos en que haya tenido síntomas o con diagnóstico confirmado por laboratorio.**

ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA

Datos demográficos:

Domicilio:

Población:

Teléfono:

• **Datos del Riesgo:**

Exposición (marcar una de las siguientes opciones):

Contacto con vector

Persona a persona: sexual

Ha recibido transfusión o hemoderivados

Asociada a cuidados sanitarios

Otra exposición Especificar cuál: _____

Antecedente personal:

Semanas de gestación: __

• **Datos Epidemiológicos.**

- Datos de viaje:

- Viaje durante el periodo de incubación (PI 15 días): Sí No

Lugar del viaje _____

País: _____

- **Fecha de ida:** __ - __ - ____ **Fecha de vuelta:** __ - __ - ____

Motivo de estancia en país endémico (marcar una de las siguientes opciones):

Inmigrante recién llegado

Visita familiar

Trabajador temporal

Turismo

Otro

Peticiones/muestras para estudio de virus Zika

(1) Muestras +

Declaración realizada por Epidemiología (AP) o M. Preventiva (Hospital).

No pegar etiqueta aquí, especificar nº petición laboratorio origen (si procede) más abajo

Muestras/s (especificar): Estudio virus zika

Volante de solicitud: http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/microbiologia - servicio/ficheros/formulario_peticion_centro_referencia_virus.pdf

- (1) Muestras: suero Y orina
Otras muestras (LCR, liq amniótico, sangre cordón, placenta, etc, según protocolo específico)

ALGORITMO INVESTIGACIÓN VIRUS ZIKA EN SUERO

