

Enlaces de interés

- Andavac:



Contacto



Teléfono Interno: 932 079
Teléfono Externo: 951 032 079
Tel. Consulta Enfermería: 951 032 220



preventiva.hvv.sspa@juntadeandalucia.es



Hospital Universitario Virgen de la Victoria
Campus Universitario Teatinos, S/N
29010 Málaga España
951032000 / Fax: 951 032 022
<http://www.huw.es>

Fecha de última revisión: 25/05/2023



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo

Hospital Universitario
Virgen de la Victoria



Consejos tras vacunación

Servicio de Medicina Preventiva
y Salud Pública

Consejos tras vacunación

Tras la vacunación se recomienda permanecer en la sala de espera o en el centro hospitalario durante aproximadamente 20 minutos.



Después de la vacunación, durante ese día, se puede realizar vida normal.

Recuerde sus próximas citas para completar su calendario vacunal.

Consejos para casa

Como cualquier medicamento, todas las vacunas pueden tener efectos adversos locales o generales.

La mayoría de los efectos adversos producidos por las vacunas son leves o transitorios, suelen limitarse a dolor o inflamación en el lugar de inyección y febrícula generalmente durante las primeras 48 horas.

Los efectos adversos más graves son muy poco frecuentes y de menos riesgo que los producidos por la enfermedad frente a la que vacunamos.

Si los síntomas se prolongan durante más de 48 horas, se recomienda contactar con su médico/a de familia o acudir a urgencias.


Ante cualquier duda, puede ponerse en contacto con su enfermera/o de Medicina Preventiva (Tel. de contacto: 951 032 220).

Manejo de efectos adversos habituales



Dolor local, muscular, de cabeza o febrícula

Analgésico antitérmico habitual



Cansancio

Reposo



Eritema o tumefacción en el lugar de inyección

Frío local (compresa)



**Recuerde:
No deben durar más de 48 horas.**