

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

DIMETILFUMARATO

¿QUÉ ES DIMETILFUMARATO?

El principio activo dimetilfumarato está indicado para el tratamiento de pacientes adultos y mayores con esclerosis múltiple remitente-recurrente.

¿CÓMO SE DEBE TOMAR DIMETILFUMARATO?

Semana 1: DIMETILFUMARATO 120mg/ cena.

Semana 2: DIMETILFUMARATO 120mg 1 comprimido en desayuno y 1 comprimido en cena.

Semana 3: DIMETILFUMARATO 120mg 1 comprimido en desayuno y DIMETILFUMARATO 240mg 1 comprimido en cena.

Posteriormente, tomará DIMETILFUMARATO 240mg 1 comprimido en desayuno y 1 comprimido en cena. La cápsula debe tomarse entera con un vaso de agua, sin triturar, partir, disolver, ni masticar. No deje de tomar este medicamento salvo por indicación de su médico.

¿CUÁNDO NO DEBO TOMAR DIMETILFUMARATO?

- Si usted es alérgico a dimetilfumarato o a alguno de los componentes del comprimido.
- Si está embarazada, a no ser que lo haya consultado con su médico.
- Si se encuentra en período de lactancia.

PRECAUCIONES

Evite tomar bebidas alcohólicas fuertes al menos durante la primera hora tras tomarlo.

El tratamiento puede afectar al número de glóbulos blancos, riñones e hígado. Consulte a su médico antes de iniciar el tratamiento si usted tiene:

- Enfermedad renal grave
- Enfermedad hepática grave
- Enfermedad del estómago o intestino
- Alguna infección grave (por ejemplo, neumonía)

EFFECTOS ADVERSOS:

Cuando tome dimetilfumarato puede notar alguno de los siguientes efectos adversos:

- Enrojecimiento de la cara (rubefacción). Si llega a tener alergia grave, deje de tomar la medicación y consulte al médico
- Diarrea, náuseas y vómitos. Los efectos adversos gastrointestinales pueden atenuarse tomándolo con alimentos.
- Dolor abdominal
- Erupción cutánea
- Mayor riesgo de infecciones.

Si nota hinchazón de cara, labios, boca o lengua, así como dificultad respiratoria, podría tratarse de un proceso alérgico, deje de tomarlo y acuda al médico lo antes posible.

¿QUÉ HACER SI...?:

Si ha olvidado tomar una dosis y aún faltan más de 4 horas para la siguiente, tómela cuanto antes. Si no mantenga el horario de la próxima toma. Nunca tome una dosis doble para compensar una dosis olvidada.

INTERACCIONES:

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Medicamentos para la psoriasis (fumaratos).
- Medicamentos que afectan al sistema inmune, incluidos otros empleados en esclerosis múltiple, como fingolimod, natalizumab o mitoxantrona, así como algunos tratamientos normalmente utilizados para el cáncer.
- Medicamentos que afectan a los riñones (nefrotóxicos): algunos antibióticos (aminoglicósidos), algunos analgésicos (como el ibuprofeno y otros antiinflamatorios), el litio y los diuréticos.
- Anticonceptivos orales (podría verse disminuida su eficacia).
- Ciertos tipos de vacunas.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD:

Mantenga las cápsulas en su envase original para protegerlo de la humedad y de la luz, a temperatura ambiente, no a más de 30°C.

No utilice dimetilfumarato después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS:

- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.

Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.

Servicio de Farmacia H.U. Virgen de la Victoria Campus Universitario Teatinos s/n 29010
Málaga

Teléfono de información y gestión de citas: 951 032 057 en horario de 8:30 – 10:30

Correo electrónico: citasfarmacia.hvv.sspa@juntadeandalucia.es

Horario de atención indicado en su cita

Esta hoja no contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudarle con su tratamiento. Si tiene cualquier duda o precisa más información consulte a su médico o farmacéutico.

Última actualización noviembre 2022