

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

FINGOLIMOD 0,5 mg

¿QUÉ ES FINGOLIMOD?

El principio activo Fingolimod se usa para prevenir los episodios de síntomas y retrasar el empeoramiento de la discapacidad en adultos y niños mayores de 10 años con formas recurrente-remitente de esclerosis múltiple.

Actúa al disminuir la acción de las células inmunes que pueden causar daño a los nervios.

¿CÓMO SE ADMINISTRA FINGOLIMOD?

La dosis recomendada es de 0,5 mg por vía oral una vez al día. Por lo tanto, serán UNA cápsula diaria, a la misma hora. Puede tomarlo con o sin alimentos. Hacerlo cada día a la misma hora le ayudará a recordar el momento en que debe tomar el medicamento.

¿QUÉ HACER SI...?:

Ha olvidado tomar una dosis, tómese la siguiente dosis de acuerdo con lo previsto. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR...?

- Si tiene una respuesta inmunitaria disminuida.
- Si tiene infección grave activa o infección crónica activa (como hepatitis o tuberculosis).
- Si tiene un cáncer activo (excepto cáncer de piel: carcinoma basocelular).
- Tiene problemas graves de hígado.
- Es alérgico a fingolimod o a cualquiera de sus componentes.
- Embarazo: durante el tratamiento y los dos meses posteriores debe evitar quedarse embarazada.

PRECAUCIONES

Informe a su médico antes de tomar fingolimod si:

- Ha tenido o tiene cualquier problema de corazón, hepático o pulmonar.
 - Tiene diabetes.
 - Tiene o ha tenido trastornos en la visión central del fondo del ojo o infección del ojo.
 - Tiene presión arterial alta y no se puede controlar con medicamentos.
 - Quiere vacunarse.
 - Nunca ha tenido varicela.
- Evitar exposición solar sin protección.

INTERACCIONES:

-Medicamentos que modulan el sistema inmunitario, incluidos los utilizados en EM (interferón beta, acetato de glatirámico, natalizumab...), no debe usarlo al mismo tiempo.

- Vacunas: durante el tratamiento y hasta dos meses después de su interrupción, no se pueden administrar vacunas elaboradas con virus vivos atenuados.
- Medicamentos para el latido cardiaco (quinidina, disopiramida, amiodarona o sotalol).
- Medicamentos que enlentecen el ritmo cardiaco (betabloqueantes como atenolol).

EFFECTOS ADVERSOS:

Al igual que todos los medicamentos, fingolimod puede producir efectos adversos, esto no significa que todas las personas tienen porque sufrirlos. Los más frecuentes son:

- Tos con expectoración, molestias en el pecho, fiebre, mareo, náuseas, vómitos, diarrea.
- Latido lento o ritmo del corazón irregular.
- Gripe con síntomas como cansancio, escalofríos y dolor de garganta.
- Visión borrosa.
- Hipertensión.

Avisé rápidamente a su médico si tiene: una reacción alérgica grave (escalofríos, fiebre, taquicardia, dificultad al respirar, caída o subida de la tensión arterial...); signos de infección como tos, escalofríos fiebre > 38°C, dificultad al orinar o en caso de sobredosis.

ADVERTENCIAS:

- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD:

Conservar en el embalaje original y mantener a temperatura ambiente.
No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad indicada en el envase.

Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.

Servicio de Farmacia H.U. Virgen de la Victoria Campus Universitario Teatinos s/n 29010
Málaga

Teléfono de información y gestión de citas: 951 032 057 en horario de 8:30 – 10:30

Correo electrónico: citasfarmacia.hvv.sspa@juntadeandalucia.es

Horario de atención indicado en su cita

Esta hoja no contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudarle con su tratamiento. Si tiene cualquier duda o precisa más información consulte a su médico o farmacéutico.