

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE


Fremanezumab 225 MG

¿QUÉ ES FREMANEZUMAB?

El principio activo Fremanezumab se utiliza en el tratamiento profiláctico de la migraña en adultos. La dosis usual es de una pluma por vía subcutánea cada 30 días.

¿CÓMO SE ADMINISTRA FREMANEZUMAB?

1. Deje la pluma precargada fuera de nevera 30 minutos a temperatura ambiente.



2. Lávese las manos cuidadosamente, desinfecte la piel de la zona de inyección usando un algodón con alcohol. Las zonas de inyección están señaladas en la imagen.

3. Retire el capuchón tirando de él en línea recta hacia fuera. Desde ese momento la inyección está lista para inyectarse. No debe tardar más de 5 minutos desde ese momento.

4. Mantenga la piel estirada o pellizcada en el lugar donde vaya a administrarse la medicación. Habiendo retirado el capuchón, coloque la pluma sobre la piel formando un ángulo de 90 grados. Presione firmemente la pluma sobre la piel hasta que ya no avance más.

5. Tras pulsar el botón de inicio escuchará un “click”. Levante el pulgar del botón, manteniendo la pluma presionada sobre la piel. La inyección puede durar unos 15 segundos. Cuando la inyección haya terminado, la ventana se pondrá amarilla y podrá escuchar un segundo “click”.



6. Deseche la pluma en un recipiente de desecho adecuado. Cualquier resto de medicación debe ser desechado.

QUE HACER SI

Si olvida una dosis, ésta se debe administrar tan pronto como se recuerde, continuando con el esquema original prescrito por el médico. No se inyecte una dosis doble para compensar la dosis olvidada. Si ha recibido más del que debe o si la dosis ha sido administrada antes de lo que debiera informe a su médico.

¿CUÁNDO NO DEBO ADMINISTRARME FREMANEZUMAB?

Si es alérgico a Fremanezumab o algún componente de este medicamento, si tiene una infección activa o si tiene alguna enfermedad cardiovascular consúltelo con su médico.

PRECAUCIONES

Informe a su médico y farmacéutico si: le han puesto hace poco alguna vacuna o se la van a poner; si está embarazada, está dando el pecho o tiene previsto hacerlo; en caso de sobredosis; si tiene signos de reacción alérgica grave (taquicardia, dificultad para respirar, caída o subida de la tensión arterial...)

EFFECTOS ADVERSOS E INTERACCIONES:

Al igual que todos los medicamentos, este puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren. Efectos adversos frecuentes: reacción en el lugar de inyección: dolor, enrojecimiento e hinchazón; picor.

Informe de forma inmediata si tiene complicaciones que indicasen una reacción alérgica, tales como dificultad para respirar, hinchazón de labios, cara, boca o garganta.

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso aquellos no prescritos por un médico.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD:

Conservar en **nevera (2°C—8°C)**. No congelar.

Después de retirar la pluma de la nevera, deje que alcance la temperatura ambiente (15– 30 minutos). A continuación, se recomienda el uso inmediato.

No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS:

-Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.

Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.

Servicio de Farmacia H.U. Virgen de la Victoria Campus Universitario Teatinos s/n 29010
Málaga

Teléfono de información y gestión de citas: 951 032 057 en horario de 8:30 – 10:30

Correo electrónico: citasfarmacia.hvv.sspa@juntadeandalucia.es

Horario de atención indicado en su cita

Esta hoja no contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudarle con su tratamiento. Si tiene cualquier duda o precisa más información consulte a su médico o farmacéutico.

Calendario de administración

Fecha	Dosis

Última actualización 28/05/2023