

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE


GALCANEZUMAB 120 MG

¿QUÉ ES GALCANEZUMAB?

El principio activo Galcanezumab se utiliza en el tratamiento profiláctico de la migraña en adultos. La dosis de la primera administración es de 240 mg (2 plumas). Las siguientes dosis son de 120 mg (1 pluma) cada 4 semanas.

¿CÓMO SE ADMINISTRA GALCANEZUMAB?

1. Deje la pluma precargada fuera de nevera 30 minutos a temperatura ambiente. Deje puesta la tapa de la base hasta que esté preparada para inyectar. No agitar.




2. Lávese las manos cuidadosamente, desinfecte la piel de la zona de inyección usando un algodón con alcohol. Las zonas de inyección están señaladas en la imagen.

3. Asegúrese que la tapa de la pluma está bloqueada. Cuando esté listo para inyectar, desenrosque la tapa de la base y tírela a la basura. No vuelva a colocar la tapa de la base.

4. Coloque la base transparente de forma plana firmemente sobre la piel. Gire el anillo de bloqueo hacia la posición de desbloqueo (imagen inferior).

5. Presione y mantenga pulsado el botón de inyección verde, escuchará un “clic” alto. Continúe sujetando la base transparente de forma fija sobre la piel. Escuchará un segundo “clic” a los 5-10 segundos tras el primero. Este segundo “clic” indica que su inyección ha terminado. Retire la pluma de su piel.

6. Tire la pluma a un contenedor de objetos punzantes sin poner la tapa de la base.



QUE HACER SI

Si olvida una dosis, ésta se debe administrar tan pronto como se recuerde, continuando con el esquema original prescrito por el médico. No se inyecte una dosis doble para compensar la dosis olvidada. Si ha recibido más del que debe o si la dosis ha sido administrada antes de lo que debiera informe a su médico.

¿CUÁNDO NO DEBO ADMINISTRARME GALCANEZUMAB?

Si es alérgico a Galcanezumab o algún componente de este medicamento, si tiene una infección activa o si tiene alguna enfermedad cardiovascular consúltelo con su médico.

PRECAUCIONES

Informe a su médico y farmacéutico si: le han puesto hace poco alguna vacuna o se la van a poner; si está embarazada, está dando el pecho o tiene previsto hacerlo; en caso de sobredosis; si tiene signos de reacción alérgica grave (taquicardia, dificultad para respirar, caída o subida de la tensión arterial...)

EFFECTOS ADVERSOS E INTERACCIONES:

Al igual que todos los medicamentos, este puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Efectos adversos frecuentes: reacción en el lugar de inyección, dolor, prurito, hinchazón, cardenales; vértigo; estreñimiento.

Informe de forma inmediata si tiene complicaciones que indicasen una reacción alérgica, tales como dificultad para respirar, hinchazón de labios, cara, boca o garganta.

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso aquellos no prescritos por un médico.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD:

Conservar en **nevera (2°C—8°C)**. No congelar.

Después de retirar la pluma de la nevera, deje que alcance la temperatura ambiente (15– 30 minutos). A continuación, se recomienda el uso inmediato.

No utilizar después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS:

-Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.

Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.

Servicio de Farmacia H.U. Virgen de la Victoria Campus Universitario Teatinos s/n 29010
Málaga

Teléfono de información y gestión de citas: 951 032 057 en horario de 8:30 – 10:30

Correo electrónico: citasfarmacia.hvv.sspa@juntadeandalucia.es

Horario de atención indicado en su cita

Esta hoja no contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudarle con su tratamiento. Si tiene cualquier duda o precisa más información consulte a su médico o farmacéutico.

Calendario de administración

Pauta inducción

Fecha	Dosis
	240 mg (2 plumas)

Pauta mantenimiento

Fecha	Dosis

Última actualización 28/05/2023