

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

EMYLIF 50 mg

¿QUÉ ES EMYLIF?

Emylif contiene el principio activo riluzol, que actúa sobre el sistema nervioso central. Se utiliza en pacientes adultos con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

¿CÓMO SE DEBE ADMINISTRAR?

La película bucodispersable debe tomarse por vía oral, cada 12 horas, a la misma hora cada día (por la mañana y noche).

1. Lave y seque sus manos antes de manipular el medicamento.
2. Doble el sobre de aluminio por la línea continua de la parte superior y mientras la mantiene doblada, tire hacia abajo de la abertura lateral en el sentido de la flecha para abrir el sobre.
3. Póngase la película de Emylif sobre la lengua, cierre la boca y trague saliva con normalidad mientras el medicamento se va disolviendo durante 3 minutos. No tome este medicamento junto con líquidos y no mastique, escupa ni hable mientras el medicamento se disuelve.

Después de tomar este medicamento, puede que note una disminución de la sensibilidad bucal al cabo de 1 minuto. Hasta que esta sensación desaparezca, que suele hacerlo en unos 40 minutos, tenga precaución si consume alimentos.

¿QUÉ HACER SI...?:

- Si toma demasiadas películas bucodispersables, póngase en contacto con su médico o acuda al servicio de urgencias del hospital más cercano inmediatamente.
- Si olvida tomar una toma, déjela pasar y tómese la siguiente a la hora habitual. No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.
- Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico

PRECAUCIONES

Antes de iniciar el tratamiento informe a su médico si padece problemas hepáticos o renales, tiene fiebre o si presenta babeo excesivo o dificultades graves de deglución. No tome este medicamento si es alérgico a riluzol o alguno de los demás componentes de este medicamento. Tampoco si está embarazada o en periodo de lactancia.

EFFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes son: cansancio, sensación de mareo, náuseas y vértigos, niveles elevados de

algunas enzimas hepáticas (transaminasas), taquicardia, dolor de cabeza, somnolencia, dolor abdominal.

Comente con su médico o farmacéutico cualquiera de estos efectos adversos o algún otro que piense que está relacionado con la medicación.

INTERACCIONES:

Aunque no se han descrito interacciones importantes de este fármaco, debe informar a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier otro medicamento, vitamina o planta medicinal incluso sin prescripción. Le informaran si existe alguna incompatibilidad o si debe adoptar alguna medida especial.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD:

Mantenga este medicamento en su envase original para protegerlo de la humedad y de la luz, a temperatura ambiente, no a más de 30°C.

No utilice Emylif después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

ADVERTENCIAS:

- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento se dispensa en el Servicio de Farmacia del Hospital, con la prescripción que le hará su especialista en neurología de este Centro.

Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación, por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.

Servicio de Farmacia H.U. Virgen de la Victoria Campus Universitario Teatinos s/n
29010 Málaga

Teléfono de información y gestión de citas: 951 032 057 en horario de 8:30 – 10:30

Correo electrónico: citasfarmacia.hvv.sspa@juntadeandalucia.es

Horario de atención indicado en su cita

Esta hoja no contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudarle con su tratamiento. Si tiene cualquier duda o precisa más información consulte a su médico o farmacéutico.

Última actualización noviembre 2023