

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

TERIFLUNOMIDA 14 mg

¿QUÉ ES LA TERIFLUNOMIDA?

El principio activo teriflunomida se utiliza para tratar la esclerosis múltiple remitente recurrente en adultos y niños mayores de 10 años.

¿CÓMO SE DEBE TOMAR?

La dosis recomendada para adultos es de **un comprimido cada 24 horas, con o sin comida**, en cualquier momento del día, pero siempre a la misma hora.

El comprimido debe tomarse entero con un vaso de agua, sin triturar, partir, disolver ni masticar.

¿QUÉ HACER SI...?:

Si ha olvidado tomar una dosis y faltan más de 12 h para la siguiente, tómela cuanto antes. Mantenga el horario de la próxima toma. **Nunca tome una dosis doble para compensar una dosis olvidada.**

¿CUÁNDO NO DEBO TOMAR TERIFLUNOMIDA?

-Si usted es alérgico a teriflunomida o a alguno de los componentes del comprimido. Contiene LACTOSA.

-Si está embarazada o cree que pudiera estarlo (eliminar el fármaco de manera natural puede tardar hasta 2 años). Deben utilizarse métodos anticonceptivos eficaces. Existe un procedimiento de eliminación acelerada, si fuese preciso.

-Si se encuentra en período de lactancia

PRECAUCIONES

Evite tomar bebidas alcohólicas fuertes al menos durante la primera hora tras tomar teriflunomida.

Puede afectar al nº de glóbulos blancos, riñones e hígado, consulte a su médico antes de iniciar el tratamiento si usted tiene:

- enfermedad renal grave
- enfermedad hepática grave
- hipertensión en tratamiento o no
- una infección grave (por ejemplo, neumonía)
- si es alérgico a la lactosa

EFFECTOS ADVERSOS:

- Diarrea, náuseas y vómitos.
- Dolor muscular y/o articular, dolor cabeza.
- Pérdida de cabello (transitoria) reacciones cutáneas.
- Elevación de enzimas hepáticas y disminución de glóbulos blancos en sangre.

- Elevación tensión arterial

Si nota hinchazón de cara, labios, boca o lengua, así como dificultad respiratoria deje de tomarlo y acuda al médico lo antes posible.

Para controlar los efectos adversos, se le realizarán analíticas mensuales los seis primeros meses. Posteriormente, se realizarán periódicamente.

INTERACCIONES:

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Antibióticos como: cefaclor, penicilina G, ciprofloxacino.
- Fármacos que afectan al sistema inmune (metotrexato).
- Colestiramina y carbon activado.
- Rifampicina, carbamazepina, fenobarbital, fenitoína.
- Hierba de San Juan o Hipérico.
- Indometacina, ketoprofeno.
- Furosemida, cimetidina, teofilina, duloxetina.
- Simvastatina, atorvastatina, pravastatina.
- Fármacos para la diabetes.
- Warfarina
- Anticonceptivos orales
- Ciertos tipos de vacunas

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD:

Mantenga los comprimidos en su envase original para protegerlo de la humedad y de la luz, a temperatura ambiente, no a más de 30°C.

No utilice teriflunomida después del plazo de validez o de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS:

- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.

Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.

Servicio de Farmacia H.U. Virgen de la Victoria Campus Universitario Teatinos s/n 29010
Málaga

Teléfono de información y gestión de citas: 951 032 057 en horario de 8:30 – 10:30

Correo electrónico: citasfarmacia.hvv.sspa@juntadeandalucia.es

Horario de atención indicado en su cita

Esta hoja no contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudarle con su tratamiento. Si tiene cualquier duda o precisa más información consulte a su médico o farmacéutico.