

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

BIKTARVY®

Bictegravir 50 mg / emtricitabina 200 mg / tenofovir alafenamida 25 mg

¿QUÉ ES BIKTARVY®? BIKTARVY® es un medicamento que contiene 3 principios activos que se emplean para tratar la infección por VIH. Estos principios activos son: emtricitabina, tenofovir alafenamida y bictegravir.

BIKTARVY® impide que el virus se multiplique, así el objetivo del tratamiento es reducir la cantidad de virus presente en su organismo hasta hacerla indetectable. Esto impide que su sistema inmune sea debilitado, concretamente ayuda a mantener un nivel adecuado las células CD4 en sangre. Las células CD4 son un tipo de glóbulos blancos importantes para combatir infecciones. No cura la infección por el VIH.

El tratamiento además reduce drásticamente el riesgo de la transmisión del virus a otras personas a través de las relaciones sexuales, de ahí que podemos decir que un sujeto con carga viral indetectable es intrasmisible

¿CÓMO SE DEBE ADMINISTRAR? Tome 1 comprimido de BIKTARVY® una vez al día. Mantenga siempre el mismo horario de administración. Trague el comprimido con un poco de líquido. No lo mastique, lo triture ni lo divida. Puede tomar BIKTARVY® con o sin alimentos.

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO. Para conseguir el objetivo del tratamiento es muy importante que tome el tratamiento correctamente TODOS LOS DIAS. La toma incorrecta de la medicación (olvidos e interrupciones) es la primera causa de fracaso del tratamiento y puede tener consecuencias graves para su salud. NO INTERRUMPA EL TRATAMIENTO por su cuenta.

¿QUE HACER SI..?

- Si toma más Biktarby del que debiera avise a su médico o acuda al Servicio de Urgencias.
- Si olvida una dosis y quedan menos de 6 horas para la siguiente dosis, sátese la dosis olvidada y siga con la pauta habitual. Si quedan más de 6 horas para la siguiente dosis, tome el comprimido olvidado.
- Si vomita antes de que transcurra 1 hora desde que se tomó la dosis de BIKTARVY®, tome otro comprimido. Si ha pasado mas de una hora no necesita tomar BIKTARVY® de nuevo.

PRECAUCIONES

- No tome BIKTARVY® si es alérgico a alguno de sus componentes.
- Consulte a su médico antes de tomar BIKTARVY® si tiene o ha tenido problemas en el hígado, incluyendo hepatitis.
- Informe a su médico si esta embarazada o planea estarlo. También si desea dar el pecho a su hijo.

INTERACCIONES: consulte con su médico o su farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Otros medicamento para el VIH y/o la hepatitis B.
- Antibióticos como: azitromicina, claritromicina, rifabutina o rifapentina.
- Antiepiléticos como carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbital o fenitoína.
- Ciclosporina (un inmunosupresor)
- Sucralfato (para el tratamiento de úlceras)
- Si toma **antiácidos** que contengan hidróxido de aluminio o de magnesio y/o suplementos de magnesio tome BIKTARVY® 2 horas antes de los suplementos o del antiácido. También puede tomar BIKTARVY® con alimentos 2 horas después de la toma de los suplementos o del antiácido.
- Si toma suplementos de **hierro** tome BIKTARVY® 2 horas antes de los mismos.

Los dos medicamentos indicados a continuación NO deben de administrarse con BIKTARVY:

- Rifampicina (un antibiótico)
- Hierba de San Juan: un medicamentos a base de plantas pausado para la ansiedad y la depresión.

EFFECTOS ADVERSOS: al igual que otros medicamentos, BIKTARVY® puede producir efectos adversos, esto no significa que todas las personas tengan que sufrirlos. Los efectos adversos mas frecuentes de BIKTARVY® son: depresión, sueños anormales, dolor de cabeza, mareos, diarrea, nauseas, cansancio.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD: conserve la medicación en un lugar fresco y protegido de la humedad. Mantenga el frasco perfectamente cerrado.

ADVERTENCIAS:

- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura.

Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación, por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.

Teléfono de información y gestión de citas: 951 032 057 en horario de 8:30 – 10:30

Correo electrónico: citasfarmacia.hvv.sspa@juntadeandalucia.es

Horario de atención indicado en su cita

Esta hoja no contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudarle con su tratamiento. Si tiene cualquier duda o precisa más información consulte a su médico o farmacéutico.

Última actualización septiembre 2024