

# HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

## DOVATO

DOLUTEGRAVIR 50 MG / LAMIVUDINA 300 MG

**¿QUÉ ES DOVATO®?** DOVATO® es un medicamento que contiene 2 principios activos que se emplean para tratar la infección por VIH. Estos principios activos son: dolutegravir y lamivudina.

DOVATO® impide que el virus se multiplique, así el objetivo del tratamiento es reducir la cantidad de virus presente en su organismo hasta hacerla indetectable. Esto impide que su sistema inmune sea debilitado, concretamente ayuda a mantener un nivel adecuado las células CD4 en sangre. Las células CD4 son un tipo de glóbulos blancos importantes para combatir infecciones. DOVATO® no cura el VIH.

El tratamiento además reduce drásticamente el riesgo de la transmisión del virus a otras personas a través de las relaciones sexuales, de ahí que podemos decir que un sujeto con carga viral indetectable es intrasmisible

**¿CÓMO SE DEBE ADMINISTRAR?** Tome 1 comprimido de DOVATO® una vez al día. Mantenga siempre el mismo horario de administración. Trague el comprimido con un poco de líquido. Puede tomar DOVATO® con o sin alimentos.

**ADHERENCIA AL TRATAMIENTO.** Para conseguir el objetivo del tratamiento es muy importante que tome el tratamiento correctamente **TODOS LOS DIAS**. La toma incorrecta de la medicación (olvidos e interrupciones) es la primera causa de fracaso del tratamiento y puede tener consecuencias graves para su salud. **NO INTERRUMPA EL TRATAMIENTO** por su cuenta.

### ¿QUE HACER SI..?

- Si toma más DOVATO® del que debiera avise a su medico o acuda al Servicio de Urgencias.
- Si olvida una dosis y quedan menos de 4 horas para la siguiente dosis, sátese la dosis olvidada y siga con la pauta habitual. No toma un a dosis doble para cmpansar dosis olvidadas.
- Si vomita antes de que transcurra 1 hora desde que se tomó la dosis de DOVATO®, tome otro comprimido. Si ha pasado mas de una hora no necesita tomar DOVATO® de nuevo.

### PRECAUCIONES

- No tome DOVATO® si es alérgico a alguno de sus componentes.
- Consulte a su médico antes de tomar DOVATO® si tiene o ha tenido problemas en el hígado, incluyendo hepatitis B o C (si tiene hepatitis B no deje de tomar DOVATO® sin el consejo de su médico, ya que la hepatitis podría empeorar).
- Informe a su médico si esta embarazada o planea estarlo. También si desea dar el pecho a su hijo.

**INTERACCIONES:** consulte con su médico o su farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- metformina.
- medicamentos llamados **antiácidos** (para tratar el ardor de estómago). **No tome un antiácido** durante las 6 horas antes de tomar Dovato, o por lo menos 2 horas después de tomarlo. Otros medicamentos que disminuyen la acidez, como ranitidina y omeprazol, pueden tomarse al mismo tiempo que DOVATO®
- suplementos o multivitamínicos que contienen calcio, hierro o magnesio. Estos **no pueden tomarse** durante las 6 horas antes de tomar DOVATO®, o por lo menos 2 horas después.
- Emtricitabina, etravirina, efavirenz, nevirapina, tripanavir/ritonavir
- Cladribina
- Rifampicina
- Fenitoína, fenobarbital, oxcarbazepina y carbamazepina.
- Hierba de San Juan.
- Medicamentos (generalmente líquidos) que contengan sorbitol, manitol, xilitol, lactitol o maltitol, si se toman con frecuencia.
- Fampridina: NO debe tomar fampridina junto con DOVATO®.

**EFFECTOS ADVERSOS:** al igual que otros medicamentos, DOVATO® puede producir efectos adversos, esto no significa que todas las personas tengan que sufrirlos. Los efectos adversos más frecuentes de DOVATO® son: dolor de cabeza, diarrea, náuseas y vómitos, molestias gastrointestinales, cansancio, erupción cutánea, picor, aumento de peso, mareo, insomnio, sueños anormales, ansiedad, pérdida de cabello, dolor articular y/o muscular y alteraciones analíticas (que su médico revisará si ocurren mediante un análisis de sangre).

**CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD:** conserve la medicación en un lugar fresco y protegido de la humedad. Mantenga el frasco perfectamente cerrado.

#### ADVERTENCIAS:

- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura.

**Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación, por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.**

**Teléfono de información y gestión de citas: 951 032 057 en horario de 8:30 – 10:30**

**Correo electrónico: [citasfarmacia.hvv.sspa@juntadeandalucia.es](mailto:citasfarmacia.hvv.sspa@juntadeandalucia.es)**

**Horario de atención indicado en su cita**

Esta hoja no contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudarle con su tratamiento. Si tiene cualquier duda o precisa más información consulte a su médico o farmacéutico.

Última actualización septiembre 2024