

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

MAVACAMTEN 2.5/5/10/15 MG

¿QUÉ ES MAVACAMTEN?

Mavacamten está indicado para el tratamiento de miocardiopatía hipertrófica obstructiva (MCHO) sintomática en adultos.

El objetivo del tratamiento es reducir el exceso de contracción del corazón y la obstrucción del flujo sanguíneo al organismo, mejorando sus síntomas y su capacidad de permanecer activo.

¿CÓMO SE DEBE ADMINISTRAR?

Debe tomar 1 cápsula una vez al día, con o sin alimentos, aproximadamente a la misma hora del día. La cápsula debe tragarse entera con agua.

Debe tener precaución al tomar zumo de pomelo mientras está con el tratamiento.

¿QUE HACER SI...?

Si toma más cápsulas de las que debe, póngase en contacto con su médico o acuda inmediatamente a un hospital si ha tomado de 3 a 5 veces la dosis recomendada.

Si olvidó tomarlo a la hora habitual, tome la dosis en cuanto lo recuerde en el mismo día y tome la siguiente dosis a la hora habitual al día siguiente. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

EMBARAZO Y LACTANCIA

Si se utiliza durante el embarazo, CAMZYOS puede dañar al feto. Antes de iniciar el tratamiento con CAMZYOS, el médico le informará del riesgo y le pedirá que se haga una prueba de embarazo para asegurarse de que no está embarazada.

Debe utilizar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento y durante los 6 meses posteriores a la interrupción del tratamiento. Si se queda embarazada mientras toma CAMZYOS, informe a su médico inmediatamente. Su médico interrumpirá el tratamiento.

No debe dar el pecho mientras esté tomando CAMZYOS.

INTERACCIONES

Debe informar a su médico o farmacéutico si está tomando alguno de los siguientes medicamentos:

- medicamentos para reducir la cantidad de ácido en el estómago (cimetidina, omeprazol.)
- antibióticos para infecciones bacterianas (claritromicina, eritromicina).
- medicamentos para tratar infecciones fúngicas (como itraconazol, fluconazol, ketoconazol)
- medicamentos para tratar la depresión (como fluoxetina, fluvoxamina o citalopram).
- medicamentos para las infecciones por VIH (como ritonavir, cobicistat o efavirenz).
- medicamentos para convulsiones o epilepsia (carbamazepina, fenitoína, fenobarbita)

EFFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes son mareos, dificultad respiratoria y desmayos.

Informe a su médico o farmacéutico inmediatamente si padece dificultad al respirar, dolor en el pecho, cansancio, palpitaciones o hinchazón de piernas.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura.

Este medicamento se dispensa en el Servicio de Farmacia del Hospital. Cuando inicie un tratamiento o cuando haya alguna modificación en el mismo su médico le dará una receta o informe para que pueda recoger la medicación.

Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación, por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.

Servicio de Farmacia H.U. Virgen de la Victoria Campus Universitario Teatinos s/n 29010 Málaga

Teléfono de información y gestión de citas: 951 032 057 en horario de 8:30 – 10:30

Correo electrónico: citasfarmacia.hvv.sspa@juntadeandalucia.es

Horario de Farmacia:

De lunes a viernes Mañanas: 9:00 - 14:00h; lunes a jueves: Tardes: 16:00 - 18:30h

Esta hoja no contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudarle con su tratamiento. Si tiene cualquier duda o precisa más información consulte a su médico o farmacéutico.

Última actualización OCTUBRE 2024