

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

TAFAMIDIS 61 MG

¿QUÉ ES EL TAFAMIDIS?

Tafamidis está indicado en adultos para el tratamiento de amiloidosis por transtiretina nativa o hereditaria en pacientes adultos con miocardiopatía (ATTR-CM).

En los pacientes con esta enfermedad, la TTR se descompone y puede formar unas fibras llamadas amiloide. El amiloide puede acumularse entre las células de su corazón (conocido como miocardiopatía amiloide por transtiretina (ATTR-CM) y otros lugares del organismo. El amiloide provoca los síntomas de esta enfermedad. Cuando esto ocurre, impide que su corazón funcione con normalidad.

El objetivo del tratamiento es evitar que se descomponga la TTR y forme amiloide

¿CÓMO SE DEBE ADMINISTRAR?

Debe tomar 1 cápsula de 61 mg una vez al día, con o sin alimentos, aproximadamente a la misma hora del día. Las cápsulas deben tragarse enteras y sin aplastar ni cortar.

¿QUÉ HACER SI...?:

Si vomita después de tomar el medicamento y puede reconocer la cápsula intacta, debe tomar otra dosis ese mismo día; si no puede ver la cápsula de Tafamidis, entonces no es necesario tomar otra dosis, sino que puede tomar la medicación el día siguiente de forma habitual.

Si olvidó tomar una dosis, tómese la cápsula en cuanto se acuerde. Si faltan menos de 6 horas para la siguiente dosis, sáltese la olvidada y tome la siguiente dosis a la hora habitual. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

PRECAUCIONES:

No debe tomar Tafamidis si está embarazada o en periodo de lactancia.

Si puede quedarse embarazada, debe utilizar un método anticonceptivo durante el tratamiento y durante un mes después de interrumpirlo.

EFFECTOS ADVERSOS:

Frecuentes: pueden afectar hasta a 1 de cada 10 personas

- Diarrea
- Erupción, picor

INTERACCIONES:

Debe informar a su médico o farmacéutico si está tomando alguno de los siguientes medicamentos:

- Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos
- Medicamentos diuréticos (p. ej., furosemida, bumetanida)
- Medicamentos para tratar el cáncer (p. ej., metotrexato, imatinib)
- Estatinas (p. ej., rosuvastatina)

- Medicamentos antivirales (p. ej., oseltamivir, tenofovir, ganciclovir, adefovir, cidofovir, lamivudina, zidovudina, zalcitabina)

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD:

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el blíster y en el estuche.

La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

ADVERTENCIAS:

Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital

Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación sin abrir, por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.

Servicio de Farmacia H.U. Virgen de la Victoria Campus Universitario Teatinos s/n 29010
Málaga

Teléfono de información y gestión de citas: 951 032 057 en horario de 8:30 – 10:30

Correo electrónico: citasfarmacia.hvv.sspa@juntadeandalucia.es

Horario de atención indicado en su cita

Esta hoja no contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudarle con su tratamiento. Si tiene cualquier duda o precisa más información consulte a su médico o farmacéutico.

Última actualización ABRIL 2024