

Las siglas “FPI” significan “**fibrosis pulmonar idiopática**”, una enfermedad rara que afecta únicamente entre 14 y 43 personas de cada 100.000 al año.

“Fibrosis” es el término que designa la acumulación de tejido cicatricial. Cuando una persona presenta FPI, el tejido pulmonar, se cicatriza, se engrosa y se vuelve rígido. La FPI es una enfermedad progresiva, lo que significa que empeora con el paso del tiempo.

Los diminutos sacos de aire (conocidos como alvéolos) y los vasos sanguíneos de los pulmones son responsables del aporte de oxígeno a todas las partes del cuerpo, pero, a medida que avanza la cicatrización del tejido pulmonar y de los sacos de aire, se dificulta el paso del oxígeno a través de los pulmones y hacia el torrente sanguíneo. Esto deriva en una dificultad para respirar y, en última instancia, en que los órganos no reciban el oxígeno suficiente para su funcionamiento correcto.

En la mayoría de los casos, nunca se establece la causa concreta de esta cicatrización pulmonar.

Es muy importante que:

- Se vacune anualmente.
- Realice actividad física a diario.
- Mantenga una dieta adecuada.
- Trate de forma precoz las infecciones.
- No olvide sus citas en consulta.



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo



Recomendaciones en
fibrosis pulmonar
idiopática
NINTEDANIB

Servicio de
Neumología
Hospital
Universitario Virgen
de la Victoria

TRATAMIENTO: NINTEDANIB

Oxigenoterapia

¿Cómo y cuando debo tomarlo?

- La dosis diaria es **una capsula en el desayuno y en la cena.**
- La dosis debe separarse 12 horas aproximadamente.
- Debe tomarse junto con alimentos para evitar molestias gástricas.
- Deben de tomarlo con liquido sin masticar, ni titurar ni disolver.
- Intente mantener siempre el mismo horario.

Si se me olvida... NUNCA tome dosis doble para compensar.

Rehabilitación pulmonar

¿Qué efectos adversos puede producir?

- Los efectos adversos más frecuentes son:
 - Vómitos y /o diarrea.
 - Elevación de enzimas hepáticas.
 - Alteración del perfil renal.
- Por ello tendrá que realizarse controles analíticos***
- Aumento de la tensión arterial.
 - Pérdida de peso y apetito.

Consultar con su médico si...

- Aparece hemorragia
- Reacción alérgica.
- Dolor abdominal intenso.
- Si se pone piel o conjuntivas amarillas.
- Si dolor intenso en el pecho.

Trasplante de pulmón

INTERACCIONES

-Debe prestar especial cuidado con:

-Ketoconazol, eritromicina, Ciclosporina.

.Hierba de San Juan, Rifampicina, Carmazepina.

NO TOMAR SI ES ALÉRGICO A LA SOJA O CACAHUETE.

Si aumento de deposiciones
tomar
LOPERAMIDA