¿QUÉ DEBE HACER TRAS LA PRUEBA?

Después de la prueba debe seguir las siguientes recomendaciones:

Beber abundantes líquidos en las siguientes 48 horas, ya que el contraste yodado se elimina por la orina. Salvo que exista una indicación médica de restricción de líquidos.

Si ha tomado sulfato de bario vía oral, podría sufrir estreñimiento o diarrea en las horas siguientes; si persiste, acuda a su médico de familia.

En caso de aparición de una reacción alérgica tardía en su domicilio, no dude en acudir a su médico de familia o a un Servicio de Urgencias.

En caso de ser diabético y tomar METFORMINA, es recomendable suspender la toma de este fármaco 2 dias más.

El resto de medicación puede seguir tomándolo, dado que su ingesta, no interfiere con el contraste que se le ha administrado.

¿CÓMO OBTENDRÁ LOS RESULTADOS?

El informe lo recibe el especialista solicitante y/o el médico de familia a través del sistema informático. Además en Cli+ también podrá ver el informe y ver las imágenes

Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo

Hospital Universitario Virgen de la Victoria
Campus Universitario Teatinos, sin 29010-
Málaga - España
951032000 / Fax: 951 032 022
http://www.huw.es

Fecha de última revisión: 17/05/*2021*

Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo

Hospital Universitario Virgen de la Victoria

TAC CON CONTRASTE

Unidad de Gestión Clínica de Radiología y Diagnóstico por Imagen

EN QUÉ CONSISTE. PARA QUÉ SIRVE:

Usted va a realizarse una Tomografía Axial Computerizada (TAC ó SCANER), a petición de su médico.

A diferencia de la resonancia magnética, el anillo en el que va a entrar es muy corto por lo que no produce sensación de claustrofobia.

Se le puede administrar un medio de contraste por vía oral, intravenosa o ambas. Su función es la de ver mejor el órgano o zona de estudio.

En caso de la administración de contrastes intravenoso, usted deberá acudir en ayunas de 6 horas y firmar un consentimiento autorizando la administración del contraste.

QUÉ EFECTOS LE PRODUCIRÁ

Durante el estudio, sólo va a notar la punción de la aguja y una sensación de calor (en genitales y garganta) durante varios segundos al inyectar el contraste,así como sabor metálico en algunos casos.

Cualquier actuación médica tiene riesgos. La mayor parte de las veces la intervención no produce daños o efectos secundarios indeseables. Pero a veces no es así. Por eso es importante que usted conozca los riesgos que pueden aparecer en este proceso o intervención.

La mayor parte de las veces la intervención no produce daños o efectos secundarios indeseables. Pero a veces no es así. Por eso es importante que usted conozca los riesgos que pueden aparecer en este proceso o intervención.

LOS MÁS FRECUENTES

Alteración de la función renal. Este riesgo es menor con los contrastes actuales. Además previamente se comprueba su función renal con una analítica reciente.

La punción de la vena puede también presentar complicaciones. Estas son muy raras y no suelen pasar de una ligera molestia en la zona de la punción. Sin embargo, algunas pueden ser más importantes:

- Sangrado por el sitio de la punción (hematoma).
- Extravasación de contraste, es decir, salida del medio de contraste durante la inyección, lo que provoca dolor e hinchazón.

En caso de extravasación del contraste se le indicará que:

- Mantenga elevado el brazo afectado para favorecer la reabsorción del líquido extravasado.
- Aplicar frío local.
- Vigilar la zona afectada, si aparecieran síntomas como inflamación, dolor progresivo o úlceras deberá contactar con su médico de familia o acudir a urgencias.

LOS MÁS GRAVES:

Son las llamadas alergias al yodo.

No existen reacciones cruzadas; es decir, que usted tenga alergias a otros medicamentos, a antibióticos o a alimentos con yodo (mariscos) no implica que tenga mayor riesgo de alergia al contraste yodado.

SITUACIONES ESPECIALES QUE DEBEN SER TENIDAS EN CUENTA

Si usted es diabético y está tomando un determinado antidiabético oral (Clorhidrato de Metformina) es probable que le hayan indicado que suspenda el tratamiento previo a la realización de la prueba.