

Teléfonos de interés

Centralita del Hospital:
951032000 / 951032500

Servicio de Anatomía Patológica:

- Recepción: 951 032 170
- Administrativas:
951 032 040 / 951 032 049
- Citotécnicos: 951 032 202



Horario para información

- De lunes a viernes:
de 8:00 a 15:00 horas.

Llámenos si tiene alguna duda.

D^a Susana Domínguez Camacho,
Enfermera Anatomía Patológica

Dra. D^a M. Isabel Hierro Martín,
Directora UGCI Provincial Anatomía
Patológica

Hospital Universitario Virgen de la
Victoria Campus Universitario
Teatinos, S/N
29010 Málaga España
951032000 / Fax: 951 032 022
<http://www.huvv.es>

Fecha de última revisión: 14/11/2024



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo

**Hospital Universitario
Virgen de la Victoria**



**Recomendaciones para
la realización de punción-
aspiración con aguja fina**

**UNIDAD DE ANATOMÍA
PATOLÓGICA**

PAAF

1. PAAF significa “Punción Aspiración con Aguja Fina” y se solicita ante el hallazgo de un nódulo o masa que le hayan detectado, para analizarlo. Consiste en obtener células de ese nódulo o masa para su estudio al microscopio. Se realiza en el Servicio de Radiodiagnóstico porque se realiza guiando la zona de punción con una ecografía.

Consentimiento informado

Esta prueba requiere la firma previa del paciente del consentimiento informado

Alergias

Es importante que haya informado a su Médico si tiene alergias (yodo...) o si toma anticoagulantes o antiagregantes (Sintrom®, Adiro®, Disgren®, Xarelto®, Eliquis®, Lixiana®...) porque puede necesitar algún cambio para poder efectuar la punción.

Ayunas

No hace falta estar en ayunas.

Cuidados

Tras la punción se le colocará un apósito (“tirita”), que debe mantener 24 horas. Cuando se bañe, seque bien el punto de la punción y aplíquese un desinfectante como Betadine® o Cristalmina® durante uno o dos días.

Manejo del dolor

Si tiene dolor tras la punción, puede tomar un calmante durante un mínimo de 48 horas EXCEPTO ASPIRINA® o ÁCIDO ACETILSALICÍLICO. Si tiene dudas de qué calmante tomar, consulte a su Médico de Familia.

Precauciones

Evite golpes o roces en la zona de punción.

Recomendaciones

Si la punción ha sido de tiroides, evite consumir alimentos y bebidas calientes durante las 6 horas siguientes a la punción.

Si le da fiebre, se le hincha mucho o le sale un hematoma llamativo u otra reacción inesperada, acuda al Servicio de Urgencias.

Tras el estudio citológico por el Patólogo, enviaremos el informe con el resultado al Médico que se lo haya solicitado, quien le informará en su próxima cita.

