

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

RUXOLITINIB crema: vitíligo (Oplezura®)

¿QUÉ ES RUXOLITINIB?

Ruxolitinib pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como inhibidores de la Janus quinasa (JAK) y se utiliza para tratar el vitíligo con afectación facial en adultos y adolescentes a partir de 12 años.

Este medicamento disminuye la actividad de las JAK, consiguiendo reducir la actividad del sistema inmunitario contra las células que producen melanina, lo que permite a la piel producir el pigmento y recuperar su color habitual.

Es importante que sepa que la repigmentación adecuada de la piel puede requerir tratamiento más allá de 6 meses.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE ADMINISTRA?

- Ruxolitinib crema se aplica **2 veces al día**, con un mínimo de 8 h entre aplicaciones.
- Aplique una capa fina de sobre las zonas despigmentadas de la piel.
- Lávese las manos después de aplicarse la crema, a no ser que esté tratando sus manos. Si otra persona le aplica el medicamento, deberá lavarse las manos después de la aplicación.
- Evite lavar la piel tratada durante, al menos, 2 horas después de la aplicación de la crema.
- **Consideraciones importantes:**
 - No debe aplicar crema en más del 10% (una décima parte) del cuerpo. Esta área corporal representa el equivalente a diez veces la palma de una mano con los cinco dedos.
 - Tampoco debe aplicar la crema en zonas distintas a las que le haya indicado su médico (ni puede usarse en labios, ojos, boca o vagina).
 - No se deben usar más de dos tubos de 100 gramos al mes.
 - Se puede interrumpir el tratamiento al alcanzar una repigmentación adecuada y reiniciarlo en caso de que reaparezca la despigmentación. No es necesaria una reducción gradual o progresiva.
 - Si tras un año de tratamiento la repigmentación es inferior al 25% en las zonas tratadas se debe considerar la suspensión del tratamiento.

QUE HACER SI...

Si ha olvidado aplicarse la crema en el plazo previsto, hágalo cuando se acuerde y continúe con la pauta posológica normal, siempre que pasen al menos 8 horas entre dos dosis.

PRECAUCIONES

No use Ruxolitinib crema:

- si es alérgico a ruxolitinib o a alguno de los demás componentes de este medicamento.
- si está embarazada o en periodo de lactancia.

EMBARAZO Y LACTANCIA

Si está embarazada o en periodo de lactancia, no debe utilizar Ruxolitinib crema. Si usted es una mujer en edad fértil, debe utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y durante las 4 semanas siguientes a la última aplicación. Tampoco se debe utilizar Ruxolitinib crema si está en periodo de lactancia. Puede iniciar el periodo de lactancia aproximadamente cuatro semanas después de aplicarse la crema por última vez.

EFFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. La reacción adversa más frecuentemente notificada es acné en el lugar de aplicación. Puede consultar el prospecto del fármaco para más información.

INTERACCIONES

La aplicación de otros medicamentos tópicos usados para tratar otras enfermedades en las mismas zonas de la piel debe realizarse un mínimo de 2 horas después de la aplicación de ruxolitinib crema. Esto también se aplica al uso de protector solar o emoliente.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD:

No conservar a una temperatura superior a 30 °C.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Una vez abierto el tubo, utilice la crema en un plazo de 6 meses, pero no después de la fecha de caducidad.

Servicio de Farmacia H.U. Virgen de la Victoria Campus Universitario Teatinos s/n
29010 Málaga

Teléfono de información y gestión de citas: 951 032 057 en horario de 8:30 – 10:30

Correo electrónico citas: citasfarmacia.hvv.sspa@juntadeandalucia.es

Correo electrónico farmacéutico:

atencionfarmaceutica.hvv.sspa@juntadeandalucia.es

Horario de atención indicado en su cita.

Esta hoja no contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudarle con su tratamiento. Si tiene cualquier duda o precisa más información consulte a su médico o farmacéutico.