

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

INFLIXIMAB

¿QUÉ ES INFLIXIMAB?

Infliximab es un anticuerpo monoclonal, un medicamento de naturaleza proteica. Infliximab actúa bloqueando el factor de necrosis tumoral alfa (TNF), una molécula con importante papel en la inflamación.

¿CUAL ES EL OBJETIVO DEL TRATAMIENTO CON INFLIXIMAB?

Reducir la inflamación que está dañando los tejidos del aparato digestivo. Así mejorarán o desaparecerán los síntomas de la enfermedad y mejorará su calidad de vida. La disminución de la inflamación además disminuye o evita complicaciones de la enfermedad, como abscesos o fistulas.

¿CÓMO SE ADMINISTRA INFLIXIMAB?

Infliximab se administra vía intravenosa (generalmente a través de una de las venas de su brazo). El tratamiento lo administrará el personal de enfermería del Hospital de Día. La perfusión de infliximab dura unas dos horas. Si tras varias infusiones tolera bien el fármaco es posible que le administren la infliximab en menos tiempo.

Con el fin de disminuir el riesgo de reacciones relacionadas con la administración es posible que antes de infliximab le administren otros medicamentos.

La dosis de infliximab la decide su médico y dependerá de su peso corporal. La frecuencia más habitual con la que se administra infliximab es la siguiente:

- Semana cero: primera dosis.
- Semana 2: segunda dosis.
- Semana 6: tercera dosis.
- Cada 6-8 semanas: el resto de dosis.

Si su peso corporal varía, por favor informe en hospital de día para ajustar la dosis de infliximab.

¿DÓNDE SE PREPARA INFLIXIMAB?

Su medicación se prepara de forma individualizada (con su dosis exacta) en el Servicio de Farmacia. La preparación se hace en condiciones de esterilidad el mismo día de su administración. Intentaremos que espere el menor tiempo posible.

DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE INFLIXIMAB...

Avisé inmediatamente si nota quemazón, dolor o hinchazón en el lugar de inyección. También si nota signos de reacción alérgica como hinchazón de manos, pies, tobillos, cara, labios, boca o garganta, dificultad para respirar, erupción en la piel...

La reacción alérgica puede suceder en las 2 horas después de la perfusión o incluso más tarde. Es por este motivo por el que puede permanecer bajo vigilancia un tiempo tras la administración.

¿CUÁNDO NO DEBO ADMINISTRARME INFLIXIMAB?

- Si es alérgico a alguno de los principios activos o a alguno de los componentes.
- Si tiene una infección grave, incluyendo tuberculosis.
- Si tiene insuficiencia cardíaca moderada o grave.

PRECAUCIONES

Avisé a su médico si:

- tiene fiebre u otro cualquier otro signo de **infección**.
- Si es portador del virus de la hepatitis B o ha tenido una infección por este virus.
- Si padece problemas de corazón.
- Si se va a realizar **un intervención quirúrgica o dental**.
- Si tiene o ha tenido algún tipo de cáncer.
- Si tiene que **vacunarse**. Hay algunas vacunas (VIRUS O BACTERIAS VIVAS) que no deben administrarse durante el tratamiento con infliximab.
- Si tiene alguna enfermedad desmielinizante como la esclerosis múltiple.

EFFECTOS ADVERSOS:

Al igual que todos los medicamentos, infliximab puede producir efectos adversos, esto no significa que todas las personas tienen porque sufrirlos.

- Efectos adversos graves: Reacción alérgica.
- Efectos adversos más frecuentes: dolor de estómago, náuseas, dolor de cabeza, infecciones víricas y del tracto respiratorio superior.

¿QUÉ HACER SI...?:

Si se olvida una cita en Hospital de Día, por favor, solicite una nueva tan pronto como sea posible.

EMBARAZO Y LACTANCIA

Infliximab es seguro en el embarazo y la lactancia. También en hombres que desean concebir. Aun así, debe informar a su médico si está embarazada, cree que puede estarlo o está en periodo de lactancia. Si recibe infliximab durante el embarazo o la lactancia debe informar a los médicos de su bebé ya que deben adaptar su calendario vacunal.

NIVELES

Periódicamente su médico le pedirá un control analítico para ver cómo son los niveles de infliximab en su organismo. Esto ayudará a guiar la terapia y a individualizarla según sus necesidades. Es muy importante que se saque la sangre en Hospital de Día justo antes de administrarse el infliximab. Si se administra infliximab antes o después de la fecha que le correspondería, avise a su médico para que interprete los niveles de fármaco en sangre correctamente.

Esta hoja no contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudarle con su tratamiento. Si tiene cualquier duda o precisa más información consulte a su médico o farmacéutico.