Junta de Andalucía

Unidad de Pacientes Externos.
Servicio de Farmacia
Hospital Universitario Virgen de la Victoria
Consejería de Salud y Familias
Servicio Andaluz de Salud

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

SYMTUZA

DARUNAVIR/COBICISTAT/EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDA

¿QUÉ ES SYMTUZA®? SYMTUZA® es un medicamento que contiene varios principios activos que se emplean para tratar la infección por VIH. Estos principios activos son: darunavir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir alafenamida.

SYMTUZA® impide que el virus se multiplique, así el objetivo del tratamiento es reducir la cantidad de virus presente en su organismo hasta hacerla indetectable. Esto impide que su sistema inmune sea debilitado, concretamente ayuda a mantener un nivel adecuado las células CD4 en sangre. Las células CD4 son un tipo de glóbulos blancos importantes para combatir infecciones. SYMTUZA® no cura el VIH.

El tratamiento además reduce drásticamente el riesgo de la transmisión del virus a otras personas a través de las relaciones sexuales, de ahí que podemos decir que un sujeto con carga viral indetectable es intrasmisible.

¿CÓMO SE DEBE ADMINISTRAR? Tome 1 comprimido de SYMTUZA® una vez al día **acompañado de alimentos.** Mantenga siempre el mismo horario de administración. Trague el **comprimido entero** con un poco de líquido.

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO. Para conseguir el objetivo del tratamiento es muy importante que tome el tratamiento correctamente **TODOS LOS DIAS**. La toma incorrecta de la medicación (olvidos e interrupciones) es la primera causa de fracaso del tratamiento y puede tener consecuencias graves para su salud. **NO INTERRUMPA EL TRATAMIENTO** por su cuenta.

¿QUE HACER SI..?

- Si toma más SYMTUZA® del que debiera avise a su médico o acuda al Servicio de Urgencias.
- Si se olvida una dosis y se da cuenta en menos de 12 horas después de la hora a la que toma normalmente SYMTUZA®, tome el comprimido inmediatamente. Después tome la dosis siguiente a la hora habitual. Si se da cuenta a las 12 horas o más después de la hora a la que toma normalmente SYMTUZA®, no tome la dosis olvidada y tome después las dosis siguientes a la hora habitual. No tome dosis doble.
- Si vomita antes de que transcurra 1 hora desde que se tomó la dosis de SYMTUZA®, tome otro comprimido. Si ha pasado más de una hora no necesita tomar SYMTUZA® de nuevo.

PRECAUCIONES

No tome SYMTUZA® si es alérgico a alguno de sus componentes.
Consulte a su médico antes de tomar SYMTUZA® si:

- Le aparecen una erupción en la piel.
- tiene o ha tenido problemas en el hígado, incluyendo hepatitis B o C (si tiene hepatitis B no deje de tomar SYMTUZA® sin el consejo de su médico, ya que la hepatitis podría empeorar).
- Tiene problemas de riñón
- tiene diabetes, hemofilia y/o si aparecen problemas en los huesos o en los músculos
- es alérgico a las sulfamidas (un grupo de antibióticas)

Informe a su médico si está embarazada o planea estarlo. Existen alternativas de tratamiento indicadas para mujeres que están embarazadas o que planean estarlo. No suspenda el tratamiento por su cuenta ya que esto podría tener consecuencias para usted o para el feto. Si desea dar el pecho consulte antes con su médico.

INTERACCIONES: **SYMTUZA® puede interaccionar con muchos medicamentos**. Es importante que consulte con su médico o su farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal junto a SYMTUZA®.

No se debe tomar SYMTUZA® con los siguientes medicamentos: alfuzosina, amiodarona, dronedarona, ivabradina, ranolazina, colchicina, rifampicina, pimozida, lurasidona, quetiapina, derivados ergotamínicos, hierba de San Juan, lovastatina, simvastatina, midazolam, triazolam, sildenafilo, avanafilo, ticagrelol, naloxegol, dapoxetina, domperidona, tenofovir disoproxil, lamivudina.

Además, hay medicamentos pueden afectar a la eficacia de SYMTUZA®. Del mismo modo SYMTUZA® puede influir sobre los efectos de otros medicamentos que usted este tomando. Su médico puede considerar necesarios cambios en su tratamiento o realizarle análisis de sangre adicionales.

EFECTOS ADVERSOS: al igual que otros medicamentos, SYMTUZA® puede producir efectos adversos, esto no significa que todas las personas tengan que sufrirlos. Los efectos adversos más frecuentes de SYMTUZA® son: dolor de cabeza, diarrea, erupción cutánea, cansancio, náuseas, vómitos, molestias digestivas, disminución del apetito sueños anómalos, dolor articular y/o muscular y alteraciones analíticas (que su médico revisará si ocurren mediante un análisis de sangre).

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD: conserve la medicación en un lugar fresco y protegido de la humedad. Mantenga el frasco perfectamente cerrado.

ADVERTENCIAS:

- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura.

Si por finalización o cambio de tratamiento le sobra medicación, por favor, devuélvala al Servicio de Farmacia de su Hospital.

Teléfono de información y gestión de citas: 951 032 057 en horario de 8:30 – 10:30

Correo electrónico: citasfarmacia.hvv.sspa@juntadeandalucia.es

Horario de atención indicado en su cita

Esta hoja no contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudarle con su tratamiento. Si tiene cualquier duda o precisa más información consulte a su médico o farmacéutico.

Última actualización febrero del 2025