

ADMINISTRACION DE BULEVIRTIDA

SUBCUTÁNEA.

KIT PARA LA ADMISINTRACION DE BULEVIRTIDA.

El kit incluye el material necesario para la reconstitución y administración subcutánea de bulevirtida. El kit incluye material para 30 días, excepto las ampollas de agua (incluye 40 unidades).

- Aguja para la reconstitución del medicamento: aguja semiromboidal de 40 mm (color rojo)
- Aguja para la administración subcutánea con protección de seguridad (color marrón).
- Contenedor para objetos punzantes. Se utiliza para desechar de forma adecuada las agujas usadas.
- Jeringas de dosificación: para la reconstitución de la medicación y la administración de la misma.
- Agua para preparaciones estériles, ampollas de 10 ml.

Importante:

- Las agujas y las jeringas son de un solo uso.
- No utilice el material si el envase estéril o productos están dañados.
- No utilice el material pasada la fecha de caducidad.

¡Tenga cuidado para evitar heridas provocadas por las agujas durante el procedimiento de preparado de la medicación!

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE BULEVIRTIDA.

- Utilice una superficie limpia y despejada para preparar y administrarse la medicación.
 - Puede administrarse bulevirtida en el abdomen o en la parte superior de los muslos.
1. Lávese correctamente las manos antes de la preparación de la medicación.
 2. Saque el vial de la nevera y limpie la parte superior del vial con un algodón nuevo empapado en alcohol y deje que se seque al aire.

3. Coja la jeringuilla y coloque en ella la aguja más larga (roja) y retire el capuchón. Abra la ampolla de agua estéril e inserte la aguja en el vial. Invierta la ampolla de agua estéril y tire lentamente del émbolo hasta tener 1 ml de agua estéril dentro de la jeringuilla.
4. Introduzca la aguja con agua estéril en el vial de bulevirtida en ángulo (no verticalmente). Inyecte el agua estéril para que caiga lentamente por la pared del vial.
5. Golpee suavemente el vial de bulevirtida con la punta de los dedos 10 segundos para que el polvo se empiece a disolver. A continuación, gire suavemente el vial de bulevirtida entre las manos para que se mezcle completamente. Asegúrese de que no hay polvo de bulevirtida pegado en las paredes del vial.
6. Cuando esté totalmente mezclada la solución de bulevirtida debe ser transparente. Si la solución de bulevirtida tiene espuma o es amarillenta, déjela que se disuelva más tiempo. Puede tardar minutos.

INSTRUCCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BULEVIRTIDA.

1. Saque la medicación del vial: introduzca la aguja en el vial de bulevirtida líquida. Invierta suavemente el vial y tire lentamente del émbolo para sacar el 1 ml de bulevirtida. Asegúrese de sacar todo el contenido del vial.
2. Quite la aguja de la jeringuilla y deséchelo en el contenedor para objetos punzantes sin volver a colocar el capuchón.
3. Coloque la aguja más corta en la jeringuilla.
4. Limpie el lugar de inyección con un algodón nuevo empapado en alcohol.
5. Escoja un lugar diferente del que utilizó para su última inyección. Coja un pellizco de la piel alrededor del lugar de inyección. Inserte la aguja con un ángulo de 45 grados. Se debe introducir la mayor parte de la aguja.
6. Empuje lentamente el émbolo todo su recorrido para inyectar la medicación.
7. Retire la aguja de la piel.
8. Deseche el material en el contenedor de objetos punzantes.

Estas instrucciones son un resumen para ayudarle en la preparación y administración de su medicación. Le recomendamos que lea el prospecto del medicamento y que consulte cualquier duda con su médico o farmacéutico.