

## H-18.2 VALORACIÓN Y CUIDADOS EN EL DOLOR

Fecha de revisión: 19-abr-11

### VALORACIÓN DEL DOLOR A PACIENTES CON DEMENCIA

-PAIN ASSESSMENT IN ADVANCED DEMENTIA (PAINAD)-

Items	0	1	2	Puntuación
Respiración Independiente de la vocalización	Normal	Respiración laboriosa esporádica Cortos periodos de hiperventilación	Respiración laboriosa y ruidosa Largos periodos de hiperventilación Respiración de Cheyne-Stoke	
Vocalización negativa	Ninguna	Gemidos o lamentos esporádicos Habla con volumen bajo o desaprobación	Llamadas agitadas o repetitivas Gemidos o lamentos con volumen alto, llanto	
Expresión Facial	Sonriente o inexpressiva	Triste, asustada o ceñuda	Muecas de disgusto o desaprobación	
Lenguaje Corporal	Relajado	Tenso, anda de un lado para otro, no deja de mover las manos	Rígido, puños cerrados, rodillas flexionadas, agarra/empuja, agresividad física	
Capacidad de alivio	No necesita alivio	Se distrae o tranquiliza por la voz o el contacto	No es posible aliviarlo, distraerlo o tranquilizarlo	
<b>Total</b>				

0	4	7	10
<b>Dolor leve</b>	<b>Dolor moderado</b>	<b>Dolor intenso</b>	

Fuente: Warden, V. et al.: *Development and psychometric evaluation of the Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD) scale*. J Am Med Dir Assoc 2003; 4(1):9-15.

Rev.: Modificado por: C. Florez A. Romero, J. Reyes.