

## H-7.1

## HIPODERMOCLISIS

FÁRMACOS UTILIZADOS POR VÍA SUBCUTÁNEA

Fecha de revisión: 1-Abril -11

Principio activo	Indicación	Presentación	Mezcla de Fármacos
Cloruro mórfico	Dolor Disnea	1 ml 1%= 10mg 1 ml 2%= 20 mg 2 ml 2%= 40 mg	Midazolan+haloperidol+ hioscina 0 metoclopramida.
Tramadol	Dolor	100 mg/2 ml	Haloperidol. Midazolan+metoclopramida o hioscina.
Metoclopramida	Vómitos	10 mg/2 ml	Haloperidol, hioscina. midazolan tramadol, morfina.
Haloperidol	Nauseas Vómitos Deliriun	5 mg/1 ml	Hioscina, tramadol morfina. midazolan, metoclopramida.
Levomepromacina	Deliriun	25 mg/1 ml	
N - metil bromuro de hioscina	Estertores	20 mg/1 ml	Midazolan+haloperidol metoclopramida tramadol morfina.
Escopolamina	Vómitos Estertores pre -morten	0,5 mg/1ml	
Dexametasona	Dolor, disnea, astenia, anorexia, compresión medular, síndrome de vena cava, obstrucción intestinal	4 mg/1 ml 40 mg/5 ml	No se debe mezclar.
Midazolan	Sedación Crisis convulsiva	15 mg/3 ml	haloperidol metoclopramida tramadol morfina, Hioscina

Sánchez de Miguel: Riestra Fernández A.: Vía subcutánea: indicaciones y manejo. Jano 17 de abril de 2009. N.º 1.734 pg 23-25