

VENDAJE AMPUTACIÓN FEMORAL

El vendaje compresivo reduce el edema postquirúrgico (hinchazón), activa el metabolismo y da forma correcta al muñón. Si este no se realiza el muñón permanecerá inflamado, doloroso y suave, estos factores no son adecuados para poder utilizar posteriormente una prótesis.

1

Colocar al paciente boca arriba en una postura cómoda y empezar el vendaje por la cara anterior del muslo a nivel del ligamento inguinal, próximo a la raíz del muslo y sujetar la venda con una mano.



2

Bajar la venda cubriendo longitudinal mente la cara anterior del muslo y pasar a la cara posterior hasta llegar a nivel del surco glúteo. Se repite 2 o 3 veces las vueltas longitudinales



3

Se realizan 2 vueltas circulares para sujetar vueltas longitudinales de anclajes



4

Se lleva la venda al extremo distal del muñón y se inicia vendaje en espiga, superponiendo la venda al 50% desde la parte distal, donde aplicaremos más tensión, hasta la parte proximal disminuyendo la tensión según ascendemos hasta la parte superior del muñón.



Se puede finalizar el vendaje con dos vueltas a la cintura para mayor sujeción poniendo al paciente de lado. Se finaliza con fijaciones de esparadrapo (no con sujeciones que puedan pinchar).

Importante: La parte del vendaje con más tensión será siempre la situada en el extremo distal del muñón para obtener una forma cónica. El vendaje ha de recubrir el muñón totalmente.