

UNIDAD DE EXPLORACIONES DE APARATO DIGESTIVO PROTOCOLO DE PREPARACIÓN

RECTOCOLONOSCOPIA DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA PREPARACIÓN CON CITRAFLEET (sobres)

Esta preparación no se realizará en enfermos que presenten insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, o ascitis. Solicite, si es el caso, una preparación alternativa.

- Lea las advertencias, precauciones y contraindicaciones en el prospecto de la medicación.
- Si toma medicación con hierro deberá suspenderla 7 días antes de la exploración.
- Si toma antiagregantes o anticoagulantes consulte con su médico. Suelen suspenderse antes de la exploración y, en ocasiones, sustituirse por heparina u otro fármaco, según protocolo.
 - Los antiagregantes (Ácido acetilsalicílico, Triflusal, Ticlopidina, Clopidogrel, Ticagrelol, Prasugrel, ...) suelen suspenderse 5-7 días antes de la exploración.
 - o Los anticoagulantes (Sintrom, Dabigatrán, Rivaroxabán, Apixabán, Edoxabán, ...) suelen suspenderse 1-5 días antes de la exploración.
- Si es diabético vigile su glucemia y ajuste la dosis de medicación. Consulte con su médico.
- El resto de su medicación podrá tomarla, incluso durante la preparación.
- Avise si es alérgico a algún medicamento, látex, huevo, soja o sulfitos.
- Si no dispone de la preparación se le puede facilitar gratuitamente en la Unidad de Exploraciones.
- En personas muy estreñidas o preparación inadecuada en colonoscopia previa se aconseja hacer la dieta baja en grasas y sin residuos 7 días, así como tomar un laxante los 7 días previos (ej. Bisacodilo). Consulte con su médico.
- Lea atentamente y firme el consentimiento informado.
- Debe venir con un acompañante adulto responsable del desplazamiento a domicilio y presente durante las horas posteriores al procedimiento.
- Vístase con ropa y calzado cómodos, fáciles de quitar y poner. Elimine el esmalte de las uñas.
- Durante la exploración se le administrará medicación sedante por vía endovenosa.
- Después de la exploración no deberá conducir ni manejar maquinaria peligrosa.

72 HORAS ANTES DE LA EXPLORACIÓN (3 DÍAS ANTES)

Seguirá una dieta baja grasas y sin residuos (SIN frutas, verduras, legumbres o productos integrales)

PERMITIDO (PUEDE TOMAR)	NO PERMITIDO (NO PUEDE TOMAR)
Arroz, pastas no integrales, carnes y pescados no	
grasos a la plancha o cocidos sin salsas, caldos	Ensaladas, verduras, legumbres, carnes o
desgrasados (filtrado) y sin verduras, patatas en puré o	pescados grasos o en salsa, frutas, embutidos,
cocidas sin piel, quesos frescos, galletas no integrales,	frutos secos, zumos, leche y productos lácteos
pan blanco o tostado no integral, leche desnatada,	enteros, quesos grasos, chocolate, pasteles y
yogurt natural desnatado, café, té e infusiones y	bebidas con burbujas (con gas).
bebidas sin burbujas (sin gas) con o sin azúcar	

24 HORAS ANTES DE LA EXPLORACIÓN (1 DÍA ANTES)

Seguirá una dieta sólo con líquidos claros. No tomará sólidos ni tampoco zumos o leche. Líquidos claros: agua, caldo filtrado, infusiones, té y bebidas sin burbujas (sin gas) con o sin azúcar.

El día de la exploración podrá tomar agua hasta 2 HORAS antes de la misma.



CÓMO TOMAR EL EVACUANTE (2 dosis)

PRIMERA DOSIS (1ª dosis):

- Siguiendo el horario indicado tomará el primer sobre de Citrafleet diluido en 150 ml de agua fría.
- Esperará 15 minutos.
- A continuación, beberá 2 litros adicionales de líquidos claros (1 vaso cada 15 minutos).

Horario de la primera dosis según la hora de cita:

- Si su cita es entre las 08:00 y las 12:00 horas o está ingresado:
 - O Día anterior a la exploración a las 18 horas (6 de la tarde).
- Si su cita es entre las 12:05 y 17:00 horas:
 - O Día anterior a la exploración a las 22 horas (10 de la noche).
- Si su cita es entre las 17:05 y 22:00 horas:
 - o El mismo día de la exploración a las 06 horas (6 de la mañana).

SEGUNDA DOSIS (2^a dosis):

- El día de la exploración, **5 horas antes de la hora de cita,** tomará el segundo sobre de Citrafleet diluido en 150 ml de agua fría.
- Esperará 15 minutos.
- A continuación, beberá 2 litros adicionales de líquidos claros (1 vaso cada 15 minutos).
- Recuerde, 2 horas antes de la exploración no podrá tomar nada, ni agua.

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE CITRAFLEET (sobres)

Tomará las dosis de CITRAFLEET según se indica en CÓMO TOMAR EL EVACUANTE



Diluir un sobre en un vaso de 150 ml de **agua FRÍA** y nos lo beberemos





Durante las siguientes 2 horas:

Beberá 2 litros adicionales de líquidos claros a razón de 1 vaso cada 15 minutos: agua, caldo filtrado, infusiones, té y bebidas sin burbujas (sin gas) con o sin azúcar

RECUERDE, 2 HORAS ANTES DE LA EXPLORACIÓN NO PODRÁ TOMAR NADA (NI AGUA)