

UNIDAD DE EXPLORACIONES DE APARATO DIGESTIVO PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA

PRE-PROCEDIMIENTO

- Confirmar identidad del paciente.
- Consentimiento informado firmado.
- Avisar si alergias medicamentosas.
- Antiagregantes y anticoagulantes retirados con tiempo suficiente.
- Precisa vía endovenosa.
- Rasurar hemiabdomen superior.
- Antibioterapia profiláctica: una hora antes de la técnica administrar 1g intravenoso de Ceftriaxona (asegurarse de que no existe alergias a cefalosporinas)
- Extraer la tarde antes (si no la tuviera) analítica por vía urgente que incluya:
 - Hematimetría.
 - Estudio de coagulación.
- Ayunas 8 horas.
- Retirar prótesis dentaria, si la tiene.

INTRA-PROCEDIMIENTO

- Sedación: Se instaurará en la Unidad de Exploraciones en función de las características del paciente.

POST-PROCEDIMIENTO

- Ayunas.
- Reposo en cama.
- Sueroterapia.
- Analgesia condicional.
- A las 18 horas comenzar perfusión de suero fisiológico por sonda de gastrostomía 500 ml / en 6 horas.
- Si se tolera continuar con nutrición enteral estándar a 32 ml/hora.
- Lavar sonda gastrostomía con 100 ml de agua cada 8 horas y tras utilizarla con medicación.
- Glucocetonurias cada 8 horas. Si positiva hacer glucemia capilar.
- Desinfección de gastrostomía diaria con Povidona Yodada.
- Girar diariamente la sonda.