

UNIDAD DE EXPLORACIONES DE APARATO DIGESTIVO PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

VIDEOCÁPSULA ENDOSCÓPICA

Si es portador de un marcapasos, desfibrilador automático implantado u otros dispositivos electrónicos implantados la exploración con videocápsula endoscópica no se debe realizar.

- Si toma medicación con hierro deberá suspenderla 4 días antes de la exploración.
- No tome antiácidos (Almax ...) ni sucralfato (Urbal ...) desde el día anterior.
- Lea atentamente y firme el consentimiento informado.
- La exploración se inicia por la mañana y el grabador se retira por la tarde (8-12 horas después) en el misma Unidad de Exploraciones donde se le colocó.
- Traiga la medicación que debiera tomar la mañana de la exploración.
- Acuda con ropa ligera, preferiblemente de dos piezas, que permita colocar el cinturón de antena y conectar los cables a la unidad de grabación que se fija en la cintura.
- Podrá llevar una prenda fina de material natural entre el cuerpo y el cinturón de antena.
- No olvide facilitar su número de teléfono móvil el día de la exploración.

EL DÍA ANTERIOR A LA EXPLORACIÓN

- Precisa ayuno de 8 horas. Realice una cena ligera (caldo claro, pasta o jamón cocido) a las 20:00 h (8 de la tarde).
- Debe tomar una solución purgante. Si no dispone de ella la puede solicitar en la Unidad de Exploraciones.
- La preparación intestinal con una solución evacuante (solución Bohm) debe empezar a tomarla a las 22:00h (10 de la noche), con 2 litros de solución en 2 horas, diluyendo 8 sobres en 2 litros de agua, y tomarla a razón de un vaso cada 15 minutos.

EL DÍA DE LA EXPLORACIÓN

- A las ____:____ usted ha ingerido la cápsula.
- A las ____:____ horas puede tomar algún líquido claro (ej. agua, infusiones). Aproveche para tomar, si tuviera, la medicación correspondiente de la mañana. (2 horas después de ingerir la cápsula).
- A partir de las ____:____ horas puede tomar un aperitivo ligero (jamón cocido, tortilla francesa, caldo claro...). (4 horas después de ingerir la cápsula)
- A las ____:____ horas debe regresar al hospital.
- Consulte si nota dolor abdominal, náuseas durante la exploración.
- No se exponga a interferencias de radio como teléfono móvil, mandos a distancia, auriculares inalámbricos, transmisiones de radioaficionados.
- No coloque ningún metal (ej. hebilla de cinturón) cerca de la antena.
- Mientras permanezca la videocápsula endoscópica en el interior del cuerpo manténgase alejado de equipos o instalaciones para los que esté prohibido acercarse con objetos metálicos, como resonancia magnética. La cápsula contiene partes metálicas y pueden producirse heridas en órganos internos.
- Pulse OK en la grabadora para detener el “bip” y la vibración cuando se reciba un mensaje de la grabadora. Actúe tal y como le indicó el médico.
- Una vez finalizada la exploración debe comprobar que expulsa la cápsula a los pocos días de ingerirla. Si no la expulsara en dos semanas consulte con la Unidad de Exploraciones donde se realizó la exploración.