

UNIDAD DE EXPLORACIONES DE APARATO DIGESTIVO PROCEDIMIENTO ALERGIA AL LÁTEX

Seguir las recomendaciones para la prevención y tratamiento de la alergia al látex del SAS. Se resumen en los siguientes puntos:

- **Servicio de Mantenimiento:** se conectará el sistema de aire acondicionado la tarde anterior a la exploración. Avisado mediante circulación interna. No volverlo a desconectar hasta finalizada la exploración. Si el sistema está permanentemente conectado no será necesaria esta comunicación.
- **Servicio de Limpieza:** se limpiará la sala de la exploración la tarde anterior. Avisado mediante circulación interna. El personal de limpieza usará guantes de plástico transparente o desechable de vinilo o neopreno. Se forrarán con paños los palos de instrumentos de limpieza que tengan el mango de goma. No se introducirá en la sala ningún elemento que contenga látex.
- **Auxiliares de Enfermería de Endoscopia:** La tarde anterior a la exploración se procederá a forrar y proteger todo aquello que contenga látex, (camilla, cables eléctricos y de monitores, taburetes, etc.), así mismo se retirarán de la sala las sillas que no vayan a utilizarse en la exploración, teniendo en la sala sólo lo necesario para la exploración. Se utilizará para forrar vendaje circular de algodón de diferentes tamaños, cinta aislante y paños o sábanas de algodón. El enfermero de la tarde será el responsable de supervisar que todo esté correctamente dispuesto. Una vez realizada la limpieza y comprobado que todo está dispuesto se procederá a cerrar y sellar las puertas de la sala de exploraciones para evitar la entrada de partículas de látex.
- **Actuación del equipo:** Se programará como primera exploración de la mañana. El médico que va a realizar la exploración y el enfermero/a de la sala comprobarán que todo está dispuesto y correcto, antes de pasar al paciente. Igualmente el anestesista deberá revisar el material que va a necesitar. Asistirá el mínimo personal posible. Una vez dentro el paciente, se cerrará la sala y no podrá entrar nadie a la sala hasta finalizar la exploración, para así evitar corrientes de aire y la posible entrada de partículas de látex. Todo el material y aparataje deberá estar dispuesto en la sala de exploración. Tener la máxima precaución con el paciente. Proteger el brazo del paciente con venda de algodón el brazo donde se le vaya a tomar la tensión arterial, y una vez tomada, el enfermero deberá cambiarse de guantes si el esfigmomanómetro es manual y tomará la precaución de retirar el tapón de caucho del vial de la medicación en caso de tener que utilizarlo.
- **Medicación:** Maleato de dexclufeniramina, ranitidina, metilprednisolona.
 - 72 horas antes:
 - Polaramine retard 6 mg. C/12 horas
 - Prednisona 0.5 mg. /Kg. de peso C/ 24 horas
 - Mismo día del procedimiento. 1 hora antes del procedimiento.
 - Polaramine amp.
 - Ranitidina amp.
 - Metilprednisolona 1 mg./Kg. (dosis única)