

## **UNIDAD DE EXPLORACIONES DE APARATO DIGESTIVO PROCECIMIENTO DE TRANSFUSIÓN PLASMA / PLAQUETAS PREVIO A EXPLORACIÓN DIGESTIVA**

En aquellas exploraciones programadas para terapéutica y que tengan definido en el protocolo de actuación la realización de una hematimetría y estudio de coagulación previo se revisaran los límites de la coagulación el número de plaquetas y se actuará según se detalla.

- **Límites de la coagulación y plaquetas en procedimiento terapéutico**

- Plaquetas más de 60.000.
- Actividad de protrombina mayor o igual a 60 % (INR < 1,5)

- **Límites de la coagulación y plaquetas en procedimiento diagnóstico**

- Plaquetas más de 20.000.
- Actividad de protrombina mayor o igual a 20 % (INR 1,5 –2,5)

- **Pautas**

- Si las plaquetas están bajas:
  - Se transfundirán a razón de 1 Ud / 10 Kg de peso en el periodo inmediato anterior al procedimiento y durante el mismo.
- Si la actividad de protrombina está baja:
  - Se transfundirá Plasma fresco, 3-6 Uds. dependiendo de la importancia de la alteración, en el periodo inmediato anterior al procedimiento.
  - Si la alteración de coagulación es Vitamina K dependiente
    - Administrar dos ampollas de Vitamina K I.V. 6-8 horas antes del procedimiento.
    - Pautar Vitamina K I.V. cada 24 horas

**En caso de duda consultar con Hematólogo.**