

UNIDAD DE EXPLORACIONES DE APARATO DIGESTIVO PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE LA ACALASIA CON TOXINA BOTULÍNICA

MATERIAL NECESARIO

- Jeringa 10 ml.
- Suero fisiológico,
- Toxina botulínica (BoTox) vial de 100U.

Pasos para su retirada de farmacia hospitalaria de la toxina botulínica:

- Primer tratamiento del paciente:
 - Solicitud de utilización de medicamentos en condiciones distintas a las autorizadas en ficha técnica.
 - Se encuentra en la Intranet en:
 - Comisión de farmacia y terapéutica
 - Medicamentos fuera de indicación
 - Anexo 2: solicitud de uso.
 - Receta blanca con datos del paciente y medicación solicitada.
- Tratamientos sucesivos:
 - Receta blanca con datos del paciente y medicación solicitada.

PROCEDIMIENTO

Diluir vial de 100 U de BoTox en 10 ml. de suero fisiológico.

Cargar el vial anterior en jeringa de 10 ml.

Purgar la aguja de inyección con 1 ml.

Inyectar 1 ml. en cada punto.

Distribuir punciones en los cuatro cuadrantes hasta un total de 8 ml. (80 U de BoTox. 8 punciones).

Queda de reserva 1 ml. por si en alguna de las punciones el líquido no ha penetrado bien.

Guardar la aguja del inyector antes de proceder a la retirada del mismo.