

UNIDAD DE EXPLORACIONES DE APARATO DIGESTIVO PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

TATUADO DE LESIONES CON TINTA CHINA

MATERIAL NECESARIO

- Jeringa 10 ml.
- Suero fisiológico.
- Jeringa precargada con tinta china
- Inyector endoscópico.

PROCEDIMIENTO

Cargar jeringa de 10 ml. con 10 ml. de suero fisiológico.

Purgar la aguja de inyección con 1 ml.

Localizar la zona a tatuar: borde distal de la lesión y a 1-2 cm. de la misma.

Inyectar en la submucosa hasta realizar un habón.

Realizar la punción de forma oblicua

Mientras se inyecta retirar suavemente hasta apreciar la elevación de la mucosa

No retirar la aguja y mantener el punto de punción.

Sustituir la jeringa de suero por la jeringa precargada con tinta china.

Continuar con la inyección hasta confirmar tatuado.

Suele ser suficiente con 1-3 ml.

Purgar el inyector con suero fisiológico si fuera necesario.

Guardar la aguja del inyector antes de proceder a la retirada del mismo.

Repetir este procedimiento en 2-4 cuadrantes ya que a veces la inyección es en el borde mesentérico o retroperitoneal y es difícil la localización intraoperatoria.