



**Nombre**

**Fecha**

**Unidad/Centro**

**Nº Historia**

### **CLASIFICACIÓN DE ÚLCERAS VASCULARES –WAGNER-**

**Población diana:** Población diabética. Se trata de una escala **heteroadministrada** que valora y clasifica las lesiones de los pies en personas diabéticas. A mayor grado, mayor gravedad de la lesión.

#### **Clasificación de Wagner para úlceras vasculares**

| <b>GRADO</b> | <b>LESIÓN</b>                  | <b>CARACTERÍSTICAS</b>   |
|--------------|--------------------------------|--|
| 0            | Pie de riesgo                  | Callos gruesos, cabezas metatarsianas prominentes, dedos en garra, deformidades óseas. |
| I            | Úlceras superficiales          | Destrucción total del espesor de la piel   |
| II           | Úlceras profundas              | Penetra en la piel, grasa, ligamentos, pero sin afectar hueso, infectada               |
| III          | Úlceras profundas más absceso. | Extensa, profunda, secreción y mal olor  |
| IV           | Gangrena limitada              | Necrosis de parte del pie  |
| V            | Gangrena extensa               | Todo el pie afectado, efectos sistémicos   |

#### **Bibliografía**

- Wagner FW. The dysvascular foot, a system for diagnostics and treatment. Foot Ankle 1981; 2: 64-122.
- Grupo de trabajo sobre úlceras vasculares de la Asociación Española de Enfermería Vascular. Consenso sobre úlceras vasculares y pie diabético de la Asociación Española de Enfermería Vascular. 2004. Disponible en [www.minsa.gob.ni/enfermeria/doc\\_inter/Consensoulceras2004.pdf](http://www.minsa.gob.ni/enfermeria/doc_inter/Consensoulceras2004.pdf) . Consultado el 20 de Junio de 2006.