


CONSERVACIÓN, PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS COVID-19

COMIRNATY® (PFIZER-BIONTECH)




Vía I.M en deltoides
Dosis 0,3 ml
Edad > 16 años

-60° / -90°	6 meses
2°/8°	5 días
Tª ambiente <30°	5 días
Tras disolución	6 horas

Grupos 1,2, 4 y 5

VACCINE MODERNA




Vía I.M en deltoides
Dosis 0,5 ml
Edad > 18 años

-25° / -15°	7 meses
2°/8°	30 días
Tª ambiente <25°	12 horas
Vial perforado <25°	6 horas

Grupos 2 y 6

ASTRAZENECA



Vía I.M en deltoides
Dosis 0,5 ml
Edad 18 a 55 años (inclusive)

Sin perforar el vial 2°/8°	6 meses
Vial perforado 2°/8°	48 horas
Tª ambiente <30°	6 horas

Grupo 3

GRUPOS DE POBLACIÓN APROBADOS PARA VACUNACIÓN COVID-19 HASTA AHORA

Grupo 1. Personas institucionalizadas y profesionales de residencias de mayores y centros de día.

Grupo 2. Profesionales sanitarios y sociosanitarios de 1ª línea de COVID-19.

Grupo 3. Otros profesionales sanitarios.

Grupo 4. Personas con gran dependencia (grado III) no institucionalizados en residencias y sus cuidadores profesionales.

Grupo 5. Personas a partir de 80 años de edad.

Grupo 6. Trabajadores con función social esencial (fuerzas y cuerpos de seguridad, fuerzas armadas, policía, guardia civil, bomberos, etc; educación infantil, primaria y secundaria).