

INDICACIONES		OBSERVACIONES
S	ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	
S01	OFTALMOLÓGICOS	
S01AA	ANTIBIÓTICOS	
S01AA11	GENTAMICINA	
OFTÁLMICA		
Blefaritis, conjuntivitis, dacriocistitis, queratitis, úlcera corneal.		La pomada puede utilizarse como sustituto del colirio durante la noche. No utilizar lentes de contacto durante el tratamiento.
S01AA17	ERITROMICINA	
OFTÁLMICA		
Profilaxis de oftalmia neonatal y conjuntivitis bacteriana.		
S01AD	ANTIVIRALES	
S01AD03	ACICLOVIR	
OFTÁLMICA		
Queratitis herpética.		
S01AX	OTROS ANTIINFECCIOSOS	
S01AX13	CIPROFLOXACINO	
OFTÁLMICA		
Úlceras y absesos corneales e infecciones superficiales del ojo y partes adyacentes: Blefaritis, conjuntivitis, queratitis bacteriana.		El uso prolongado de ciprofloxacino puede originar una sobreinfección en el ojo por microorganismos no susceptibles (hongos).
S01BA	CORTICOSTEROIDES, MONOFÁRMACOS	
S01BA01	DEXAMETASONA	
OFTÁLMICA		
Procesos inflamatorios de causa no infecciosa que afecten a la conjuntiva, epiesclera y/o segmento anterior del ojo.		No debe utilizarse más de 1 semana sin estricta supervisión. Contraindicado en queratitis asociada a herpes simple.
S01BC	AGENTES ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS	
S01BC03	DICLOFENACO	
OFTÁLMICA		
Tratamiento de la inflamación postoperatoria tras intervención de cataratas e inhibición de miosis pre y postoperatoria. Conjuntivitis crónicas no infecciosas.		No utilizar lentes de contacto durante el tratamiento.

INDICACIONES

OBSERVACIONES

S01CA CORTICOSTEROIDES Y ANTIINFECCIOSOS EN COMBINACIÓN

S01CA01 DEXAMETASONA Y ANTIINFECCIOSOS

OFTÁLMICA

Queratitis marginal por toxina estafilocócica, conjuntivitis alérgica y bacteriana crónica o postoperatoria.

No utilizar en infecciones de origen desconocido.

S01EB PARASIMPATICOMIMÉTICOS

S01EB09 ACETILCOLINA

OFTÁLMICA

Obtención de miosis rápida y completa después de la extracción del cristalino en la cirugía de catarata, queratoplastia penetrante, iridectomia y otras intervenciones del segmento anterior. Se utiliza únicamente para irrigación intraocular en la cirugía del segmento anterior del ojo.

El efecto se mantiene durante 10-20 minutos. Si se necesita una miosis más prolongada puede repetirse la aplicación, o utilizar tópicamente una solución de pilocarpina (2%) después de la cirugía y antes de la aplicación del vendaje.

S01EC INHIBIDORES DE LA ANHIDRASA CARBÓNICA

S01EC01 ACETAZOLAMIDA

ORAL

Glaucoma de ángulo abierto, cerrado y secundario.

No se recomienda en tratamiento a largo plazo del glaucoma crónico de ángulo estrecho (el descenso de presión intraocular podría enmascarar un posible empeoramiento del glaucoma por estrechamiento del ángulo). El tratamiento a largo plazo puede originar un cuadro de acidosis; por ello, se empleará con precaución en pacientes con obstrucción pulmonar o enfisema.

S01ED AGENTES BETABLOQUEANTES

S01ED01 TIMOLOL

OFTÁLMICA

Glaucoma crónico de ángulo abierto.

Contraindicado en pacientes con: Shock cardiogénico, Insuficiencia cardíaca manifiesta, Bloqueo A-V de segundo y tercer grado, Bradicardia sinusal, Alteraciones circulatorias periféricas graves (Enfermedad de Raynaud).

S01ED02 BETAXOLOL

OFTÁLMICA

Glaucoma crónico de ángulo abierto, en pacientes con cardiopatía o enfermedad pulmonar.

Menor acción sistémica que timolol. Está contraindicada en pacientes con bradicardia sinusal, bloqueo auriculoventricular mayor de 2º o 3er grado, shock cardiogénico o enfermos con insuficiencia cardíaca manifiesta o grave. No se ha establecido la seguridad y eficacia en niños.

S01FA ANTICOLINÉRGICOS

S01FA01 ATROPINA

OFTÁLMICA

Refracción ocular: examen y determinación de los defectos de refracción ocular. Uveitis, iritis, iridociclitis, úlcera corneal, úlceras supuradas del hipopión y espasmos de acomodación. Midriasis postquirúrgica: en el postoperatorio de extracción extra o intracapsular del cristalino en los casos en que se busque un efecto antimuscarínico.

No conducir mientras duren los efectos.

INDICACIONES

OBSERVACIONES

S01FA04 CICLOPENTOLATO

OFTÁLMICA

Refracción ocular: examen y determinación de los defectos de refracción ocular. Uveitis, iritis, iridociclitis, úlcera corneal, úlceras supuradas del hipopión y espasmos de acomodación. Midriasis postquirúrgica: en el postoperatorio de extracción extra o intracapsular del cristalino en los casos en que se busque un efecto antimuscarínico.

No conducir mientras duren los efectos. Contraindicado en glaucoma o personas con ángulo estrecho.

S01FA06 TROPICAMIDA

OFTÁLMICA

Examen de fondo de ojo. Examen de refracción.

Contraindicado en glaucoma de ángulo estrecho. No se dispone de información suficiente sobre la seguridad de su empleo en mujeres embarazadas por lo que no se recomienda su utilización salvo que sea considerada esencial por el médico.

S01FB SIMPATICOMIMÉTICOS, EXCLUYENDO PREPARADOS CONTRA EL GLAUCOMA

S01FB01 FENILEFRINA

OFTÁLMICA

Examen de fondo de ojo produciendo midriasis sin afectar a la acomodación. Cataratas nucleares; Iritis; Iridociclitis.

Ejerce una acción reductora de la presión intraocular que es utilizada en el tratamiento de algunos casos especiales de glaucoma de ángulo abierto. Contraindicado glaucoma de ángulo estrecho. Se utilizará con extrema precaución en niños pequeños, en pacientes con hipertensión severa y en estados de arteriosclerosis avanzada.

S01HA ANESTÉSICOS LOCALES

S01HA30 COMBINACIONES

OFTÁLMICA

Dolor ocular. Extracción de cuerpos extraños. Cirugía menor del ojo.

S01JA AGENTES COLORANTES

S01JA01 FLUORESCEINA

OFTÁLMICA

Diagnóstico de irregularidades en la superficie corneal y cambios del grosor del epitelio, detección de cuerpos extraños.

PARENTERAL

Medio de diagnóstico en angiografía oftálmica, incluido el examen del fondo. Evaluación de la vascularidad del iris. Distinción entre tejidos viables y no viables. Observación del flujo acuoso. Diagnóstico diferencial de tumores malignos y no malignos.

Debe realizarse prueba de sensibilización intradérmica. Durante la administración, se debe disponer de equipo de reanimación con adrenalina 1:1.000 para vía IV o IM, un antihistamínico y oxígeno terapia. Tras su administración deben usarse gafas oscuras para protegerse de la luz.

S01JA51 FLUORESCEINA, COMBINACIONES CON

OFTÁLMICA

Exploraciones oculares que requieran anestesia corneal de corta duración: tonometría, gonioscopia, electrorretinografía.

S01LA AGENTES ANTINEOVASCULARIZACIÓN

INDICACIONES	OBSERVACIONES
--------------	---------------

S01LA05 AFLIBERCEPT

PARENTERAL Tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) neovascular (exudativa) en pacientes adultos. RECOMENDACIÓN USO SAS <i>Aflibercept, ranibizumab y bevacizumab son alternativas terapéuticas equivalentes en DMAE.</i>
--

S01XA OTROS OFTALMOLÓGICOS

S01XA03 CLORURO DE SODIO, HIPERTONICO

OFTÁLMICA Edema corneal de diversa etiología: Queratitis vesicular, postoperatorio de cataratas, distrofia hereditaria.

S01XA20 LÁGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREPARADOS INERTES

OFTÁLMICA Síndrome del ojo seco.	No instilar junto con otros medicamentos tópicos oftálmicos. Evitar si aparece visión borrosa.
--	--

S01XA96 VASELINA OFTALMICA

OFTÁLMICA Síndrome del ojo seco.
--

S02 OTOLÓGICOS

S02AA ANTIINFECCIOSOS

S02AA15 CIPROFLOXACINO

ÓTICA Otitis externa.

S03 PREPARADOS OFTALMOLÓGICOS Y OTOLÓGICOS

S03AA ANTIINFECCIOSOS

S03AA30 COMBINACIONES

OFTÁLMICA Ó Tratamiento de procesos infecciosos e inflamatorios del segmento anterior del ojo.Afecciones del conducto auditivo externo.

INDICACIONES

OBSERVACIONES