

TABLA I. TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES MÁS FRECUENTES PRODUCIDAS POR HELMINTOS

		TRATAMIENTOS DE ELECCIÓN	TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS
C E S T O D O S	Echinococcus granulosus (Quiste hidatídico)	No operable: Drenaje percutáneo + 3 ciclos de 28d de albendazol (14d de descanso entre ciclos). > 60 Kg: 400 mg 2 veces al d x 28d; < 60 Kg: 15 mg /Kg/d en 2 dosis x 28d (máx: 800 mg /d). Administrar con las comidas.	
	Hymenolepis nana (Tenia enana)	Praziquantel 25 mg /Kg en dosis única, adultos y niños.	Niclosamida. Adultos 2 g en dosis única. Niños 11-34 Kg: 1 g en dosis única. Niños > 34 Kg: 1,5 g en dosis única.
	Teniasis extra-SNC (Tenia cerdo, vaca, perro y pescado)	Praziquantel 10 mg /Kg en dosis única, para adultos y niños.	Niclosamida. Adultos 2 g en dosis única. Niños 11-34 Kg: 1 g en dosis única. Niños > 34 Kg: 1,5 g en dosis única.
	Neuro cysticercosis Afectación SNC por T. solium	Praziquantel 50 mg/Kg/d en 3 dosis x 15d.	Albendazol + dexametasona. Dosis albendazol: >60 Kg: 400 mg 2 veces al d x 28d; < 60 Kg: 15 mg/Kg/d en 2 tomas al d x 28d (Máx: 800 mg /d)
I N T E S T I N A L E S	Ascaris lumbricoides (ascariasis)	Mebendazol 100 mg /8h x 3d. Si obstrucción Gastrointestinal, usar piperacina.	Albendazol 400 mg en dosis única; o pirantel 11 mg / Kg en dosis única (máx: 1 g)
	Enterobius vermicularis	Mebendazol 100 mg en dosis única, repetida a las 2sem.	Albendazol 400 mg en dosis única, repetida a las 2 sem; o pirantel dosis única 11 mg /Kg (Máx: 1g) x 3 ciclos (cada 2sem).
	Strongyloides stercoralis	Albendazol 400 mg /6 h x 3d.	Tiabendazol 25 mg/kg/12h x 2-10d (máx: 3 g /d).
	Trichuris Trichiuria	Mebendazol 100 mg /8h x 3d.	Albendazol 400 mg en dosis única.
E X T R A I N T E S T I N A L	Wuchereria bancrofti Filiariasis linfática	Ivermectina 100-440 µg / Kg en dosis única con o sin albendazol 400 mg en dosis única.	Dietilcarbamazina 21 días: días 1-2: 50 mg /8h; día 3: 100 mg /8h; días 4-21: 2 mg/Kg/8h.
	Loa-Loa Filiariasis cutánea	Dietilcarbamazina 21 días: días 1-2: 50 mg /8h; día 3: 100 mg /8h; días 4-21: 2 mg/Kg/8h.	
	Onchocerca volvulus Oncocercosis	Ivermectina: 150 µg /Kg dosis única, cada 6 meses hasta supresión de microfiliarias dérmicas y oculares. Si afectación ocular administrar prednisona 1 mg/kg/d algunos días antes del inicio de la pauta con ivermectina.	
	Trichinella spiralis Triquinosis	Mebendazol 5 mg/kg/12h x 10-13d + prednisona vo 40-60 mg /6h.	Albendazol 400 mg /12h x 1d + prednisona vo 40-60 mg /6h.
	Toxocara Larva migrans visceral	Dietilcarbamazina 2 mg/kg/8h x 3d.	Mebendazol 100-200 mg /12h x 5d; o albendazol 400 mg /12h x 5d.
T R E M A	Fasciola Hepática Fascioliasis	Bithionol 30-40 mg/kg/6h x 10-15 dosis. (Dosis máx: 2 g /d).	
	Schistosoma spp.	Praziquantel 20 mg / kg x 2-3 dosis. Pauta válida para adultos y niños.	

(Adaptado de: Sanford Guide to Antimicrobial Therapy, Ed 30, 2000).