

## **PROTOCOLO DE USO ETANERCEPT EN PSORIASIS**

---

Etanercept está indicado en el tratamiento de adultos con psoriasis en placa de moderada a grave que no han respondido o que tienen contraindicada, o no toleran otra terapia sistémica, incluyendo ciclosporina, metotrexato o PUVA.

En línea con las recomendaciones del NICE, se utilizarán dosis no superiores a 25 mg dos veces a la semana. Tras evaluación a las 12 semanas, se retirará el tratamiento si la respuesta no es suficiente (PASI 75 o PASI 50 con aumento de 5 puntos en la escala DLQI en 12 semanas).

De acuerdo a los resultados de los ensayos clínicos y el informe de evaluación de la EMEA, las condiciones de uso de Etanercept serían:

1. Etanercept se utilizará en pacientes tras fracaso a los tratamientos con Ciclosporina, Metotrexato, Retinoides orales y Fototerapia (deben haberse empleado todos).
2. La puntuación PASI para iniciar tratamiento debe ser como mínimo de 10.
3. La dosis recomendada es 25mg 2 veces por semana (o 50 mg/semana).
4. A las 12 semanas, si no hay respuesta (reducción de PASI en un 50%) se debe suspender el tratamiento.
5. Si a las 12 semanas se alcanza un PASI 75, no sería necesario continuar el tratamiento.
6. Si a las 12 semanas, PASI >50 pero <75, el paciente continuaría 12 semanas más de tratamiento.
7. El tiempo máximo a utilizar de forma ininterrumpida serán 24 semanas.
8. Si un paciente presenta recaída en el tiempo, habiendo sido respondedor a Etanercept, puede reiniciarse el tratamiento con el mismo esquema.