

ANEXO I. VACUNACIÓN SISTEMÁTICA. INMUNIZACIONES RECOMENDADAS A TODOS LOS PROFESIONALES DE CENTROS ASISTENCIALES

ENFERMEDAD	GRUPO DIANA	INDICACIONES	ESTUDIO SEROLÓGICO	PAUTA VACUNACIÓN / CONSIDERACIONES
Tétanos - difteria (Td)	Todos los profesionales	- No vacunados o con menos de 5 dosis frente a Td. > 65 años. - Profilaxis en herida.	No	Pautas: No vacunados: 1ª dosis con Td tan pronto como sea posible, 2ª dosis al menos 4 semanas tras la primera, 3ª dosis se administrará a los 6 meses o al año de la segunda. Posteriormente se administrarán 2 dosis de recuerdo con un intervalo de entre 1 y 10 años entre dosis hasta completar un total de 5 dosis. Vacunación incompleta: Completar pauta, NO reiniciar. Mayores de 65 años: Dosis de recuerdo. Profilaxis en herida: actuar conforme a recomendaciones.
Triple vírica (TV) (Sarampión* rubeola y parotiditis)	Todos los profesionales.	- No vacunación completa. - No evidencia de inmunidad por serología. - No evidencia de haber padecido enfermedad - PPE al sarampión en susceptibles.	En situaciones de posexposición	Pauta: 2 dosis (separadas entre sí, al menos 4 semanas). Profilaxis posexposición al sarampión en susceptibles: antes de 72 horas. Inmunoglobulina inespecífica hasta 6 días del contacto. En mujeres, evitar el embarazo, al menos, en el mes siguiente a la administración. Vacunación contraindicada en caso de embarazo.
Varicela	Todos los profesionales	- No vacunación completa. - No evidencia de inmunidad por serología. - No evidencia de haber padecido enfermedad - PPE a la varicela en susceptibles.	Si sospecha de susceptibilidad** En situaciones de posexposición	Pauta: 2 dosis separadas entre sí, al menos, 4 semanas Profilaxis posexposición a la varicela en susceptibles: antes de 3 días (máximo 5 días). En mujeres, evitar el embarazo, al menos, en el mes siguiente a la administración. Vacunación contraindicada en caso de embarazo. En caso de producirse un exantema postvacunación, deberá separarse al profesional de los servicios donde existan pacientes inmunodeprimidos, neonatos, lactantes, embarazadas, quemados y otras unidades con pacientes de elevado riesgo por un periodo entre 5-7 días.
Gripe	Todos los profesionales		No	Pauta: 1 dosis anual
SARS-CoV-2	Todos los profesionales	Según instrucciones de la Consejería de Salud y Consumo	No	Según ficha técnica e instrucciones de la Consejería de Salud y Consumo
Neumococo con VNC20	Cohorte de profesionales a partir de 60 años según instrucciones de Consejería de Salud y Consumo	Según instrucciones de la Consejería de Salud y Consumo	No	Pauta: 1 dosis única

* Se recomienda la vacunación en personas sin historia documentada de vacunación nacidos en España a partir de 1970. Se administrará 2 dosis de vacuna triple vírica con un intervalo de 4 semanas entre dosis. En caso de haber recibido 1 dosis con anterioridad, se administrará sólo 1 dosis de vacuna. La recepción previa de 2 dosis de vacuna es sinónimo de inmunidad.

** Cuando no se refieren antecedentes de padecimiento de varicela y/o herpes zóster o sean inciertos, se realizará serología de varicela a menos que hayan recibido 2 dosis de vacuna y/o tuvieran una serología positiva. En el caso de haber recibido previamente una sola dosis, recibirán una segunda sin necesidad de serología previa.