

INMUNIZACIONES RECOMENDADAS POR RIESGO LABORAL A LOS PROFESIONALES DE CENTROS ASISTENCIALES				
ENFERMEDAD	GRUPO DIANA	INDICACIONES	ESTUDIO SEROLÓGICO	PAUTA VACUNACIÓN / CONSIDERACIONES
Hepatitis B	Profesionales sanitarios y otros profesionales con riesgo de exposición a sangre o fluidos potencialmente infecciosos	<ul style="list-style-type: none"> No vacunados. Vacunación incompleta. Desconocimiento de respuesta tras vacunación. Profilaxis posexposición. 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar marcadores serológicos (anti-HBc, anti-HBs, AgHBs) antes de vacunar. Marcadores postvacunales antiHBs 1-2 meses tras la última dosis de la pauta vacunal. 	<p>Pauta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pauta completa: 3 dosis (0, 1 y 6 meses). Si pauta incompleta: completar pauta. Si desconocimiento respuesta: 1 dosis + serología. <p>Marcadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hacer serología 1-2 meses tras administración. Identificar no respondedores. <p>Profilaxis postexposición:</p> <ul style="list-style-type: none"> Según estado de vacunación y respuesta previa de la misma
Hepatitis A (HA)	<ul style="list-style-type: none"> Profesionales de laboratorio expuestos a Hepatitis A. Profesionales en contacto con aguas residuales (personal de mantenimiento, etc.) Manipuladores de alimentos susceptibles expuestos a una fuente común del caso índice (personal de cocina, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> No vacunados. Vacunación incompleta. Profilaxis posexposición 	Cribado prevacunal: Si indicado y nacidos antes de 1977	<p>Pauta: 2 dosis (0 y 6 meses).</p> <p>Profilaxis posexposición en susceptibles: Puede llevarse a cabo con vacunas o con inmunoglobulinas:</p> <ul style="list-style-type: none"> En la primera semana tras la exposición se aconseja administración de vacunas. En caso de que haya pasado más de una semana tras la exposición: se administrará la primera dosis de vacuna junto a inmunoglobulina (dosis única de Ig es de 0,02 ml/kg). En mayores de 50 años se realizará administración concomitante de la vacuna HA y de la Ig, especialmente en inmunodeprimidos y hepatópatas crónicos.
Tosferina (Tdpa)	<ul style="list-style-type: none"> Profesionales de áreas de Obstetricia y Pediatría y sus áreas de urgencias. Embarazadas. 	<ul style="list-style-type: none"> No vacunados con Tdpa. Embarazadas: vacunación en cada embarazo. Profilaxis posexposición. 	No	<p>Pauta:</p> <ul style="list-style-type: none"> No vacunados con Tdpa: Dosis única de Tdpa. Si no hubieran recibido ninguna dosis con anterioridad de Td, se iniciará primovacuna con una dosis de dTpa seguida de dos dosis de Td al mes y a los 6 meses. Embarazadas: una dosis de vacuna Tdpa en cada embarazo, independientemente del estado de vacunación previo, a partir de la semana 27 de gestación, preferentemente en la semana 27 o 28. <p>Profilaxis postexposición: profesionales sanitarios que hayan tenido contacto estrecho con los casos, siempre que no hayan recibido una dosis de vacuna de tosferina en los últimos 10 años.</p>
Fiebre tifoidea	Profesionales de laboratorio con exposición de riesgo a <i>Salmonella typhi</i>	No vacunados. Desconocimiento de vacunación.	No	<p>Pauta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Intramuscular: 1 dosis (recuerdo cada 3años) Oral: 3 dosis (recuerdo cada 3 años)
EMI (MenB, MenACWY)	Personal de laboratorio (técnicos de laboratorio y microbiólogos) que trabaje con muestras que potencialmente puedan contener <i>N. meningitidis</i>	<ul style="list-style-type: none"> No vacunados. Desconocimiento de vacunación. Profilaxis posexposición en contactos no inmunizados. 	No	<p>Pauta:</p> <ul style="list-style-type: none"> MenACWY: 1 dosis. MenB: 2 dosis (con intervalo al menos de 1 mes) Dosis de recuerdo: Una dosis 1 año después de completar la pauta, y posteriormente cada 5 años. <p>Profilaxis posexposición en contactos no inmunizados: quimioprofilaxis (siempre 1ª medida) complementada con:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contactos cercanos de un caso de EMI confirmado por serogrupos A, C, W o Y que no estuvieran previamente vacunados 1 dosis MenACWY. Con serogrupo C: 1 dosis MenACWY Con serogrupo B: En caso de contacto cercano con un caso esporádico de EMI por serogrupo B no se recomienda la vacunación frente a este serogrupo como profilaxis posexposición al contacto estrecho, salvo que éste tenga indicación de vacunación frente a MenB por grupo de riesgo.
Poliomielitis	Personal de laboratorio que trabaja con poliovirus y sanitarios que atienden a pacientes excretadores de poliovirus salvajes	Solo en el caso de plantearse una situación de riesgo como: <ul style="list-style-type: none"> La aparición de atención a un caso. Trabajar en laboratorios donde manipulen muestras que puedan contener poliovirus. 	No	<p>Pauta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Primovacunados correctamente: solo requieren la administración de una dosis de refuerzo de vacuna inactivada si han transcurrido más de 10 años desde la última dosis. No vacunados: administración de 2 dosis de VPI separadas 4-8 semanas con una tercera dosis a los 6-12 meses.
Viruela del mono (Mpox)	<ul style="list-style-type: none"> Profesionales sanitarios de consultas especializadas en atención de ITS/VIH a personas con prácticas de alto riesgo. Personal de laboratorio que manejan muestras potencialmente contaminadas con virus <i>Monkeypox</i>. 	Según instrucciones de la Consejería de Salud y Consumo	No	Según ficha técnica e indicaciones de la Consejería de Salud y Consumo