



## MEDICAMENTOS FINANCIADOS CIERTAS INDICACIONES

G. ATC	Principio Activo	Especialidades	Financiación	Indicación	Normativa	Médico
A06A	LACTITOL MONOHIDRATO	OPONAF 10G/SOBRE 20 SOBRES POLVO PARA SOLUCION ORAL  OPONAF 10G/SOBRE 50 SOBRES POLVO PARA SOLUCION ORAL	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES  FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES	Encefalopatía portosistémica y paraplejía.		
	LACTULOSA	DUPHALAC 10G SOLUCION ORAL EN SOBRE 10 STICKS  DUPHALAC 10G SOLUCION ORAL EN SOBRE 50 STICKS  DUPHALAC 667MG/ML SOLUCION ORAL 1 BOTELLA DE 200ML  DUPHALAC 667MG/ML SOLUCION ORAL 1 BOTELLA DE 800ML  LACTULOSA LAINCO 10G 10 SOBRES SOLUCION ORAL EFG  LACTULOSA LAINCO 3,33G/5ML SOLUCION ORAL 1 BOTELLA DE 800ML EFG  LACTULOSA LAINCO 3,33G/5ML 1 BOTELLA DE 200 ML SOLUCION ORAL EFG	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES  FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES  FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES  FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES  FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES  FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES	Encefalopatía portosistémica y paraplejía.		
	METILNALTREXONA BROMURO	RELISTOR 12MG/0,6ML 1 VIAL 0,6ML SOLUCION INYECTABLE  RELISTOR 12MG/0,6ML 7 VIALES + 7 JERINGAS PRECARGADAS SOL INYECTABLE	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES  FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES	-Pacientes oncológicos.		
	NALDEMEDINA	RIZMOIC 200MCG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES	Financiación restringida a la indicación: Tratamiento del estreñimiento inducido por opioides (EIO) en pacientes adultos oncológicos con una respuesta inadecuada a los laxantes.		



## MEDICAMENTOS FINANCIADOS CIERTAS INDICACIONES

G. ATC	Principio Activo	Especialidades	Financiación	Indicación	Normativa	Médico
A06A	NALOXEGOL	MOVENTIG 12,5MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA MOVENTIG 25MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES	Tratamiento del estreñimiento inducido por opioides (EIO) en pacientes adultos oncologicos con una respuesta inadecuada a los laxantes.		
	PLANTAGO OVATA	PLANTAGO OVATA CINFA 3,5G 30 SOBR POLVO SUSPE ORAL  PLANTAGO OVATA LAINCO 3,5G 30 SOBRES POLVO PARA SUSPENSION ORAL PLANTAGO OVATA MADAUS 3,5G 30 SOBRES POLVO EFERVESCENTE  PLANTAGO OVATA NORMON 3,5G 30 SOB MONODO POL SU OR	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES	Enfermedad de crohn, colon irritable y diverticulosis.		
C04A	NAFTIDROFURILO OXALATO	PRAXILENE 100MG 50 CAPSULAS	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES	Claudicación intermitente.		
C10A	ESTERES ETILICOS DE LOS ACIDOS OMEGA 3	ACIDOS OMEGA 3 KERN PHARMA 1.000MG 100 CAPSULAS BLANDAS EFG ACIDOS OMEGA 3 KERN PHARMA 1.000MG 28 CAPSULAS BLANDAS EFG ACIDOS OMEGA 3 STRIDES 1000MG 100 CAPSULAS BLANDAS EFG  ACIDOS OMEGA 3 STRIDES 1000MG 28 CAPSULAS BLANDAS EFG  ACIDOS OMEGA 3 TEVA 1000MG 100 CAPSULAS BLANDAS (FRASCO) EFG OMACOR 1000MG 100 CAPSULAS BLANDAS  OMACOR 1000MG 28 CAPSULAS BLANDAS	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES	Pacientes con hipertrigliceridemia grave en la que los fibratos están contraindicados.		



## MEDICAMENTOS FINANCIADOS CIERTAS INDICACIONES

G. ATC	Principio Activo	Especialidades	Financiación	Indicación	Normativa	Médico
N06A	BUPROPION HIDROCLORURO	ZYNTABAC 150MG 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA ZYNTABAC 150MG 60 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES	<p>Zyntabac comprimidos, conjuntamente con un apoyo motivacional, esta indicado para ayudar a dejar de fumar en pacientes con dependencia a la nicotina. Condiciones de financiación:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Para realizar la prescripción del medicamento los pacientes deben estar incluidos en un programa de apoyo (individual y/o grupal) de deshabituación tabaquica que este implementado en la CCAA/ INGESA o Mutualidades. Además, los pacientes tienen que cumplir las siguientes características:</li><li>-Pacientes que tengan motivación expresa de dejar de fumar que se pueda constatar con un intento de dejar de fumar en el último año.</li><li>-Pacientes que fumen 10 cigarrillos o más al día y tengan además, un alto nivel de dependencia calificado por el test de Fagerström &gt; o igual 7.</li><li>- Se financiara un intento anual por paciente para dejar de fumar con apoyo farmacológico.</li><li>-La prescripción de este medicamento se restringe a los/las médicos profesionales que así se definan en el programa de deshabituación tabaquica en cada CCAA/INGESA o Mutualidad.</li><li>-Cada prescripción se realizara por un envase, lo que equivale a un mes de tratamiento, debiendose valorar la evolución de la efectividad del tratamiento con carácter previo a la emisión de la siguiente receta.</li><li>-Los pacientes deberan ser tratados durante 7-9 semanas. El tratamiento debera ser interrumpido si no se observa efecto alguno a las siete semanas.</li><li>-La dispensación de este medicamento se realizara por el sistema de receta electrónica del SNS.</li></ul>		



## MEDICAMENTOS FINANCIADOS CIERTAS INDICACIONES

G. ATC Principio Activo	Especialidades	Financiación	Indicación	Normativa	Médico	
N07B	CITISINA	RECIGARUM 1,5MG 100 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG TODACITAN 1,5MG 100 COMPRIMIDOS EFG	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES	<p>Todacitan esta indicado en adultos para el tratamiento de la dependencia tabaquica y reduccion de la ansiedad de la dependencia a la nicotina en fumadores que esten dispuestos a dejar de fumar.</p> <p>Condiciones de financiacion:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para realizar la prescripcion del medicamento los pacientes deben estar incluidos en un programa de apoyo (individual y/o grupal) de deshabituacion tabaquica que este implementado en la CCAA/ INGESA o Mutualidades.</li> <li>Ademas, los pacientes tienen que cumplir las siguientes características:</li> <li>-Pacientes que tengan motivacion expresa de dejar de fumar que se pueda constatar con un intento de dejar de fumar en el ultimo año.</li> <li>-Pacientes que fumen 10 cigarrillos o mas al día y tengan ademas, un alto nivel de dependencia calificado por el test de Fagerström &gt; o igual 7.</li> <li>- Se financiara un intento anual por paciente para dejar de fumar con apoyo farmacologico.</li> <li>-La prescripcion de este medicamento se restringe a los/las medicos profesionales que asi se definan en el programa de deshabituacion tabaquica en cada CCAA/INGESA o Mutualidad.</li> <li>-Cada prescripcion se realizara por un envase, lo que equivale a 25 dias de tratamiento.</li> <li>-El tratamiento sera como maximo hasta 25 días, tal y como esta descrito en ficha tecnica, lo que equivale a un envase.</li> <li>-La dispensacion de este medicamento se realizara por el sistema de receta electronica del SNS.</li> </ul>		
R05D						



## MEDICAMENTOS FINANCIADOS CIERTAS INDICACIONES

G. ATC	Principio Activo	Especialidades	Financiación	Indicación	Normativa	Médico
R05D	CODEINA	CODEISAN 28,7MG 10 COMPRIMIDOS	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES	Pacientes neoplásicos con tos persistente.  Por DICTAMEN FAVORABLE del "Comité técnico para la utilización de medicamentos en situaciones especiales y de los no incluidos en la financiación del SNS": Tratamiento de síndrome de intestino corto/ileostomía de alto débito, sólo o asociada con Loperamida.		
		CODEISAN 28,7MG 20 COMPRIMIDOS	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES			
		FLUDAN CODEINA 10MG/5ML 200ML SOLUCION ORAL	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES			
		HISTAVERIN 10MG/5ML JARABE FRASCO CON 250ML	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES			
		TOSEINA 2MG/ML 250ML SOLUCION ORAL	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES			
	DEXTROMETORFAN	PROPALCOF 15MG/ML 1 FRASCO DE 20 ML GOTAS ORALES EN SOLUCION	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES	Pacientes neoplásicos con tos persistente.		
	DIHIDROCODEINA	TOSIDRIN 10MG/ML 1 FRASCO 15ML GOTAS ORALES EN SOLUCION	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES	Pacientes neoplásicos con tos persistente.		
		TOSIDRIN 10MG/ML 1 FRASCO 30ML GOTAS ORALES EN SOLUCION	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES			
	NOSCAPINA	TUSCALMAN 15MG 20 SUPOSITARIOS NIÑOS	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES	Pacientes neoplásicos con tos persistente.		
		TUSCALMAN 3MG/ML 150ML JARABE	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES			
S01X	CARBOMERO	OFARSIN 2MG/G 30 ENVASES UNIDOSIS DE 0,6G GEL OFTALMICO	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos de síndrome de Sjörgen.		
		SICCAFLUID 0,25% 10G GEL OFTALMICO	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES			
		SICCAFLUID 2,5MG/G GEL OFTALMICO 30 ENVASES UNIDOSIS 0,5 G	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES			
		SICCAFLUID 2,5MG/G GEL OFTALMICO 60 ENVASES UNIDOSIS 0,5 G	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES			



## MEDICAMENTOS FINANCIADOS CIERTAS INDICACIONES

G. ATC	Principio Activo	Especialidades	Financiación	Indicación	Normativa	Médico
S01X	CARMELOSA	VISCOFRESH 1% 30 UNIDOSIS 0,4ML COLIRIO  VISCOFRESH 5MG/ML 10 ENVASES UNIDOSIS 0,4ML COLIRIO EN SOLUCION VISCOFRESH 5MG/ML 30 ENVASES UNIDOSIS 0,4ML COLIRIO EN SOLUCION	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES  FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES  FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos del síndrome de Sjörgen.		
	HIPROMELOSA / SODIO CLORURO	ACUOLENS 3MG/ML + 5,5MG/ML COLIRIO EN SOLUC 30 ENVASES UNIDOSIS DE 0,5ML	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos del Síndrome de Sjörgen.		
	POVIDONA	OCULOTECT 50MG/ML FRASCO 10ML COLIRIO EN SOLUCION	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos del síndrome de Sjörgen.		
	SODIO CLORURO	HIDRATHEA 9MG/ML 1 FRASCO DE 10ML COLIRIO EN SOLUCION	FINANCIADO DETERMINADAS INDICACIONES	Alivio de la sequedad ocular en pacientes afectos del síndrome de Sjörgen.		